



Estimate

6.00

Wla

3.00

~~W~~ / 2



Let Jo

no - 22



FORMULARIO

MAGISTRAL.

FORNULARIO

MAGISTRAL

# FORMULARIO MAGISTRAL

Y

MEMORIAL FARMACÉUTICO,

RECOGIDO

POR EL CABALLERO CADET DE GASSICOURT,

Doctor en artes, Miembro de la Legion de Honor, Farmacéutico, Secretario del Consejo de Sanidad de la villa de Paris, Socio correspondiente de las Academias de Madrid, Turin y Florencia, de las Sociedades de Bruxelles, Liege, Estrasburgo, Lion, Ruan, Orleans &c. &c.

Y ADORNADO CON NOTAS POR D. J. Y D. P. P.

CUARTA EDICION,

*Corregida y aumentada.*

MADRID

POR IBARRA, IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M.

1822.



1

## ADVERTENCIA

### DEL TRADUCTOR.

**H**e creído hacer un servicio á mis comprofesores y á la humanidad publicando la preciosa coleccion de recetas de los mas célebres autores que recogió el sabio, ya difunto, Cadet de Gassicourt. No pretendo apropiarme mérito alguno de esta obra, en la que no tengo mas parte que la adición de algunas notas que he creído necesarias para reformar las cantidades de algunas recetas que me han parecido escesivas para nuestro clima.

Podria haberse continuado la impresion de esta obra como se



empezó, pero avisado del coste  
que tendria por su abultado volu-  
men, traté de consultar los inte-  
reses del público, y observando  
que deberia serle gravoso, encar-  
gué se continuara en la misma le-  
tra en que van las recetas.

# PRÓLOGO.

El deseo de aliviar ó prevenir los males á que está sugeto el hombre desde que nace, ha creado el arte por el cual se conocen en la naturaleza las sustancias que simples ó mezcladas, puras ó modificadas pueden servir de remedio.

La primera guía fué el empirismo, la credulidad el primer juez; y con esta ciega esperiencia, el observador, desviado desde el principio por las ideas supersticiosas que atribuian al maligno influjo de los astros ó deidades la mayor parte de los males, procuró oponerles, lo que en el sistema de los cultos parecia conjurar su maligna influencia.

La farmacia y la medicina nacie-

\*

ron á la par, y anduvieron confundidos mucho tiempo (1).

Que tenga su cuna en Egipto, China, Arabia ó en Caldea poco importa; el arte de curar estaba en su infancia entre las manos de los sacerdotes, poetas y truhanes. En los templos era donde se llevaban los enfermos; y en sus paredes se inscribian en Egipto los remedios que producian buen efecto. La administracion de estos remedios siempre iba acompañada de ceremonias, conjuros y preces; dando unas veces sustancias inertes y otras activas. En la India aun sigue esta medicina primitiva y religiosa. El Gouron es sacerdote y curandero en las riveras del Ganges.

---

(1) Entre los griegos, y aun en el tiempo de Epicuro, se daba el nombre de *médicos sedentarios* ::::: á los boticarios, porque sentados en sus boticas aguardaban á los enfermos. Por algun tiempo fué esta la ocupacion de Aristóteles, segun James (dic. de medicina, tom. I. p. 52.) Tambien fué esta la de Eudamo y de otro llamado Chariton, de quien Galeno sacó algunas descripciones de medicamentos.

Tal es el imperio de la preocupacion que los progresos de las ciencias físicas no han podido desterrar de la materia médica una infinidad de remedios insignificantes que en tiempos pasados adoptó la supersticion.

Se ha convenido en desechar las ceremonias, las súplicas y conjuros como á medios curativos que estén á la disposicion de los hombres; mas el nombre de un gran número de sustancias sin propiedad conocida ó especial, todavia ocupa su lugar en los tratados mas recientes: tales son los nidos del alcion, las piedras de águila ó de golondrina, los ojos de cangrejo, la uña de la gran bestia, los Bezoares, la usnea, la jade, las lágrimas de ciervo y otros tantos que mucho tiempo hace debian estar desterrados.

Todavia es muy reciente la data de la analisis exacta de los remedios heróicos entre los simples. La quina, el opio, la ipecacuana, las cantáridas y algunos otros son mas conoci-

dos de lo que eran. Con todo aun no se han aplicado á la clínica los resultados de estas investigaciones químicas, y la análisis que no está confirmada por las observaciones prácticas, no puede mirarse como completa.

Leyendo la historia de la medicina se ve que la materia médica (esta parte del arte de curar que consiste en clasificar los remedios simples, segun sus propiedades, despues de haber descrito su historia natural) toma ya una forma mas regular en los escritos de Dioscórides, donde ya no se encuentran las ideas fabulosas de Nicandro. Luego vino Galeno dando grande impulso á la farmacia, y sus fórmulas compuestas fueron multiplicadas por Aecio, Rhases, Avicena, Averroes y otros que adoptaron la polifarmacia de los egipcios y de los árabes. El renacimiento de las letras y de la medicina hipocrática hizo alguna mudanza en la preparacion de los medicamentos, mas no los simplificó. La alquimia al contrario, añadió



nuevas combinaciones, y desde Paracelso hasta Sthal y Boerhaave, la farmacia fué complicándose mas y mas. Pareció adoptarse como principio que cuanto mas compuesto es un medicamento, tantas mas son las propiedades de que está dotado. Después de haber acumulado las sustancias sin tener mejores resultados, los médicos se han abandonado á un extremo opuesto, alabando esclusivamente las sustancias simples.

Sin duda nada mas razonable que la opinion de los prácticos, que juzgan que la simplificacion de los remedios es el medio mas seguro para conocer su accion sobre nuestros órganos. Es preciso convenir en esto porque la teoría de todas las ciencias físicas indica esta marcha; mas por seguirla se debe proscribir indistintamente la polifarmacia. ¿No sería mejor aclararla? En medicina como en política, para que las revoluciones no sean funestas deben dirigirse con lentitud y delicadeza. Es menes-

ter ir despacio y siempre guiado por la experiencia, reformar prudentemente sin dejarse alucinar de la belleza de las teorías.

Las opiniones envejecidas difíciles de desarraigar exigen mucha prudencia. Los sucesos incontestables que obtuvieron los mas célebres médicos usando remedios compuestos, escitan el deseo de seguir el método que les surtió bien; y la flaqueza humana es tal, que el médico se vé siempre mas ó menos obligado á condescender con la voluntad, con los caprichos ó con las preocupaciones de la mayor parte de los impacientes enfermos, quienes por no estar al nivel de los conocimientos del dia, se figuran que uno los olvida, ó no conoce sus males, cuando no se les prescriben sino sustancias simples. En el mundo la mayor parte de la gente acomodada se precian de tener algunas nociones generales: ellos creen tan firmemente en la medicina como el enfermo de Moliere; juzgando de la sabiduría de sus mé-

dicos por el número y estension de sus recetas; y tal vez el práctico esclarecido que se ha desdenguado de hacer á sus enfermos un romance de sus enfermedades, vió menguar rápidamente su clientela, por haber limitado sus prescripciones á un corto número de remedios, cuyo efecto pudo preverse, calcularse y mirarse como seguro.

Pero replicarán algunos que el médico que honra su profesion, nunca cede á las consideraciones de interes personal: sigue su propia conciencia y no ordena á sus enfermos sino los remedios cuyas propiedades tiene estudiadas, y ademas que se supone mas facil determinar la accion de una sustancia simple que la de otra compuesta. Este es el principio sobre el cual los antagonistas de la polifarmacia han establecido todo su sistema. Antes de combatirlo, y para apreciar su justo mérito, será útil reproducir sus objeciones con toda su fuerza.

“La mezcla y la confusion en los

„medicamentos, dicen ellos (1), es  
„uno de los mayores obstáculos que  
„la medicina tiene que vencer para  
„su adelantamiento. Mientras que  
„se usáren los remedios compuestos  
„de la farmacopea galénica, jamas  
„podrá conocerse ninguna cosa so-  
„bre sus verdaderas propiedades. La  
„antigua escuela de Coos usaba re-  
„medios simples (2); ella únicamen-  
„te ofrecia á los enfermos un reme-  
„dio, y no los administraba sino el  
„uno despues del otro cuando cier-  
„tas circunstancias exigian que se  
„mudase la especie. Si no se renun-  
„cia á este lujo pernicioso, la cien-  
„cia quedará en el estado en que la  
„vemos, cargada de pretendidas ri-  
„quezas, no podrá servirse de ellas.  
„En lugar de electuarios famosos,  
„de cocimientos compuestos de opia-  
„tas preciosas, de píldoras multipli-

---

(1) Fourcroy (del arte de conocer y de emplear los medicamentos) tom. I. pag. 446.

(2) Este es un error, se encuentran en Hipócrates muchas preparaciones compuestas.

“cadas, una materia mineral, vege-  
“tal ó animal en sustancia, una por-  
“cion de sales cuya naturaleza esté  
“bien conocida, algunas preparacio-  
“nes químicas simples, he aquí lo  
“que debe constituir la materia mé-  
“dica.”

Algunos médicos aseguran que con doce ó quince sustancias simples y tales como las presta naturaleza, se pueden tratar todas las enfermedades crónicas, agudas, internas y externas..... manejarlas equivale á curarlas. Siendo esto así, la medicina ya no tiene mas progresos que hacer, y en adelante la terapéutica ya no será un estudio difícil. Sin duda debemos lisongearnos por un descubrimiento tan extraordinario, echar al fuego todos los formularios, todas las farmacopeas, cerrar los laboratorios, las oficinas, y conservar solamente en cada poblacion un droguero honrado, que pueda vender por menor á toda persona las quince sustancias dotadas de tan bellas propiedades. Mas como muchos prácti-



cos respetables aun no conocen el beneficio de tan grande simplificación, como esta *oligo farmacia*, no ha logrado la aprobacion general, nos queda el derecho de examinarla y preguntarles á sus partidarios qué *es lo que entienden por remedio simple*.

No puede haber equívoco, si por esto entendemos el ejercicio limitado á sus diferentes especies, la aplicación ó sustracción de calórico de la luz de la electricidad, del magnetismo (suponiéndole acción sobre nuestros órganos), las friegas secas, las lociones con agua pura, los baños &c.; pero luego que se trata de una sustancia orgánica ó mineral cualquiera que sea, el químico le dice pare Vm. aquí, y le advierte: que no existen remedios simples. Tal preparacion, muy compuesta en la apariencia, no admite otros principios, ni otros elementos que los contenidos en una sustancia tomada aisladamente. La acción de un medicamento simple, esto es, de una sustancia única, es simple mixta aunque especial; y

muchas veces un medicamento compuesto obra como obraria un medicamento simple que tuviera la misma propiedad. Tal vez sería tan difícil sustituir una sustancia simple á la triaca, como una de compuesta al mercurio. La accion es una por ambas partes; y con relacion á la accion, todos los medicamentos podrian considerarse como simples. En la dinámica vemos una esfera chocada por diferentes cuerpos á la vez, describir siempre una diagonal, tanto si obedece á dos como á cien impulsiones simultáneas; del mismo modo, en la accion de los medicamentos *las causas son múltiples, el efecto es uno.*

Para aclarar aun mas esta cuestion importante, apliquemos lo que acabamos de decir á alguna sustancia mirada como simple en medicina, á un gas, á una sal. ¿Se sabe si un gas obra por su radical ó por el cálorico, la luz ó la electricidad que contiene, si en una sal tal como el nitro, la accion es debida al oxige-

no, al azoe ó al potasium? El modus agendi de los medicamentos es tan misterioso, si se emplean sustancias aisladas, como si se usan remedios compuestos (1). La razon de esto no se puede hallar en la accion particular de los elementos que las componen. Esta accion se modifica siempre por la fuerza vital, de donde resulta que no hay verdaderos equivalentes en medicina, así como no hay perfectos sinónimos en las lenguas.

La análisis química ha sido de poca utilidad hasta ahora, sobre todo, cuanto se ha aplicado á los medicamentos sacados del reino vegetal, á cuya clase pertenecen la mayor parte. En efecto de que puede servir á la medicina el saber que el opio, la cicuta, el euforbio, la quina, como

---

(1) Los médicos mas sabios todavía no han hallado una razon mas plausible del efecto narcótico del opio, que la que dio el cómico famoso: *Opium facit dormire quia est in virtus dormitiva.*

y tambien el azucar, la goma y la harina, dan por último resultado, oxígeno, carbono é idrógeno, y que las propiedades tan diferentes de estas sustancias dependen únicamente de la variedad de proporcion de estos principios (1).

¿Qué se puede concluir de semejantes hechos, sino que los medicamentos deben admitirse ó desecharse segun lo que demuestra la esperiencia médica, y si esta regla está recibida y se practica con respecto á los remedios simples, no habrá razon para que lo sea con los compuestos?

Nosotros ya no estamos en aque-

---

(1) Con esto no intentamos probar que la analisis química sea enteramente inútil á la medicina, habiéndole prestado ya grandes servicios. A la analisis química se debe la teoria de la respiracion, el conocimiento de la formacion de los cálculos, el de las alteraciones que experimentan la orina, los huesos &c. &c. La química ha explicado algunas propiedades de los vegetales analogos; y como la analisis vegetal cada dia va haciendo nuevos progresos, todavia se pueden esperar aplicaciones mas felices.

llos tiempos en que se creía que en una mistura farmacéutica, cada cuerpo obraba segun sus propiedades particulares y específicas; que el uno iba á reanimar el cerebro, mientras que el otro fortificaba el estómago, y el de mas allá depuraba la sangre &c. Tampoco pensamos ya que sea siempre preciso arreglar una fórmula con su base, agente principal, uno ó dos ayudantes, un correctivo y un escipiente. Se abandonaron ya estas ideas sistemáticas; pero se sabe que un medicamento puede modificar los efectos de otro; que el opio y la quina, por ejemplo, obran diferentemente cuando están unidos, de cuando están separados; que el emético se vuelve purgante cuando se le mezcla cierta sal. El empirismo ha observado que algunas preparaciones muy complicadas, como la triaca, el discordio, el xarabe antiescorbútico tienen propiedades que no se encuentran en ninguna sustancia simple, de donde se puede deducir que es preciso admitir así en medicina como en



química esta ley: los compuestos tienen propiedades nuevas y diferentes de aquellos que los componen.

Para proceder con método y formar una buena teoría sobre los medicamentos sería menester ensayar todas las sustancias reputadas como simples, combinarlas según las indicaciones de dos en dos, de tres en tres, ó por tener compuestos. ¿Qué resultaría de esto? Tenemos ya bastantes datos para poder afirmar desde luego que no hay analogía entre la acción de los componentes y los compuestos; con que no se podrá concluir de una á otra, y todo se reduce por ambas á ciertas acciones propias, individuales, independientes, únicas y especiales, aunque mistas. De donde se sigue necesariamente que los sucesos obtenidos por medicamentos compuestos, *muchas veces experimentados*, pueden considerarse como otras tantas experiencias hechas; y puesto que consideramos la experiencia médica como único juez que pueda decidir la cuestión, ha-

biendo aquella sancionado algunos remedios compuestos, nos parece que quedamos suficientemente autorizados para emplearlos en la práctica (1).

---

(1) Mi opinion coincide perfectamente con la que han declarado M. el Dr. Macartan y M. Planche en una relacion que leyeron en la sociedad de medicina de Paris en el mes de enero de 1812. Estos dicen:

La experiencia prueba que un medicamento mezclado con otro, que iguala sus propiedades, y aunque no goze de ellas sino en grado remiso, muchas veces es mas útil que si se empleara aisladamente y en mayor dosis. Se observa por egemplo que una fiebre intermitente que se resiste á la quina sola, cede muchas veces á la mezcla de este febrifugo con el tártrito antimoniado de potasa, acetato ó muriato de amoniaco, el carbonato, nitrato ó sulfato de potasa, los polvos de manzanilla romana &c.; segun las circunstancias se observa tambien que en los casos de calenturas intermitentes, clorosis, amenorrea, blenorrea, de ciertas leucorreas atónicas &c., en cuyos casos el sulfato de hierro recomendado con razon por M. Mare, evidentemente produce buenos efectos; con todo en ciertas ocasiones aun es mas ventajoso unirlo con la mirra, y sobre todo con el carbonato de potasa, como lo practicaba el Dr. Griffith. Con esta última circunstancia resulta una descomposicion y nueva combinacion. El ácido sulfúrico abandona el hierro por formar con la potasa una

Deducimos pues de todo lo que precede que es permitido, y aun útil el hacer una coleccion escogida de formulas acreditadas por la larga práctica de los maestros célebres. Sin duda es preciso reformar la polifarmacia; es menester desaparezcan de las fórmulas las sustancias inertes que la ignorancia y la supersticion acumuló en ellas, no deben emplear-

---

sal ligeramente laxante que impide la astringen que ordinariamente causa dicho metal, y este se halla precipitado al estado de óxido carbonado muy dividido.

La esperiencia prueba tambien que la esperanza de llenar muchas indicaciones á la vez, lejos de ser siempre quimérica, se realiza con frecuencia. ¿Quién de nosotros no ha notado que en una calentura adinámica, cuando hay calor en las estremidades, sequedad de la lengua y de la piel, hipo, salto de tendones, coma, constipacion ó diarrea tenaz &c., dando la quina sola agrava ordinariamente el mal, mientras que si se prescribe con los ácidos, con el acetato de amoniaco en grandes doses, el alcanfor, los licores fermentados, los antiespasmódicos, algunas veces el muriato de mercurio dulce, algunos granos de ruibarbo ó el carbonato de cal, segun las diferentes indicaciones, desvanece frecuentemente dichos síntomas alarmantes?

se si no las sustancias conocidas y de buena eleccion, sin asociar las que se destruyen mutuamente; pero es preciso conservar y respetar los remedios compuestos que han producido efectos constantes manejados por los grandes prácticos, á lo menos hasta que la esperiencia haya dado otros medios tan seguros y mas simples.

Las farmacopeas existentes son en gran número y muy variadas. Cada pais, cada escuela tiene la suya, algunas hay muy voluminosas; mas ninguna reúne las fórmulas de los médicos modernos; fórmulas que están esparcidas en diferentes memorias, tratados particulares ú obras periódicas. Muchas de estas prescripciones estuvieron en boga, adquirieron una reputacion fundada en la de sus autores; y poco á poco han caido en olvido, ó han sido alteradas por no haber tenido el cuidado de recogerlas en un código. Los médicos que quieren usarlas no saben muchas veces donde buscarlas: otras las or-

denan con el simple nombre de sus autores; y el farmacéutico que no siempre tiene una grande biblioteca á su disposicion, se halla apurado para encontrar la fórmula y ponerla en egecucion. El reunir pues las que se piden con mas frecuencia, será hacer un servicio igual á los prácticos y á los boticarios.

Resultaria un inmenso volumen, si se quisiere publicar una recopilacion completa de las prescripciones magistrales que se han impreso separadamente con encomios y recomendaciones, mas en este caso la abundancia sería mas perjudicial que la escasez, y era preciso limitarse á una coleccion razonada. No tanto en las obras de los médicos como entre las recetas, que de cuarenta años á esta parte, se han despachado en la oficina de mi padre y en la mia; he escogido las que me han parecido mas usadas, y cuya indicacion era mas precisa. Tales son las de Maliet, Fouquet, Tronchin, Baubard, Barthez &c. &c. Mas en la lectura de los

escritos de los médicos estrangeros es donde he recogido las de Frank, Brown, Huxham, Willis, Pringle, Quarin, Wediaur &c. Dichas fórmulas no estaban muy esparcidas por las boticas; con todo, muchas de ellas, adoptadas por algunos farmacéuticos, las consideraban estos como una propiedad. En nuestra profesion no debe haber secretos, y lejos de quedar resentidos los farmacéuticos del egeemplo que les doy, me lisongeo que le juzgarán favorablemente y le seguirán.

Como esta compilacion no sea una farmacopea metódica, sino un simple compendio, cuyo único objeto es ahorrar á los médicos y farmacéuticos las investigaciones largas y penosas, he seguido el orden alfabético, el mas cómodo de todos; y porque esta obra no fuese un manual popular donde todo enfermo pudiese escoger y preparar el medicamento que creyese convenirle, he entrado lo menos que me ha sido posible en los pormenores de la manipulacion, con el fin de que estas fórmulas úni-

camente pudiesen ser empleadas por los médicos y preparadas por los farmacéuticos, quienes con la sola indicacion de las sustancias, deben saber cuáles son las operaciones necesarias para la egecucion de la receta.

Para facilitar el uso de este formulario he creido del caso añadir tres tablas: la primera es la de los autores á quienes se deben las fórmulas: la segunda es de las prescripciones; y la tercera la de las enfermedades para las que particularmente las han destinado los médicos. Así para dar un eemplo de esto, la poción antiemética del Dr. Riverio se hallará en la primera tabla con el nombre de Riverio: en la segunda en la clase de pociones; y en la tercera al artículo vómito.

He estado dudando mucho tiempo sobre si pondria á continuacion de este formulario el *memorial* farmacéutico que le termina; temí me acusasen de mezclarme en un arte en que soy forastero, y de tener la osadia de indicar un método de tratamiento,

clasificando los medicamentos por las enfermedades. Yo no he tenido esta pretension ridícula y perjudicial, y aun les advierto á los que tuviesen la debilidad de consultar este memorial como quien consulta un libro de medicina, que se espondrian á los mas funestos errores. Es menester ser médico práctico para escoger con discrecion entre una serie de medicamentos aplicados á un género de enfermedad, aquel que conviene á la especie que se debe tratar. Un remedio excelente en tal calentura, en tal flegmasia, es inútil ó peligroso aplicado á una enfermedad del mismo género si existen ciertas contraindicaciones ó complicaciones de las que no puede juzgar el que no es médico. Por otra parte, la edad, el sexo, el clima, el temperamento y muchas otras consideraciones pueden obligar á modificar la dosis de la prescripcion. Para que los médicos solos pudiesen servirse de esta parte de la obra, prevengo á todo lector que no he seguido en el orden del memorial ninguno.



de los métodos curativos; en primer lugar porque no me toca á mí el juzgarlos, y despues porque esto no entra en el plan que me he propuesto. Con esta nomenclatura no he tenido otro objeto que el de ayudar á los prácticos, cuya memoria por grande que sea, no puede siempre tener presente la serie de remedios empleados en todas las enfermedades, y sobre todo las doses en que se prescriben. He querido recordarles las preparaciones contenidas en este formulario, y dar noticia á los farmacéuticos de las que se le podrian pedir. He creido que esta especie de tabla no sería inútil al estudiante de medicina, porque comparando las diferentes preparaciones indicadas en el mismo caso, notaria las sustancias en las que se tiene mas confianza, las que se les asocian comunmente, y las formas variadas con que se prescriben á los enfermos. Esta aproximacion puede dar á los médicos ideas de reforma y de perfeccion. La clasificacion de los medicamentos por enfermedades no

tiene nada de nuevo; muchas farmaceutas ofrecen el ejemplo de esto, yo no he hecho mas que imitarlas, y los médicos que llevo citados son los que me han suministrado las indicaciones. Yo he creído que podia decir: los prácticos prescriben ordinariamente en la hemoptisis *la conserva de rosas, el elixir de Minsicht, el extracto de catecú &c.*, puesto que en los formularios donde se da el método de preparacion de estos medicamentos, los médicos no dejan de añadir que se usan en la hemoptisis.

Insisto en esta esplicacion, porque el mayor disgusto que podria ocasionarme la malevolencia, sería el atribuirme el designio de usurpar en mis escritos el dominio de la medicina. Como no se logra ningun mérito en la publicacion de una simple compilacion de fórmulas que debo á cien autores, no he podido tener mas obgeto que la utilidad pública, sin sacar ninguna gloria de un trabajo que no exige mas que paciencia y exactitud.

# FORMULARIO

## MAGISTRAL.

---

### FORMULAS.

---

#### ACEYTE BEZOÁRDICO DE WEDEL.

Esta preparacion no es otra cosa que el aceyte alcanforado de las farmacias.

#### ACEYTE CARMINATIVO ETEREO DE LOS DINAMARQUESES.

Aceyte destilado de manzanilla. . . . .	} ʒ ij
— de yerba buena piperita. . . . .	
— de alcaravea. . . . .	} ʒ xxxvj
— de comino. . . . .	
— de anis. . . . .	
— de hinojo. . . . .	

Mézelese con cuidado.

Se emplea al exterior para hacer

friegas sobre el adomen en el cólico ventoso ó catarral.

Interiormente se prescribe en dosis de seis ú ocho gotas trituradas con azucar ó con una yema de huevo.

## ACEYTE ACIBARADO BÁTAVO.

Se pone en una retorta de arcilla gris bien enlodada una libra de acibar hepático en polvos mezclado con dos onzas de mirra y quatro dracmas de incienso; despues se procede segun arte á la destilacion en el baño de arena, y se tiene un licor cargado de aceyte amargo, cuya aplicacion tópica ha sido muy recomendada contra los gusanos de los niños

## ACEYTE ACÚSTICO.

Aceyte de ruda por infusion ligera.	3 jv
Balsamo tranquilo. . . . .	3 ij
Aceyte azufrado de tremen-	} aa 10 gotas
tina. . . . .	
Tintura de anafétida. . . . .	
— de ambar gris. . . . .	
— de castoreos. . . . .	}
Aceyte de succino rectificado.	

Mézclense todas estas substancias en un frasco

Este aceyte fortifica el órgano del oído: se embebe con él un poco de algodón que se introduce en las orejas.

## ACEYTE VERDE DE METZ

. Ó. DE FEVILLET.

Oxido de cobre verde. . . . .	3 iiii
Sulfato de zinque. . . . .	3 j ß
Aceyte de lino. . . . .	} aa 3 vj 3 ij
— de olivas. . . . .	
Trementina. . . . .	3 ij
Acibarsocotrino. . . . .	3 ij
Aceyte volatil de enebro. . . .	5 iv
— de clavos. . . . .	3 j

Este aceyte únicamente se usa por externo, y roe las carnes fungosas; modifica las úlceras, cicatriza y previene la gangrena. (Se llama tambien esta preparacion BALSAMO DE METZ.)

Copyright 1900 by J. B. Lippincott & Co. Philadelphia, Pa.

## AGUARDIENTE ALEMAN.

Jalapa machacada. . . . .	3 viij
Escamonea triturada. . . . .	3 ij
Raíces de turbit, idem. . . . .	3 j
Aguardiente de 21 grado. . .	16 vj.

Infúndese todo á una temperatur de veinte grados por espacio de veinte y quatro horas , y fíltrese.

Esta tintura es purgante. Se da en dosis de dos dracmas hasta dos onzas , segun la fuerza del enfermo.

En la Alemania se usa en las enfermedades reumáticas y artríticas. Algunas farmacopeas añaden á esta fórmula media dracma de lirios de Florencia, dos dracmas de carbonato de potasa y una dracma de azafran por pinta.

## AGUARDIENTE PURGANTE

DE M. MEZAIZE.

Jalapa . . . . .	℥ iij ℥
Ruibarbo. . . . .	} ℥ 3 iij ℥
Escamonea. . . . .	
Cálamo aromático. . . . .	
Canela. . . . .	
Bayas de nebro. . . . .	℥ x ℥
Nitrato de potasa. . . . .	℥ viij
Azucar negro. . . . .	℥ viij
Aguardiente de 20° . . . . .	pintas xxviiij

Se deja en infusion por espacio de ocho dias y se filtra.

Este licor es purgante y se da en dosis de 3 j ℥.

## AGUA DE TREVEZ.

Tártaro emético. . . . .	℥ 2
Sal de Sedlitz. . . . .	℥ 3 j
Agua. . . . .	℥ ij

Esta agua se ordena, como agua mineral purgante, á la dosis de una pinta.

## AGUA DE QUERCETANO.

Zumo de puerro. . . . .	℥ ij
— de cebolla. . . . .	℥ ij
— de rábano rústico. . . . .	℥ ij
— de parietaria. . . . .	℥ ij
— de limon. . . . .	℥ ij

Es menester dejar digerir estos zumos todos juntos por espacio de algunos dias, y despues destilarlos á fuego lento (1).

(Esta agua se prescribe á la dosis de una ó dos onzas en las enfermedades crónicas de los riñones y de la vegiga. P.)

## AGUA DIURETICA ALCANFORADA.

Agua de parietaria. . . . .	℥ ij
Nitrato de potasa. . . . .	℥ jv
Alcanfor. . . . .	℥ vj
Acido acético. . . . .	℥ jv
Alcool. . . . .	℥ viij

Disuélvase el alcanfor en el alcool (2). Mézclase con lo demas, agítase mucho tiempo y filtrase.

Esta agua se usa en las enferme-

(1) Seria preferible el uso de los zumos sin destilar en dosis mas pequeñas. N. T.

(2) Es mucho mejor triturar el alcanfor con el nitró hasta hacerlo polvos muy finos, y proceder en lo demas como en el original. N. T.



dades agudas é inflamatorias en las calenturas pútridas y en las enfermedades sifilíticas.

# AGUA LLAMADA OXIGENADA DE ALYON (1).

Acido nítrico puro. . . . . 3 j  
Agua. . . . . 3 ij

Se usa esta agua en las enfermedades cutáneas y en la sífilis. La dosis es de dos hasta tres vasos por la mañana.

## AGUA MERCURIAL DE PIDERIT.

Mercurio destilado. . . . . 3 j  
Acido nítrico. . . . . 3 ij

Se hace la solución á un calor suave; después se toma una onza y media de ella, y se añade

Zumo exprimido de celidonia mayor. . . . .	} 3 vj
Cocimiento de la raíz de aris- toloquia redonda. . . . .	

Se calentará para mezclarlo y se filtrará.

Esta agua se usa por externo para limpiar las úlceras venereas.

---

(1) Añadiendo azucar clarificado se hace la limonada nítrica de Alyon. N. Ts

## AGUA VEGETO MERCURIAL

DE PASSAVIN.

Oxido de mercurio rojo. . . . . 3 xij ℥  
 Mercurio líquido. . . . . 3 xij ℥  
 Surtartrato de potasa. . . . . 3 x ℥  
 Agua q. s. para formar una pasta.

Tritúrase mucho tiempo en un almirez de vidrio colocado sobre cenizas calientes. Después de la extincion del mercurio, cuando la mezcla haya tomado un color blanco, se echa agua hirviendo para efectuar la solucion. Filtrase y evapórase hasta formar nata.

Se usa en la sífilis en dosis de media onza con un xarabe simple. Se reitera la dosis dos ó tres veces por dia.

## AGUA ETEREA ALCANFORADA

DE PLANCHÉ.

Alcanfor purificado. . . . . 3 jv  
 Eter sulfúrico muy rectificado. 3 j ℥

Métense ambas sustancias en un frasco y se agitan para facilitar la solucion. Después se echa este eter en un frasco tubulado en su base, y que contenga ya de prevencion veinte y ocho onzas de agua destilada. A la parte inferior de los tubos está adaptada una llave, y al cuello del frasco está pegado con lodo un tubo que se tapa con un tapon de corcho cubierto de lodo. Cuando quiere usar-

se esta composicion, se destapa el tubo superior, y se deja salir el licor por la llave (1).

Se da una cucharada de esta agua eterea pura ó con un poco de azucar ó de cualquiera xarabe; y es útil en los efectos espasmódicos.

## AGUA CORDIAL DE COLADON.

Se toma la corteza exterior de muchos limones; se pone en infusion con aguardiente, y se destilan en el baño maria. Al espíritu de limon se añaden algunas gotas de tintura de ambar gris y de almizcle: se dulcifican con el xarabe de azucar muy blanco.

M. Coladon guarda unas proporciones tan exactas, que no es posible distinguir en su licor ni el ambar ni el almizcle, á pesar de que el limon que domina en esta composicion está muy dilatado. Lo que le ha dado siempre una superioridad sobre los falsificadores, es que jamas ven-

---

(1) Se halla el diseño y la descripcion de este pequeño aparato en la farmacopea general de Brugnatelli, traducida por M. Planche, tom. 2, pag. 210, la 1. fig. 32.

de el agua que no esté preparada de tres ó cuatro años ántes.

Esta agua es mas bien un licor de mesa que un remedio.

## AGUA DE ARCABUZZAZO

DE THEDEN.

Vinagre comun. . . . .	} aa ðb ij
Alcool rectificado. . . . .	} aa ðb ij
Acido sulfúrico debilitado. . . . .	3 x
Azucar blanco comun. . . . .	3 xij

Mézclese , fíltrese y consérvese el licor en un frasco.

Esta agua sirve para deterger las úlceras saniosas , moderar la supuración de las heridas y detener las hemorragias. Se aplican tambien compresas empapadas con esta agua , en las contusiones , fracturas y luxaciones.

En las enfermedades pútridas se da interiormente en dosis de veinte á treinta gotas con un vehículo apropiado.

AGUA ESPIRITUOSA DE ANHALT.

Trementina del terebinto. . . . .	℥ viij
Incienso. . . . .	℥ j β
Clavos. . . . .	} aa ℥ vj
Nuez moscada. . . . .	
Cubebas. . . . .	
Canela. . . . .	} aa ℥ β
Bayas de laurel. . . . .	
Semillas de hinojo. . . . .	℥ iij
Agaloco ó Calambac. . . . .	℥ ij β
Azafran. . . . .	℥ v
Alcool. . . . .	℥ xv. (1).

Se administra en dosis de dos ó tres dracmas, como estomático diurético y antiapoplectico.

(Cuando la apoplegia es puramente serosa como sucede algunas veces en la edad avanzada y en los temperamentos húmedos. P.)

AGUA DE MAGNANIMIDAD.

Hormigas. . . . .	℥ ij
Alcool rectificado. . . . .	℥ iij

Póngase en maceracion por espacio de cin-

(1) Ya se supone que deben triturrarse los ingredientes solidos, y mezclarlos con el alcool, infundirlos por espacio de algunos dias, menearlos algunas veces, y filtrar despues la tintura. N. T.

co ó seis dias, destílese en el baño maria hasta sequedad: entónces añade

Canela. . . . .	3 j
Clavos. . . . .	3 j
Cardamomo menor. . . . .	3 aa 3 vj
Cubebas. . . . .	3 jv
Zedoaria. . . . .	3 x

Se hace macerar todo por espacio de tres dias en el sobredicho alcool destilado. Destílese de nuevo en el baño maria hasta sequedad.

Esta agua espirituosa está recomendada en la debilidad de nervios; se usa en fricciones. Se toma tambien interiormente en dosis de dos dracmas.

## AGUA DE MADAMA DE LA VRILLIERE

### PARA LOS DIENTES.

Canela. . . . .	3 ij
Clavos. . . . .	3 vj
Cortezas recientes de limon. . . . .	3 xij
Rosas encarnadas secas. . . . .	3 j
Coclearia. . . . .	3 viij
Alcool. . . . .	16 ij

Se machacan la canela, los clavos y las rosas; y las cortezas de limon y la coclearia se pican con tixera, y todo se pone en maceracion en el alcool por espacio de veinte y quatro horas, y se destila en el baño maria.

## AGUA DE M. LE PREMIER.

Bálsamo de Fiorovanti. . . . . ℥ ʒ  
 Esencia vulneraria. . . . . 3 ij

Esta agua se usa en las contusiones, en los golpes recibidos en la cabeza, en las machacaduras; alivia los dolores del reumatismo crónico; se frotan con ella las partes dañadas, ó se aplican compresas embebidas con esta agua.

## AGUA DE BONFERME

O DE ARMAGNAC.

Nuez moscada. . . . . } aa 3 iv  
 Clavos. . . . . }  
 Flores de granado. . . . . } aa 3 iij  
 Canela. . . . . }  
 Alcool. . . . . 3 viij

Se machacan todas estas sustancias, y se ponen en maceracion por espacio de ocho dias en el alcool; en seguida se cuela por-expresion, se filtra, y se conserva para el uso en un frasco bien tapado.

Esta agua se usa para los golpes que se han recibido en la cabeza. Se le hace respirar al enfermo y con ella se frota la parte dañada, sobre la

qual se ponen compresas empapadas con la misma , y se tiene cuidado de renovarlas muchas veces al dia.

## AGUA ANTI-HERPÉTICA

DEL CARDENAL DE LUYNES.

Sublimado corrosivo. . . . .	3 j β
Albayalde. . . . .	3 jv
Sulfato de alumina. . . . .	3 iij
Clara de huevo. . . . .	n.º j
Agua de rosas. . . . .	3 viiij

Mézclese en mortero de vidrio y agítese ántes de usarla.

Esta agua sirve para lociones. Las compresas empapadas en ellas se aplican á los herpes.

(Mas es preciso que no se olviden los remedios generales internos.)

## AGUA PARA LOS OJOS

POR EL D<sup>r</sup>. YVEL.

Azafran. . . . .	xx granos.
Sulfato de zínque. . . . .	3 iij
Sulfato de cobre. . . . .	3 j
Alcanfor. . . . .	3 ij

Se pulveriza todo, y en una pinta de agua se pone la cantidad de polvos que cabe en un dedo de coger. Se deja en infusion veinte y quatro horas á una temperatura suave, y de



tiempo en tiempo se menea. Se deja sentar el líquido y se decanta.

Sirve para fomentar los ojos cuando los párpados estan infartados y que segregan un humor mucoso.

### AGUA OFTALMICA FORTIFICANTE DEL DR. SKLLE.

Agua destilada de manzanilla. . .	3 viij
Acetato de plomo líquido. . .	} aa 3 ij
Alcool aloanforado. . . . .	
Sulfato de zinque. . . . .	3 j

Se usa esta agua como colirio en la epiphora (1) y lippitudo causadas por relajacion.

### AGUA DE GONDRAN.

Acido muriático. . . . .	3 jv
Aceyte de petroleo blanco. . . . .	3 j

Mézclese agitando la botella. . .

Esta es la dosis para un baño parcial en los reumáticos.

---


(1) El agua que se supone necesaria para este baño queda á discrecion del profesor. N. T.

## AGUA DE ALIBOUR.

Sulfato de cobre. . . . .	3 v
— De zínque. . . . .	3 ij 3 j 6
Azafran. . . . .	3 j
Alcanfor. . . . .	3 ij 6
Agua comun. . . . .	℥ jv

Métanse dichas sustancias trituradas en un matraz de capacidad proporcionada ; agítase la mezcla y déjese digerir por espacio de veinte dias. Fíltrese.

Se usa esta agua en las heridas contusas ; las contusiones ; se lavan con ella las llagas purulentas y fétidas ; sirve tambien en las quemaduras para acelerar la cicatrizacion cuando la inflamacion se ha desvanecido y contra las optalmias crónicas.



## ATANQUIA DE PLENCH.

Cal viva. . . . .	3 x ij
Almidon. . . . .	3 x
Sulfureto de arsénico. . . . .	3 j

Se mezclan los polvos, y se añade cantidad suficiente de agua (1) para

---

(1) Es mejor servirse de la clara de huevo para formar esta masa. Esta composicion es el *masma* de los turcos.

\ formar una masa muy blanda, que se aplica sobre las partes del cuerpo que se quisieren privar del pelo.

Luego que la pasta se ha secado, se quita con el agua tibia ó fria.



# AZUCAR NARANJADO PURGANTE.

Jalapa pulverizada. . . . .	3 ij
Azucar. . . . .	3 xjv
Tartarito acídulo de potasa. . .	3 jv
Aceyte esencial de naranjas. . .	3 ij

Hágase un óleo sácaro, y mézclese con él la jalapa y la sal.

Su dosis es dos ó tres dracmas, que se disuelven en media azumbre de agua de naranja cocida para purgar los sujetos á quienes fastidian los remedios.

## BÁLSAMO DE GENOVEVA.

Aceyte de olivas. . . . .	℥ iiij
Cera amarilla pura y en pe-	} ℥ 3 viij
queños pedazos. . . . .	
Agua de rosas. . . . .	
Trementina de Venecia fina. .	℥ j
Alcanfor. . . . .	3 ij
Vino tinto bueno. . . . .	℥ iiij
Sándalo rojo en polvo. . . . .	3 ij

Se mete todo en un barreño de tierra vi-  
driado, menos la trementina y alcanfor. Se  
hace hervir por espacio de media hora me-  
necando la materia con una espátula de ma-  
dera. Se añade la trementina de Venecia. Se  
mezcla todo por medio de la espátula duran-  
te uno ó dos minutos; se retira el vaso del  
fuego; y cuando el bálsamo está un poco frío  
se le echa el alcanfor en polvos. Se menca  
con la espátula, se cuece con un lienzo, y se  
deja reposar hasta el día siguiente. Se ex-  
prime el agua que podría contener, y se me-  
te en un vaso de loza para conservarle.

Este bálsamo se aplica sobre las úlceras,  
las partes gangrenadas, magulladas ó heri-  
das; se cubre la llaga con papel de estraza,  
renovando la aplicación dos veces al día. Es-  
te bálsamo está muy en uso en Inglaterra.

**BALSAMO DE RICOUR.** *Vide* UNGUENTO.

## BÁLSAMO SAXON.

Aceyte destilado de espliego. . .	} aa 3 j B
— de succino. . . . .	
— de orégano. . . . .	} T T
— de mejorana. . . . .	
— de salvia. . . . .	} aa 3 j
— de romero. . . . .	
— de marcias. . . . .	
— de yerba buena. . . . .	} aa 3 ij
— de ruda. . . . .	
— concreto de nuez moscada. .	3 jv 3 j

Se hace la mezela en frio.

Este bálsamo sirve para untar los miembros de los niños débiles: á veces se les hace tomar algunas gotas con azucar para facilitar la digestion.

## BÁLSAMO ACÚSTICO.

Aceyte de almendras dulces. . .	3 j
Hiel de buey. . . . .	3 ij
Bálsamo de Pierovanti. . . . .	3 B
M. S. A. (1).	

Se introduce este bálsamo en la oreja por medio de una torunda en el caso de sordera accidental.

(1) Esta mezela no es tan sencilla como aquí supone el autor, pues necesita rebajarse de punto con agua la hiel de toro hasta la consistencia de xarabe en un mortero de piedra, echar en seguida el bálsamo, y últimamente el aceyte de almendras meneandolo por mucho tiempo. N. T.

## BÁLSAMO OPODELDOCH (1).

Tómense huesos, macháquense, en seguida se hacen hervir en s. q. de agua hasta que aparezca en la superficie un cuerpo untuoso de naturaleza de la grasa. Se pasa el cocimiento por un tamiz, y se mete en un vaso de tierra. Con el frio, la gelatina de los huesos se precipita y la grasa se separa. Se hace derretir esta última á un calor suave, y se filtra. Por otra parte se toma

Potasa del comercio. . . . . ℥ j  
 Cal viva. . . . . ℥ ij  
 Agua s. q.

Hágase por decoccion una legía fuerte. Filtrese y concéntrese el líquido hasta que un frasco capaz de tres onzas de agua pese cuatro cuando esté lleno de este liquido. Despues se toma

Grasa obtenida de los huesos. . ℥ j  
 Potasa cáustica, ó sea de esta }  
 misma legía. . . . . } ℥ ℞ 3 j

Mézclese poco á poco á un fuego suave hasta que el xabon esté bien formado, y que enfriado se disuelva enteramente en el agua.

En seguida se disuelve en tres pintas de agua hirviendo.

Sal marina. . . . . 3 vj

Se filtra este líquido y con él se hace di-

---

(1) Hay muchas fórmulas de bálamo opodeldoch. Esta, adoptada por M. Klaproth, nos ha parecido la mejor, y nos ha salido bien.

solver el xabon. Cuando está frio se divide en pedazos cuadrados y se dejan espuestos al ayre por algun tiempo para quitarles la humedad.

Del referido xabon. . . . .	3 ij
Alcool rectificado. . . . .	3 xij
Agua destilada. . . . .	3 ij
Alcanfor purificado. . . . .	3 vj

Hágase la mezcla en un matraz que se cubre con una vegiga, teniendo la precaucion de hacerle un agujero, para dejar salida al ayre.

Se hace derretir la mezcla en el baño maria, se filtra mientras está caliente, se deja enfriar un poco, y se añade

Esencia de romero. . . . .	3 ij 3 ij
— de tomillo. . . . .	3 ij
Amoniaco liquido. . . . .	3 ij

En este estado se cuela sobre frascos de ancha abertura (1).

El bálsamo opodeldoch se usa en fricciones en las contorsiones, heridas contusas y dolores reumáticos.

---

(1) Esta receta tiene muchos pormenores inútiles, pues toda su teoría se reduce á hacer el opodeldoch con un xabon de grasa en lugar del de aceyte: por lo cual puede hacerse con el tuetano de vaca, ó con las cabezas ó apófisis de los huesos, que son las partes que dan grasa por medio de la coccion: la destilacion del alcool con las esencias es perjudicial, pero no la suspension del agua. N. T.

NOTA. Algunos farmaceúticos son de parecer de suprimir el agua destilada en esta preparacion, y de destilar las esencias con el alcool. Dicen ellos, que así obtienen el bálsamo mas blanco.

### BALSAMO DEL CABALLERO LABORDE Ó DE FROUCOY.

Aceyte de olivas. . . . .	℥ jv
Polvos de raiz de angélica. . .	} āā 3 ij
— de escorzonera. . . . .	
— de hipericon. . . . .	
— de bayas de yedra. . . . .	

Se hará cocer á fuego muy suave, dexándole macerar toda la noche; el dia siguiente se vuelve al fuego; y quando el aceite estará cerca de hervir añádese

Triaca. . . . .	} āā 3 ij
Azafran. . . . .	
Estracto de enebro. . . . .	
Aloes. . . . .	3 j

Se hará cocer, se pasará por un lienzo, se dexará reposar algunas horas, se volverá al fuego, y se añadirá

Trementina. . . . .	3 x
---------------------	-----

Caléntese hasta que no dé mas olor de trementina. Entónces se retira del fuego, y se añade

Polvos de incienso. . . . .	} āā 3 j 6
— de estoraque. . . . .	
— de menjuí. . . . .	

Se menea hasta que el bálsamo esté frío. Se dexará reposar durante dos ó tres dias, se



pasa por una servilleta, y se guardará en botellas bien cerradas (1).

Es esencial el menear constantemente este bálsamo con una espátula de madera mientras está en el fuego.

(Se usa exteriormente para curar los infartos glandulosos de los pechos, las escoriaciones de la piel, las grietas, las contorsiones, las úlceras, los sabañones, y los dolores reumáticos. Se aplica con lechinos ó compresas. P.)

## BÁLSAMO ANTI-ARTRÍTICO

DEL D<sup>r</sup>. SANCHEZ.

Xabon animal aromático. . . . .	3 j (2)
Espíritu de espliego rectificado. . . . .	3 jv
Alcanfor. . . . .	3 ij
Aceyte esencial de yerba buena piperita. . . . .	} aa gotas xv
— de canela. . . . .	
— de espliego. . . . .	
— de moscada. . . . .	
— de clavo. . . . .	
— de sásafras. . . . .	}
Eter acético. . . . .	3 j .

F. S. L.

(1) Como el autor no prescribe absolutamente cantidad alguna de humedad, es muy arriesgada su execucion, si no se añade para hacerlo sin miedo de quemarle, una porcion de vino tinto. N. T.

(2) El xabon animal aromático se prepara con seis partes de tuétano de buey, una parte de blanco de ballena, otra de aceyte concreto de moscada y la legía de sosa caústica.

Se usa este bálsamo en fricciones sobre las partes dolorosas, cuando no existe una irritacion fuerte. P.

## BÁLSAMO OFTÁLMICO

DE SAINT-YVES.

Manteca reciente sin sal. . . . .	3 ij
Cera blanca. . . . .	3 jv
Precipitado rojo de mercurio. . .	3 ij ℥
Oxido de zinque. . . . .	3 j
Alcaufor disuelto con aceyte de huevos. . . . .	3 ij gr. v

Mézclese en un almirez de marmol, despues de haber hecho derretir anteriormente la cera y la manteca.

Se pone sobre los bordes de los párpados una cantidad igual á la de un grano de trigo, y se hace una ligera friccion en las oftalmias escrofulosas, crónicas, &c.

## BÁLSAMO TRANQUILO

DEL D<sup>r</sup>. CHOMEL

Hojas verdes de veleño . . . . .	} aa 16 j
— de cinoglosa. . . . .	
— de tabaco. . . . .	

Se hace hervir con tres pintas de vino hasta la consuncion de la tercera parte; caelese y exprímase fuertemente; añádase igual

cantidad de buen *aceyte comun*. Se hace hervir todoz á un fuego suave hasta la reduccion de la mitad; modérese el fuego para que el *aceyte* no se queme y no se vuelva negro. Echese en seguida con suavidad este *aceyte* en un barreño, se dejará enfriar, y se decantará el *aceyte* claro que se conservará en botellas (1). Con este *aceyte* se untan las glándulas del cuello con una pluma fina de dos en dos horas, en las esquinencias. Se usa tambien en fricciones en los dolores reumatizantes y nerviosos.

### BÁLSAMO ACÉTICO ALCANFORADO DEL DR. PELLETIER.

Jabon animal. . . . .	3 j
Alcanfor . . . . .	3 j
Esencia de tomilo . . . . .	gotas x
Eter acético . . . . .	3 j

Mézelese primero el alcanfor y la esencia con el jabon animal, y despues se disuelve todo en el eter al calor del baño maria. Filtrase (2).

Este bálsamo se usa en fricciones en los afectos reumáticos, ciatica, y dolores artríticos.

(1) Este método es muy empírico. Si se pican los vegetales y se cuecen juntamente con el vino y *aceyte* hasta consumir casi toda la humedad, se cuele y se esprime. Sale mucho mejor el bálsamo. N. T.

(2) No es exacto el método de filtrar la disolucion; es mejor, ó no filtrarla, ó sacarla por decantacion. N. T.

## BÁLSAMO ANODINO DE BATH

Opio sin depurar en polvo fino	3 j
Jabon blanco. . . . .	3 v (1)
Alcool rectificado. . . . .	3 xxjv (2)
Alcanfor. . . . .	3 ii j
Aceyte esencial de romero. .	3 jv.

Se hace digerir el opio y el xabon por espacio de tres dias en el alcool, se filtra y se añade el alcanfor y el aceyte esencial. Se agita fuertemente para obtener una mezcla completa.

Se usa exteriormente este bálsamo para calmar los dolores artríticos ó reumáticos. En la cólica nerviosa se prescribe interiormente en dosis de 20 á 50 gotas.

BÁLSAMO DE VIDA DE LELIEVRE,  
Ó ELIXIR DE SPINA.

Agarico. . . . .	} aa 3 j
Raiz de zedoaria. . . . .	
Mirra. . . . .	
Acibar socotrino. . . . .	} aa 3 j
Triaca. . . . .	
Ruibarbo. . . . .	5 j
Raiz de genciana. . . . .	5 j
Azafran. . . . .	5 j
Azucar. . . . .	5 j
Aguardiente de 24 grados. . . . .	1 lb

(1) Algunas farmacopeas prescriben onzas que se disuelven en (2) treinta y dos onzas de alcool.

Este elixir es un buen vermifugo y estomático muy cálido: promueve un poco la transpiracion. La dosis es de una á tres cucharadas por dia, mediando un largo intervalo entra las dosis.

### BÁLSAMO DE VIDA DE HOFMANN.

Aceyte esencial de espliego. . .	} aa 3i
—de clavos. . . . .	
—de mejorana. . . . .	
—de macias. . . . .	
—de canela. . . . .	
—de limon. . . . .	} aa 3R
Aceyte esencial de ruda. . . . .	
—de sucino rectificado. . . . .	} aa 3R
Ambar gris. . . . .	
Alcool. . . . .	3x

Se hace la mezcla en un matraz; se deja digerir todo agitándolo de tiempo en tiempo, hasta que el ambar esté disuelto; se filtra y se conserva en un frasco con tapon esmerilado.

Se usa este bálsamo exteriormente para fortificar los músculos. Alguna vez tambien se ordena interiormente en los cólicos disentéricos. Su dosis es de diez gotas hasta media dracma.

En los cólicos disentéricos ligeros, sobre todo quando son causados por

la supresion de la transpiracion, este remedio debe ir acompañado del calor suave de la cama. (Vide Stoll.) P.

### BÁLSAMO ASTRINGENTE DE RICHARD.

Aceyte de trementina. . . . . 3 jv  
 Acido sulfúrico concentrado. . 3 jv  
 Alcohol. . . . . 3 iij

Esta fórmula se encuentra en la farmacopea de Edinburgo.

Se usa en la emoptisis, en dosis de uno á dos escrúpulos con una bebida apropiada.

### BÁLSAMO DE VIDA EXTERNA.

(Vide LINIMENTO ESTIMULANTE INGLÉS.)



### BAÑO DE AGUA MINERAL

SULFUROSA ARTIFICIAL.

(Imitando la de Baréges.)

Sulfureto de potasa seco. . . . . 3 ij  
 Hidrosulfureto de potasa líquido y  
 bien saturado. . . . . 3 viij  
 —de cal líquido y bien saturado. 3 viij  
 Agua comun. . . . . 3 viij

Se hace disolver el sulfureto de potasa seco en la cantidad de agua comun arriba indicada. Se añade esta disolucion á los dos líquidos precedentes; y luego se forma un precipitado que se separa por la filtracion.

Dos onzas de este líquido son suficientes para un baño de veinte y cuatro cubos ó cántaros de agua. Cuando se empieza el uso de los baños sulfurosos ordinariamente, no se emplea mas de onza y media, pudiéndose aumentar despues gradualmente hasta dos onzas y media.

MM. Planche y Boullay, farmacéuticos de París, han indicado otro método para imitar las aguas de Baréges. Ved ahí su fórmula.

Sulfureto hidrogenado de sosa

concentrado á 25 grados del

hidrómetro. . . . . 3 x

Solucion salina gelatinosa. . . . 3 jv

Se mezcla todo en el agua del baño al momento en que uno se quiere servir de ella. La solucion salinogelatinosa se compone con

Sulfato de sosa. . . . . } aa 3 jv

Muriato de sosa. . . . . }

Carbonato de sosa. . . . . } aa 3 j

Cola de Flandes. . . . . } aa 3 j

Petroleo rectificado. . . . . gotas xx

Agua destilada. . . . . lb j

Se disuelve y se filtra.

Los baños de agua de Baréges convienen en las enfermedades cutáneas, en las úlceras y fistulas, en las efec-

ciones nerviosas atónicas, en las parálisis y reumatismos crónicos. Estas aguas se aplican á chorro para resolver los tumores artríticos, exostoses y anquiloses. Interiormente se prescriben en las enfermedades catarrales crónicas de pecho, en el asma, obstrucciones de las víceras, y en los afectos venéreos que se han resistido á los remedios generales. Dichas aguas son incisivas y diuréticas. Su dosis es de media azumbre á dos pintas por día, según las circunstancias y las fuerzas del enfermo. P.)



## BEBIDA ANTIFLOGÍSTICA

DE STOLL.

Cebada mondada. . . . . 3 lj

Póngase á hervir en suficiente cantidad de agua hasta que reviente en los granos.

Añádese á la colatura, que debe ser de dos libras,

Nitrato de potasa. . . . . 3 j 6

Xarabe de vinagre. . . . . 3 ij

La dosis de esta bebida es una taza cada hora. Es útil en las calenturas inflamatorias.



y en la esquinencia dicha bebida es muy análoga á la tisana de Tissot.

## BEBIDA ANTINARCÓTICA

DEL D<sup>r</sup>. VAN-MONS.

Café tostado. . . . . 3 iij

Vinagre. . . . . 3 xij

Caléntese todo junto hasta la evulcion en seguida cuélese y añádese

Azucar. . . . . 3 ij

Se dan dos cucharadas calientes cada cuatro horas á los sujetos que han abusado del opio.



## BIZCOCHOS PURGANTES.

Jalapa. . . . . 3 v B

Azucar. . . . . 3 jv

Harina. . . . . 3 jv

Huevos. . . . . n.º 6

Para 15 bizcochos.

Para purgar á un niño de cuatro ó cinco años se le dá uno de estos bizcochos. A un adulto se le pueden dar dos.

## BIZCOCHOS VERMÍFUGOS.

Azucar en polvo. . . . .	℥ ʒ
Harina. . . . .	3 ij
Semen-contra en polvo. . . . .	3 j
Huevos. . . . .	n.º 6
Esencia de cidra. . . . .	gotas xv
Para 24 bizcochos.	

Se dá uno de estos bizcochos por la mañana y otro por la tarde á los niños que tienen lombrices.



## BOLO DIAFORÉTICO INGLÉS.

Resina de guayaco en polvo. .	granos x
Flores de azufre. . . . .	} aa 3j
Cremor de tártaro. . . . .	
Xarabe comun q. s.	

Se toma este bolo en dos dosis en un dia. Conviene en los dolores reumáticos y en las enfermedades cutáneas, y tambien se prescribe en la esquinencia.

Conviene particularmente en los reumatismos crónicos y en la esquinencia inflamatoria. P.

## BOLO FORTIFICANTE DE DESBOIS.

Polvos de genciana. . . . .	} āā gr. xij
— de zedoaria. . . . .	
— de azafran. . . . .	
Bálsamo de copaiva. . . . .	3 ij
Elixir de propiedad. . . . .	gotas xx

Xarabe de yerba buena, cantidad suficiente para hacer veinte y cuatro bolos.

Se dan seis por día repartiéndolos en tres dosis. Son útiles en el último estado de las gonorreas, flores blancas crónicas y en la debilidad de estómago.

## BOLOS CARMINATIVOS DE DESBOIS

DE ROCHEFORT.

Extracto de centaurea menor. . . . .	} āā gr. xxxv
— Triaca. . . . .	
Raiz de genciana. . . . .	} pulverizados āā gr. xij
— de angélica. . . . .	
Anís en polvo. . . . .	gr. xvj
Castoreos id. . . . .	gr. vj
Aceyte esencial de anís. . . . .	gotas x á xij
— de canela. . . . .	gotas jv
Xarabe de yerba buena q. s.	

Divídese en treinta bolos, de los que se toman tres cada cuatro horas.

## BOLO ESTOMÁTICO DE PARMENTIER.

Azafran en polvo. . . . . granos vj  
 Canela pulverizada. . . . . granos iij  
 Magnesia pura. . . . . granos viij  
 Xarabe de azucar q. s.  
 Mézclese , hágase un bolo.

## BOLO ANTI-ESPASMÓDICO (1)

DE BUCHAN.

Serpentaria virginiana. . . . . 3 ℥  
 Asafétida. . . . . granos xij  
 Alcanfor. . . . . granos vj  
 Hágase un bolo con s. q. de xarabe de  
 azafran.

## OTRO DEL MISMO.

Serpentaria virginiana en polvos. . 3 j  
 Alcanfor. . . . . }  
 Asafétida. . . . . } ʒ x  
 Extracto gomoso de opio. . . . . ʒ j  
 Arrope de sauco q. s.

Estos bolos se dan á la dosis de cinco á seis en los vapores histericos, afecciones nerviosas y vaidos.

---

(1) Anti-espasmódico quiere decir contra la contraccion involuntaria de los músculos, producido por un efecto nervioso.

## BOLO DIGESTIVO DE SMITH.

Ipecacuana. . . . . ℥ ij á jv

Polvo diaromaton. . . . . ℥ x

Xarabe de canela, q. s.

Para hacer un bolo que se toma al momento de acostarse.

Este bolo conviene á los sugetos que tienen el estómago estragado de resultas de una dispepsia ó indigestion.

## BOLO DE SWEDIAUR

CONTRA LA PARALISIS.

Semilla de mostaza blanca. . . . . 3 ℔

— de alcarabea. . . . . } 3℔ ℥ jv

Canela. . . . . }

Se pulveriza y se añade

xarabe de gengibre q. s. (1).

Para hacer un bolo.

Se prescriben dos al dia y á veces se añaden cuatro gotas de aceyte esencial de trementina.

---

(1) El xarabe de gengibre se prepara por infusion como el de la corteza de naranjas.



## CANDELILLAS DE DARAN.

Hojas de cicuta. . . . .	} $\overline{a}$ un puñado.
—de tabaco. . . . .	
—de loto oloroso (I). . . . .	
Flores de hipericon. . . . .	
Aceyte de nueces. . . . .	$\mathfrak{H}$ x
Estiercol de oveja (cagarruta). . . . .	$\mathfrak{H}$ ij

Se chafa el estiercol, y se deslíe en el aceyte, con el que se hacen cocer las plantas arriba indicadas; se cuele el aceyte y se vuelve al fuego con

Sain ( <i>aceyte de sardina</i> ). . . . .	} $\overline{a}$ . $\mathfrak{H}$ ij
Sebo de carnero. . . . .	

Se derrite todo, y cuando la mezcla está caliente y bien líquida se le mezcla

Litargirio en polvo. . . . .  $\mathfrak{H}$  viij

Cuando está esta perfectamente incorporado, se añade .

Cera amarilla. . . . .  $\mathfrak{H}$  ij

Se continúa á menear hasta que el todo parezca homogéneo.

Se empapan en esta composicion los trapos á quienes se dá la forma de candelitas.

Véase las modificaciones de esta receta en la tabla de materias de la *medicina domestica de Buchan*.

(I) Es el meliloto officinal, ó trebol oloroso. N. T.

# CATAPLASMA ANTIHELMINTICA

## Ó CONTRA GUSANO.

Hojas de agenjo. . . . .	} āā 3 ilj
— de tanaceto. . . . .	
Gota-gamba. . . . .	} 3 j 3 jv 3 j
Acibar socotrino. . . . .	
Incienso. . . . .	
Asafétida. . . . .	

Pulverícese separadamente cada una de estas substancias; añádese, si es menester, una corta cantidad de polvos de agenjo, á fin de facilitar la pulverizacion del asafétida; en seguida mézclese todo, y añádese suficiente cantidad de aceyte de espliego para una cataplasma de consistencia un poco fuerte.

# CATAPLASMA ISQUIÁTICA

## DE WILLIS.

Semilla de mostaza. . . . .	3 viij
Pimienta blanca. . . . .	} āā 3 j .
Gengibre. . . . .	

Oximiél simple, q. s. para hacer una cataplasma.

Esta cataplasma se emplea en la isquiática. Es una especie de rubefaciente que muchas veces produce vespigas á la piel como un sinapismo.



CÁUSTICO DE F. COSME. Véase POLVOS  
ANTICARCINOMATOSOS DE F. COSME.



CERATO DEL Dr. HUFELAND.

Cerato blanco de ballena. . . . .	3 j
Oxido de cinque sublimado y lavado . . . . .	} 7a 3 xxxvj
Lycopodio ó pedo de lobo en polvo. . . . .	

Mézclese para formar una pomada que se conserva en un lugar fresco.

Se usa en la ulceracion de los párpados, y para secar algunas llagas ligeras. . . . .

CERATO DE TURNER.

Acceyte de olivas. . . . .	7a 3
Cera blanca. . . . .	} 7a 3 vj
Piedra calaminar porfirisada. . . . .	

Se hace derretir la cera en el aceyte, y cuando la mezcla haya tomado un poco de consistencia, añádese la piedra calaminar; apíte e largo tiempo para que la mezcla sea perfecta, en mortero de piedra.

Este cerato conviene en las que-



maduras y escoriaciones, sea cual fuere la causa.

(Despues de la inflamacion P.)

## CERATO DE POTT.

Litargirio. . . . . ℥ j  
 Vinagre. . . . . ℥ viij  
 Xabon blanco . . . . . 3 viij

Mézclese todo junto y cuézase la mezcla hasta que toda la humedad esté disipada. teniendo cuidado de menearla continuamente; en seguida añádese

Aceyte de olivas. . . . . } ℥ j  
 Cera amarilla. . . . . } ℥ j

Este cerato se usa en las fracturas y en las úlceras.

## CERATO DE RECHOUX.

Carbonato de amoniaco concreto. 3 j  
 Cerato de Galeno sin agua. . . . 3 j

Tritúrese en un almirez de marmol para formar una mezcla exacta y uniforme.

Se usa en fricciones sobre el cuello, en dosis de una dracma, de cuatro en cuatro horas, en los casos de croup (1) de los niños.

---

(1) Tos convulsiva. N. T.

## CERATO MERCURIAL DE FALCH.

Precipitado rojo. . . . . 3 jv

Muriato de mercurio dulce. . . 3 ij

Se porfirizan estos polvos mezclados y añádese

Acetato de plomo cristalizado. 3 j

Mézclese de nuevo, é incorpórese todo con un cerato hecho con

Cera blanca. . . . . 3 j

Aceyte de nueces. . . . . 3 vj

Aceyte esencial de espliego. . . gotas xxx

Se pone este cerato sobre las úlceras venéreas y sobre algunos herpes rebeldes.

## CERATO DE KIRKLAND.

Creta preparada. . . . . } aa 3 jv

Vinagre destilado. . . . . }

Aceyte de olivas. . . . . 3 viij

Diaquilon simple. . . . . 3 xjv

Acetato de plomo líquido. . . . .

Se mete en una pequeña vacía el vinagre con la creta; y cuando la efervescencia ha pasado, se añade el aceyte y el emplasto que se hace derretir á fuego lento, meneando continuamente con una espátula de madera. Cuando la licuacion está completa, se retira el vaso del fuego; y cuando la mezcla empieza á enfriarse, se echa poco á poco el acetato de

plomo líquido, agitando hasta que la masa esté enteramente fría, y la mezcla exacta.

Este cerato es desecante.

### CERATO OPIADO DEL DR. LAGNEAU.

Cerato simple. . . . . 3 ij  
 Opio sin depurar . . de 15 granos á 3 j  
 Yema de huevo. . . . . n.º I.

Se deslie el opio en polvo fino con la yema de huevo, despues se mezcla todo con el cerato. A veces es ventajoso añadir á esta mezcla una dracma de alcanfor. Se emplea en las fisuras, en las úlceras y en los caneros dolorosos.



### CEROMIEL DEL DR. AITKEN.

Cera blanca ó amarilla. . . . . 3 j  
 Miel. . . . . 3 jv

Háganse derretir y mézclense.

Esta mezcla es preferible á muchos ungentos para mundificar y consolidar las úlceras.



## CERVEZA ESTOMACAL INGLESA.

Raiz de genciana. . . . .	3 jv
Corteza de limon. . . . .	3 iij
Canela. . . . .	3 ij
Cerveza llamada <i>Ala</i> (1). . . .	8 pintas.

Estos ingredientes se cortan en pequeños pedazos, y se dejan en infusion fria por espacio de dos ó tres dias.

Su dosis es un vaso mañana y tarde.

## CERVEZA DIURÉTICA INGLESA.

Semillas de mostaza. . . . .	} 3 viij
Bavas de enebro majadas. . . .	
Semillas de zanahoria cultivada. . . .	3 vj
<i>Ala</i> (cerveza) reciente. . . .	40 pintas.

Esta bebida se prescribe en las enfermedades de la vegiga y en la hidropesía incipiente.

## CERVEZA PURGANTE INGLESA.

Sen. . . . .	3 iv
Cogollos de centaurea menor. . . .	} 3 iij
— de agenjo. . . . .	
Acibar socotrina. . . . .	5 jv
<i>Ala</i> (cerveza). . . . .	40 pintas.

(1) *A'a* (*ai'e*). Así se llama una cerveza ligera que contiene poquísimo lúpulo.

Se toma de esta cerveza medio ses-  
tario ( pintas  $\text{iv}$  ) dos veces al dia pa-  
ra tener el vientre libre.

## CERVEZA ANTI-ESCORBÚTICA, Ó ABETA.

Hojas recientes de coclearia. . . . .	$\text{ʒ} \text{ j } \text{ʒ}$
Raiz de rábano rústico. . . . .	$\text{ʒ} \text{ ij}$
Yemas de abeto. . . . .	$\text{ʒ} \text{ j}$
Cerveza. . . . .	$\text{ʒ} \text{ jv}$

La dosis es dos onzas por dia y  
aun mas en el escorbuto.

## CERVEZA PURGANTE DE SIDENHAM.

Polipodio de encima. . . . .	$\text{ʒ} \text{ j}$
Rapontico. . . . .	} $\text{ʒ} \text{ vij}$
Sen mondado. . . . .	
Pasas. . . . .	} $\text{ʒ} \text{ iij}$
Ruibarbo. . . . .	
Rabano rústico. . . . .	} $\text{ʒ} \text{ vj}$
Hojas de coclearia. . . . .	
— de salvia . . . . .	$\text{n.}^{\circ} \text{ 4}$
Naranjas en pedazos. . . . .	$\text{45 pintas.}$
Ale ( cerveza ). . . . .	

# CERVEZA ANTI-ESCORBÚTICA

## DE BUTLER.

Betónica. . . . .	} aa un puñado
Salvia. . . . .	
Agrimonia. . . . .	
Coclearia. . . . .	
Agajo pontico. . . . .	} aa . . . 3j
Raíces de emula campana.	
— de rábano rusticano.	
Cerveza reciente . . .	ltres ó pintas xvj

Se meten las yerbas y las raíces en un saquito de tela que se sumerge en la cerveza mientras fermenta.

Purga con suavidad. Se da en dosis de una pinta por la mañana, por el espacio de quince días, en las sacuradas burras abdominales, en la caquelaxia escorbútica, biliosa, reumática, &c.

# CERVEZA CEFÁLICA INGLESA.

Raiz de valeriana silvestre. . .	3x
Semillas enteras de mostaza. .	3vj
Serpentaria virginiana. . . . .	3ij
Romer. ó salvia. . . . .	3iij
Cerveza blanca reciente. . . . .	lb lxxx

Se da esta bebida en la parálisis alferecía y vertigos. El enfermo

ma cuatro ó cinco vasos de ella por dia.

Pero importa distinguir cual es la verdadera causa de estas enfermedades. Este remedio no conviene sino cuando se trata de excitar y de promover revulsion. P.

### CERVEZA DE QUINA DE MUTIS

LLAMADA PROFILÁCTICA (I).

Quina roja. . . . .	} aa 3 jv
— parda . . . . .	
— amarilla. . . . .	3 viij
Canela. . . . .	3 jv
Nuez moscada. . . . .	n <sup>o</sup> . I
Azucar. . . . .	℥ viij
Cerveza. . . . .	℥ 100

Esta cerveza se destina para los convalecientes de enfermedades agudas.

### COCIMIENTO ANTI-ARTRÍTICO DE QUARIN.

Zarzaparrilla. . . . .	3 jv
Antimonio envuelto en una muñeca. . . . .	3 vj

(1) Provechosa en cuanto es preservativa. N.T.

Se hace hervir en once libras de agua hasta la reduccion de la mitad y se añade

Regaliz. . . . . 3 j  
Simiente de anis. . . . . 3 ij

Se pone en infusion durante un cuarto de hora y se cuela.

La dosis que se ha de tomar varia segun la constitucion del enfermo y la continuacion de la enfermedad.

### COCIMIENTO DE ACIBAR COMPUESTO. *Pharmacopeya Londinensis.*

Extracto de regalicia. . . . . 3 jv  
Sub-carbonato de potasa. . . . . 3 ij  
Extracto de acibar. . . . . }  
Mirra. . . . . } aa 3 j  
Azafran. . . . . }  
Agua. . . . . 1b j

Se hace hervir hasta la reduccion de doce onzas. Se cuela y se añade tintura de cardamomo compuesta. . . . . 3 jv  
(Véase esta tintura en la tabla.)

Este cocimiento es estimulante, estomacal, emenagogo, hemorroidal y puede convenir en las obstrucciones inveteradas. Es muy enérgico, y no debe emplearse sino en dosis moderada, que se aumenta gradualmente. P.



## COCIMIENTO ANTISÉPTICO

DE BOERHAAVE.

Hojas de escordio. . . . .	} ʒā 3 ij
— de aliaría. . . . .	
— de marrubio blanco. . .	

Hágase hervir con cuatro libras de agua;  
añádese

Oximiél escilítico. . . . .	ʒ viij
Nitrato de potasa. . . . .	ʒ liij
Vinagre teriacal. . . . .	ʒ j

Se da este cocimiento en las pleuresias en dosis de dos onzas cada cuarto de hora.

Este cocimiento no puede convenir sino es cuando han calmado los síntomas inflamatorios, ó en los temperamentos húmedos, ó bien en las pleuresias pútridas. P.

## COCIMIENTO BLANCO DE SIDENHAM.

Carbonato de cal puro (1). . . . .	3 vj
Miga de pan blanco. . . . .	3 ij
Azucar. . . . .	3 iij
Agua hirviente. . . . .	℥ ij
Agua de canela. . . . .	3 jv
F. S. A. (2)	

Este cocimiento se administra en las diarreas crónicas, en el último estado de las disenterias; y después de los envenenamientos que han irritado los intestinos. El enfermo toma un vaso de este cocimiento cada hora.



## COLIRIO DEL Dr. SCARPA.

Acetato de plomo líquido. . . . .	℥ iij
Agua destilada de llanten. . . . .	3 vj
Mucílago de goma tragacanto. . . . .	3 jv
Alcool alcanforado ( algunas gotas. )	

Este colirio se emplea al principio

(1) O asta de ciervo calcinada.

(2) El carbonato de cal puro es confundido aquí con lo que llamamos *creta*; aquel no es medicinal, y esta lo es, pues se hace cocimiento blanco con ella, pero no es tampoco un verdadero equivalente de hecho con el asta de ciervo calcinada, cuya substancia es un fosfato de cal. N. T.

tibio, en seguida frio en el segundo período de la oftalmia aguda.

## COLIRIO DE BRUN.

Acibar hepático en polvo. . . . . 3 j  
 Vino blanco. . . . . } 3 j β  
 Agua de rosas. . . . . }  
 Tintura de azafran. . . . . gotas xxx

Se pone á hervir el acibar con el vino blanco y se filtra el licor, al cual se añade el agua de rosas y la tintura.

Este colirio limpia las ulcerillas de los párpados:

## COLIRIO SECO DEL DR. LAGNEAU.

Azucar piedra en polvo. . . . . } 3 j β  
 Tucia ó nitrato de potasa (1). . . . . }

Se usa para quitar las manchas de la córnea, ó despues de las oftalmias venéreas. Es preciso que los polvos esten muy finos. Estos se soplan al ojo por medio de un cañon de pluma.

---

(1) Hay mucha diferencia de los efectos del nitro á los de la tucia, el nitro puede ser sospechoso administrado en la misma dosis que la tucia, y de consiguiente no puede ser indiferente usar el uno por el otro. N. T.

## COLIRIO DE JANIN.

Agua de llanten. . . . .	3 jv
Sulfato de zinque. . . . .	5 v
Mucilago de semillas de membrillo. . . . .	3 jv
M. F. S. A.	

Este colirio conviene en la inflamacion crónica de los párpados.

## COLIRIO DE GIMBERNAT.

Agua destilada. . . . .	3 j
Potasa cáustica. . . . .	8 ij
Mézclese.	

De tiempo en tiempo se hacen penetrar algunas gotas dentro del ojo para quitarle las manchas. Se lava en seguida el ojo con un cocimiento mucilaginoso.

## COLIRIO DEL DR. NEWMANN.

Flores de arnica. . . . .	3 j
Vinagre destilado. . . . .	16 j

Se hace hervir y digerir durante cuatro horas; en seguida se añade carbonato de amoníaco hasta saturacion completa.

Este colirio se usa contra la catarata usando al mismo tiempo interiormente la infusión de árnica.

## COLLAR DE MORAND

CONTRA LA PAPERAS.

Este collar se hace con tafetan negro sobre el cual se pone una cardada de algodón, y sobre esta cardada se estienden los polvos siguientes.

Muriato de amoniaco. . . . .	} aa
Muriato de sosa decrepitado. . . . .	
Esponja calcinada sin lavar. . . . .	

Se cubre todo con una muselina que se acolcha por cuadros ó rombos.

Se aplica este collar sobre la papera por el lado de la muselina. Es preciso llevarle dia y noche y renovar los polvos cada mes poco mas ó menos.

## CONFECION JAPÓNICA.

Catecu en polvo. . . . .	3 iij
Raiz de tormentila. . . . .	} 3 ij
Nuez moscada. . . . .	
Incienso. . . . .	
Opio disuelto en suficiente cantidad de vino de Portugal. . . . .	3 jß
Xarave de azúcar. . . . .	} 3 jv
Conserva de rosas. . . . .	

Mézelese todo; hágase un electuario.

Se dá este remedio desde veinte y cuatro granos hasta dos escrúpulos. Él puede suplir por el diascordio. Es fortificante, estomacal, calmante y ligeramente astringente.

## CONFECION JAPÓNICA.

SEGUN LA FARMACOEPA DE EDIMBURGO.

Catecu purificado. . . . .	℥ jv
Gomakino. . . . .	℥ iij
Canela. . . . .	} ʒā 3 j
Nuez moscada. . . . .	
Estracto de opio. . . . .	3 jβ
Xarabe de canela, q. s.	

Tres dracmas de este electuario deben contener un grano de opio.

Se pulverizan separadamente el catecu, la gomakino, la canela y la nuez moscada para formar unos polvos; se deslie el opio en suficiente cantidad de vino blanco de España, despues se mezcla, y se incorpora todo con suficiente cantidad de xarabe de canela que se hace espesar hasta consistencia de miel.

# CONFECCION DE RUDA.

(*Pharmacopeia Londinensis.*)

Hojas secas de ruda. . . . .	} āā 3 j β
Simiente de alcaravea. . . . .	
Bayas de laurel. . . . .	
Sagapeno. . . . .	3 jv
Pimienta negra. . . . .	5 ij
Miel. . . . .	3 vj

Se pulverizan las sustancias secas que se incorporan con la miel.

Es calefaciente, estomacal, resolutive, sudorífica, diurética, emenagoga, carminativa; útil á los temperamentos frios, inertes, linfáticos; en la clorosis y efectos verminosos, &c. P.



## CONSERVA ANTIESCORBÚTICA

DEL DR. SELLE.

Coclearia. . . . .	} āā partes iguales
Berros. . . . .	
Trifolio acuatico. . .	
Zumo reciente de rabano rusticano. . .	
Zumo de naranja agria.	
Azucar blanco, s. q.	
Hágase una conserva.	

Se administra en dosis de dos á tres dracmas por día.



### CREMA PECTORAL DE TRONCHIN.

Manteca de cacao. . . . .	3 ij
Azucar blanco. . . . .	5 jv
Xarave de bálsamo tolutano. .	} aa 3 j
— De culantrillo. . . . .	
Mézclese.	

Se toma esta crema á cucharadas de las de tomar café en la tos seca y tenaz.

### OTRA DE M. JEANET DES LONGROIS.

Manteca de cacao. . . . .	} aa 3 j
Xarave de amapola. . . . .	
Agua de azahar. . . . .	
Leche de almendras dulces. . .	
Mézclase.	

Se toma del mismo modo que la precedente.



### DIGESTIVO DE PLENCK.

Trementina clara. . . . .	3 ij
Vino de Borgoña. . . . .	3 ij
Miel común. . . . .	3 jv
Agua común. . . . .	3 jv
Alcool. . . . .	3 jv

M. S. A.



Este digestivo acelera la supuración. Como es líquido se inyecta en la hondura de las llagas.



## ELECTUARIO DE QUARIN,

CONTRA LA HIDROPESIA.

Arrope de yezgo. . . . .	} $\overline{\text{ss}}$ 3 ij
— de eucbre. . . . .	
Oximiél escilitico. . . . .	3 j
Raiz de J. lara. . . . .	3 jv
Sulfato de potasa. . . . .	3 ij
Xarave de ramn catártico. q. s.	

Se toma un dracma de él por intervalos muy certos, hasta que se hayan logrado evacuaciones suficientes.

## OTRO DEL MISMO

PARA DESPUES DE LA EVACUACION  
DE LAS AGUAS.

Quina. . . . .	3 jv
Limaduras de hierro resplandecientes. . . . .	} $\overline{\text{ss}}$ 3 ij
Triaca elatesareu. . . . .	
Xarave de canela, q. s.	

Se toma igualmente una dracma de este electuario mañana y tarde.

## OTRO DEL MISMO

PARA CUANDO LA HIROPESIA ESTA  
COMPLICADA CON LA CUARTANA.

Quina roja en polvo. . . . . 3 j

Raiz de genciana. . . . . } aa 3 j

Muriato amoniaco de hierro }  
sublimado. . . . .

Oximiel escilítico. . . . . } aa q. s.

Xarabe de las cinco raices }  
aperitivas. . . . .

La dosis es dos dracmas cada tres horas

## ELECTUARIO HIDRAGOGO

DEL DR. FOUQUIER.

Escamonea de alepo. . . . } aa 3 ij

Raiz de jalapa . . . . . }

Cachos de cebolla albarrana. . 3 j β

Resina de jalapa. . . . . 3 β

Xarabe de ranno catártico, q. s.

Se dá en las hidropesias asténicas<sup>35</sup>  
en dosis de 12 á 24 granos en for-  
ma de bolos. Es un purgante fuerte.

## ELECTUARIO BALSÁMICO

ASTRINGENTE DE BARTHEZ.

Conserva de rosas. . . . . 3 jv

Xarabe tolutano. . . . . 3 j

— de adormideras. . . . . 3 ij

Mézclese y hágase un electuario.

Conviene en los esputos de sangre, se da en dosis de cinco á seis cucharadas por dia de hora en hora. (Mas no deben olvidarse los remedios generales, cuando están indicados. P.)

### ELECTUARIO ANTI-CAQUÉCTICO DEL DR. WARD.

Raiz de énula campana en polvo.	℥ ij
Simiente de hinojo. . . . .	℥ iij
Pimienta negra. . . . .	℥ j
Mézclese en un almirez y añádase	
Azucar blanco. . . . .	} aa ℥ ij
Miel. . . . .	

Se toman una ó dos dracmas de este electuario dos ó tres veces al dia, en la caquexia hemorroidal, dispepsia ó catarro de las vísceras.

### ELECTUARIO SEDATIVO ASTRINGENTE DE EDIMBURGO.

*Veáse CONFECION JAPONICA. ..*

### ELECTUARIO ANTI-ELMÍNTICO DE VOGLER.

Semen contra. . . . .	℥ ij
Raiz de jalapa. . . . .	℥ j
Mercurio dulce bien lavado. . .	℥ vj á xj
Agua de canela. . . . .	℥ β
Xarabe de flores de persicó, q. s.	

Se dá este electuario á los sujetos que tienen ascáridas, lombrices ó aténia

Las dosis para los niños de dos á cuatro años es la duodécima parte de la masa arriba indicada; para los de cinco á ocho, la octava parte; para los adultos la cuarta y aun mas. Se toma por la mañana envuelto en hostia mojada; bebiendo despues una taza de infusion amarga.

## ELECTUARIO VERMIFUGO

DE SPIELMANN.

Estafío puro. . . . . } ʒ 3i  
 Mercurio líquido destilado. . . . . } ʒ 3i

Hácese una amalgama S. L. Añádese

Carbonato de cal purificado. } ʒ 3j  
 Magnesia inglesa. . . . . } ʒ 3j  
 Conserva de agenjos. . . . . ʒ iij

Méclese exactamente con xarabe de yerba buena, q. s. para dar á la mezcla la consistencia de electuario.

Todos los dias se dá una dracma mañana y tarde.

## ELECTUARIO ANTIELMÍNTICO

DE HEISTER.

Mercurio vivo. . . . . ʒ iv

Se extingue cuidadosamente en una onza de mucilago de goma arabiga, y se añade

Quina en polvo. . . . . ʒ j

Xarabe de yerba buena q. s. para dar á la mezcla la consistencia de electuario.

La dosis varía segun la edad del enfermo: ordinariamente es del grueso de una avellana, mañana y tarde.

## ELECTUARIO ANTI FEBRIL

*Farm. de Viena.*

Conserva de agnjo. . . . .	} 3 vij
— de coclearia. . . . .	
Quina en polvo. . . . .	
Xarabe de fumaría s. q.	

Se dá este dosis de tres á cuatro dracmas por dia.

## ELECTUARIO DE MAGNESIA

*Farm. de Copenhague.*

Carbonato de magnesia. . . . .	3 vj
Polver de simiente de anís. . . . .	3 jv.
Azafran en polvo. . . . .	5 j
Xarabe de achicorias compuesto s. q. pa- ra hacer segun arte un electuario.	

Se dá á los niños de teta cuando padecen agrios. La dosis es segun la edad, desde media dracma hasta dos.

## ELECTUARIO ANTI-FEBRIL DE BOERHAAVE.

Confeccion de alkermes. . . . . 3j  
 Gengibre conitado. . . . . 3vj  
 Raiz de contra yerba. . . . }  
 —Serpentaria virginiana. } aa 3j

Xarabe de las cinco raices aperitivas, q. s.

Se toma media dracma cada cuatro horas en las calenturas adinámicas é intermitentes.

## ELECTUARIO ANTI-ARTRÍTICO DE BUCHAN.

Conserva de rosas. . . . . 3ij  
 Cinabrio de antimonio. . . . . 3jß  
 Raiz de guayaco en polvo. . . 3j  
 Xarabe de gengibre, q. s.

Se usa este electuario en dosis de una cucharada de café dos veces al día, en los dolores agudos del reumatismo, cuando no van acompañados de calentura.

## ELECTUARIO ANTI-HEMORROIDAL DE REUSS.

Maná en lágrimas. . . . . 3ij  
 Sulfato de potasa. . . . . }  
 Nitrato de potasa. . . . . } aa 3ij  
 Magisterio de azufre. . . . }

Miel blanca, cantidad suficiente para dar a la mezcla consistencia conveniente.

Se prescribe en dosis de dos ó tres dracmas por dia.

### ELECTUARIO ANTI-DISENTÉRICO DE BUCHAN.

Confeccion japónica. . . . . 3 ij  
Bálsamo de Lucatelli. . . . . 3 j  
Ruibarbo en polvo. . . . . 3 jv  
Xarabe de malvavisco, q. s.  
Mézclese y fórmese un electuario.

Se toma una cantidad como el grueso de una nuez moscada, dos ó tres veces al dia, segun lo exigen los casos.

(Este electuario no puede ser conveniente sino es cuando terminan las disenterias. P.)

### ELECTUARIO ANTI-DISENTÉRICO DE WILKINSON.

Angustura en polvo. . . . . 3 jv  
Canela en polvo. . . . . ʒ 36  
Miel blanca, q. s.

Este electuario se da en dosis de una dracma mañana y tarde.

(Conviene en la diarrea, calentura adinámica, ictericia, y en la disenteria inglesa. P.)

## ELECTUARIO ANTI-EPILÉPTICO DE MEAD.

Quina en polvo. . . . .	3 j
Estaño en polvo. . . . .	} an 3 jv
Raiz de valeriana. . . . .	
Xarabe de azucar ó miel, q. s.	

Se dá este electuario en dosis de una dracma mañana y tarde, por espacio de tres meses, interrumpiendo el uso de este remedio cada nueve ó diez dias durante veinte y cuatro horas.



## ELIXIR DE VIDA DE MATHIOLO.

Raiz de galanga menor. . . . .	} an 3 jv
— Gengibre. . . . .	
— Zedoaria. . . . .	
— Calamo aromático. . . . .	} an 3 ij
— Cogollos de mejorana. . . . .	
— De yerba buena. . . . .	
— Tomillo. . . . .	
— Serpol. . . . .	
— Salvia. . . . .	
— Romero. . . . .	} an 3 ij
Rosas rubias. . . . .	
Simiente de anís. . . . .	
— de hinojo. . . . .	} an 3 ij
Canela. . . . .	
Clavos. . . . .	} an 3 b
Nuez moscada. . . . .	
Macias. . . . .	} an 3 j
Cubebas. . . . .	
Leño aloes. . . . .	
Sándalo cetrino. . . . .	} an 3 j
Cortadísimo menor. . . . .	
Cortezas recientes de limon. . . . .	
Alcool de 30 grados. . . . .	3 j 6 1b v



Este elixir se usa en la epilepsia. Es cordial y vulnerario. Su dosis es de una dracma hasta cuatro.

# ELIXIR AL KERMES DE LOS ITALIANOS.

Nuez moscada. . . . .	} ʒ 3 j
Clavos. . . . .	
Canela. . . . .	
Macias. . . . .	
Alcool. . . . .	pintas jv

Se machacan todas estas sustancias, y se ponen en maceracion en el alcool durante siete ú ocho dias. Despues se disuelven en cuatro pintas de agua.

Azucar. . . . .	ʒ ʒ jv
Se mezclan estos dos licores, y se coloran con el xarabe de kermes ó con	
Alumbre. . . . .	ʒ j ʒ
Cochinilla. . . . .	ʒ j
Se filtra y se conserva para el uso.	

Este elixir se dá en dosis de un vasito de ratafia: se aconseja en las indigestiones, en la debilidad de estomago, y en los colicos ventosos. Cuando se desea que sea mas agradable, es menester destilar la infusion alcoolica, y aumentar por una cuarta parte la proporcion del azucar.

# ELIXIR DE DROGA AMARGA

## DE LOS INDIOS.

Acibar. . . . .	℥ iij
Mirra. . . . .	℥ ij
Almaciga en lágrimas. . . .	℥ ij
Incienso. . . . .	℥ j
Azafran. . . . .	℥ jv
Aguardiente. . . . .	50 pintas.

Se machacarán todas estas sustancias separadamente, á escepcion del azafran que se pica lo mas menudo que sea posible. Se hace macerar todo en el aguardiente por espacio de seis meses, agitando con frecuencia la mezcla. Despues de este tiempo, se destila para obtener las dos terceras partes del aguardiente empleado. Se añade lo que basta de azucar, para formar un licor agradable, el que se usa despues de comer. El residuo de la destilacion filtrado, se usa en dosis de un vasito de licor por la mañana en ayunas como tónico, ó en mayor dosis como purgante.

## ELIXIR DE MITHIÉ.

Canela. . . . .	}	3ā 3 ij
Pimienta larga. . . . .		
Galanga menor. . . . .		
Gengibre. . . . .		3 R
Nuez moscada. . . . .		3 j
Cardamomo menor. . . . .		3 j
Clavos. . . . .		3 j
Alcool. . . . .		3 vj

Este elixir es estomacal. Se dá en dosis de dos hasta cuatro dracmas.

## ELIXIR ÁCIDO AROMÁTICO

DE BRUGNATELLI.

Alcool. . . . .		3 xxjv
Ácido sulfúrico. . . . .		3 iij
Canela. . . . .	}	3ā 3 iij
Clavos. . . . .		
Gengibre. . . . .		
Hojas de yerba buena piperita. . . . .	}	3ā 3 jv
— de yerba buena hortense. . . . .		

Primero se mete el alcool y el ácido en un matraz que se coloca en un baño de arena á la temperatura de 35 grados, y que se mantiene así durante dos días; se añaden despues las otras sustancias, y se dejan en infusion á la temperatura de la atmósfera durante cinco ó seis días; se cuela despues por expresion, se filtra y se conserva el licor en un frasco de cristal tapado con tapon de lo mismo esmerilado.

Se dá este elixir en las hemorragias pasivas y en las calenturas asténicas, en dosis de doce hasta cuarenta y ocho gotas con un vehículo apropiado.

## ELIXIR PECTORAL INGLÉS.

Raíces de éncula campana.	} ʒ iij ʒ j
— de lirios de Florencia.	
Cachos secos de cebolla albaricapa. . . . .	
Raíces de rosellina. . . . .	} ʒ j ʒ xvij
Simiente de anís. . . . .	
Azafran. . . . .	ʒ xvij
Mejill. . . . .	ʒ ij
Mirra. . . . .	ʒ j ʒ xvij
Goma amoníaco. . . . .	ʒ ij
Aguariente de 22. <sup>o</sup> . . . . .	ʒ xxij

Póngase todo en maceración por espacio de quince días en un matras. Agítese de tiempo en tiempo. Filtrese.

Este elixir es pectoral, estomacal y carminativo. Su dosis es desde media dracma hasta dos en una taza de infusión apropiada.

(Conviene particularmente en los catarros crónicos. P.)

# ELIXIR BALSÁMICO, ESTOMÁTICO Y TEMPERANTE DE OFFMAN.

Estracto de agenjos. . . . .	} 3 i
— de cardo santo. . . . .	
— de centaurea menor. . . . .	
— de genciana. . . . .	
Cortezas de naranjas agrias. . . . .	3 iv
Vino de España. . . . .	3 ij
Tintura de cortezas de naranjas agrias. . . . .	3 ij
Carbonato de potasa. . . . .	3 i

Dejese digerir esta mezcla durante ocho dias; agítese con frecuencia el matras, fíltrese.

Este elixir conocido tambien con el nombre de vino amargo alcalino, es un poderoso estomacal, antiehmático y febrifugo. Estimula el apetito. La dosis es desde una dracma hasta dos.

## ELIXIR BALSÁMICO DE WERLHOFF.

Quina. . . . .	3 i 3
Estracto de cardo santo. . . . .	} 3 ij
— de genciana. . . . .	
Mirra eugenia. . . . .	3 i 3
Cortezas de naranjas agrias. . . . .	3 i
Azulran. . . . .	3 iv
Carbonato de potasa. . . . .	3 iv
Vino de España. . . . .	3 ij

Se deja digerir la mezcla durante cuatro ó cinco dias, y se filtra.

Este elixir se usa en los mismos

casos que el elixir estomacal y atemperante de Hoffman.

### ELIXIR FORTIFICANTE DEL DR. SELLE.

Estracto de cascarilla. . . . .	} aa 3 j
— de genciana mayor. . . . .	
Agua de yerba buena piperita. . . . .	℥ jv
Tintura de marte astringente. . . . .	3 jv

Se dan algunas cucharadas por día de este elixir en la debilidad de estómago é intestinos, despues de las enfermedades adinámicas.

### ELIXIR ESTOMÁTICO

DE SOUGHTON.

Cogollos secos de aguejo mayor. . . . .	} aa 3 j
Camedrios. . . . .	
Raizes de genciana. . . . .	
Cortezas de naranjas agrias. . . . .	
Cascarilla. . . . .	5 j
Ruibarbo. . . . .	5 jv
Acibar. . . . .	5 j
Alcool. . . . .	℥ j

Este elixir es estomacal y vermifugo. La dosis es desde diez gotas hasta una dracma, con una taza de tisana apropiada.

## ELIXIR SAGRADO.

Ruibarbo machacado. . . . . 3 x

Acibar socrotino id. . . . . 3 vj

Semillas de cardamomo menor id. . . . . 3 jv

Aguardiente de Francia. . . . . I pinta.

Déjase en infusion dos ó tres dias; cuélese.

Se usa este elixir estomacal y purgante en dosis de una onza á onza y media. Es útil á los temperamentos húmedos.

## ELIXIR UTERINO DE CROLLIUS.

Estracto de artemisia. . . . . 3 j

Azafran. . . . . 3 jv

Castores. . . . . 3 ij

Carbonato de potasa. . . . . 3 j

Aceyte de anís. . . . .	} aa 3 B .
— de cominos. . . . .	
— de angélica. . . . .	

Alcool. . . . . 3 xx

Póngase en maceracion durante ocho dias antes de añadir los aceytes. Agítese y fíltrese.

(Este elixir es carminativo nervino, emenagogo. La dosis es de una á dos dracmas. P.)

## ELIXIR DE RAULIN.

Raices de genciana. . . . .	} aa 3 ij
Cortezas de naranjas agrias. . .	
Cogollos secos de agenjo mayor.	
— de camedrios. . . . .	
Ruibarbo. . . . .	} aa 3 ij
Hojas de sen. . . . .	
Cascarilla. . . . .	} aa 3 ij
Acibar socotrino. . . . .	
Aguardiente de 25. . . . .	℥ iv

Se pone en infusion fria durante ocho ó doce dias, y se filtra.

La dosis es de una cucharada que se toma al ponerse á comer ó cenar.

Si esta dosis tomada una vez no promueve algunos cursos, se reitera al dia siguiente.

Este elixir es útil en las enfermedades linfáticas y escrofulosas.

## ELIXIR ANTI-ESCORBÚTICO

DEL DR. SELLE.

Estracto aquoso de trifolio fibrino. . . . .	} aa 5 jv
— de centaurea menor. . . . .	
— de fumaria. . . . .	
— de grama. . . . .	
Agua destilada de manzanilla. . .	℥ iv
Esencia de coquearia. . . . .	℥ ij
Acido sulfúrico concentrado. . . .	℥ ij

Se da en dosis de dos cucharadas por dia.



# ELIXIR ANTI-ESCORBÚTICO

## DE BOERHAABE.

Simiente de mostaza. . .	} aa 3 j
— de rabano rústicano.	
— de oruga ( <i>Brásica</i> ).	
— de erísimo. . . . .	
— de berros. . . . .	} aa 2 puñados.
Hojas de coquearia. . . .	
— de lepidio. . . . .	
— de rabano rústicano.	

Se majan en un almirez de madera y se añade

Flores de lupulo. . . . . 3 j

Alcohol, s. q.

Destílese.

Se da este elixir, en el escorbuto, en dosis de una á dos dracmas, con una bebida apropiada.

# ELIXIR ANTI-ESCROFULOSO (1)

## DE PEYRILHE.

Aguardiente. . . . .	℥ ij
Carbonato de amoníaco. . .	5 ij
Raiz de genciana. . . . .	3 j

(1) El eridula deriva de sus cerfas (puerco) porque este animal está muy sujeto á las enfermedades que atacan las glándulas linfáticas.

Se hace digerir el licor durante veinte y quatro horas, y se deja con la raiz de genciana por muchos dias. Fíltrese.

Se administra una cucharada de esta tintura dos ó tres veces al dia.

### ELIXIR ANTI-VENEREO DE LEMORT.

Bálsamo de copaiva. . . . .	3 j
Resina de guayaco. . . . .	3 ij
Aceyte volátil de sasafraz. . . . .	3 ß
Alcool rectificado. . . . .	3 jv ß

Se pone todo en infusion á una temperatura suave; se filtra, y se conserva en un frasco bien tapado.

Este elixir se dá en dosis de una dracina con una infusion apropiada, ó con azucar pulverizado.

### ELIXIR SUDORÍFICO DEL DR. WILLIS.

Ipecacuana. . . . .	} aa 3 ß
Bálsamo tolutano. . . . .	
Flores de menjul. . . . .	} aa 3 ij
Opio purificado. . . . .	
Azafran. . . . .	} 3 ij
Alcanfor. . . . .	
Aceyte esencial de anis. . . . .	5 j
Alcool rectificado. . . . .	7b ij

Se dá este elixir en dosis de una dracina á dos dracinas para promover la transpiracion. Me-  
dia onza contiene dos granos de opio.

# ELIXIR ANTI-SÉPTICO Ó FEBRIFUGO DE HUXHAM.

Quina . . . . .	℥ ij
Cortezas de naranja. . . . .	℥ jss
Serpentaria de virginia. . . . .	℥ iij
Azafran. . . . .	℥ j
Cochinilla. . . . .	℥ ij
Alcool á 20° . . . . .	℥ xx

Se hace infundir durante seis dias. Algunas veces Huxham añadía doce granos de alcanfor por onza, y entonces llamaba esta preparacion *elixir alcanforado*.

Se da este elixir en dosis de dos á quatro dracmas por dia en las calenturas intermitentes, despues de haber empleado los medios generales, si estan indicados.

## ELIXIR RESOLUTIVO DEL DR. SELLE.

Tártaro purificado. . . . .	℥ ij
Sátúrese con vinagre escilítico (1). Añádese	
Estracto acuoso de fumaria. . .	} ℥ 3 jv
— de miel en rama. . . . .	
— de trifolio acuático. . . . .	
— de cardo santo. . . . .	} ℥ 3 j
Agua destilada de manzanilla. . . .	
Tintura de antimonio de Jacobi. . .	
— de Marte aperitiva. . . . .	} ℥ 3 j
Mézelese, fíltrese.	

(1) El *tártaro purificado* no es susceptible de saturacion con vinagre ni otro cualquier ácido, y sí con un alkali; el *tártaro* *purificado* es sí susceptible de saturarse con el vinagre escilítico, y esto quiza es lo mas seguro y análogo á la mente del autor, y á la naturaleza del mismo medicamento. N. T.

Esta mezcla se emplea en las enfermedades caquéticas, en la indigestión. La dosis es una cucharada de dos en dos horas.

## ELIXIR ANTI-ASMÁTICO

DE BOERHAAVE.

Raíces de asaro. . . . .	8
Calamo aromático. . . . .	3
Enula campana. . . . .	
Lirios de Florencia. . . . .	3
Regaliz. . . . .	3
Simiente de anís. . . . .	3
Alcanfor. . . . .	3
Alcohol rectificado. . . . .	3

La dosis es de dos gotas hasta treinta, con una taza de té ó de leche apropiada.

( Este elixir conviene especialmente en el asma húmedo. P. )

## ELIXIR PAREGÓRICO

DE LONDRES (1).

Acido benzoico sublimado. . . . .	} ʒ 3 iij
Azafran. . . . .	ʒ 3 iij
Aceyte esencial de anis. . . . .	ʒ 3
Estracto seco de opio. . . . .	ʒ ij
Amoniaco. . . . .	ʒ ij

Póngase á digerir durante cuatro dias, y fíltrese.

(Este elixir calma los dolores causados por congestiones catarrales húmedas, calma la tos y disminuye la dificultad de respirar. Se dá en dosis de cincuenta á cien gotas.

Se debe considerar este elixir como diaforético incisivo y calmante.P.)

(1) Se encuentra en las farmacopeas inglesas una tintura alcohólica de opio anisado que lleva tambien el nombre de elixir paregórico.

Ella se compone de este modo.

Estracto seco de opio. . . . .	} ʒ 3 j
Acido benzoico sublimado. . . . .	ʒ 3 j
Alcanfor purificado. . . . .	ʒ xxvj
Aceyte volatil de anis. . . . .	ʒ ij
Alcool de 24°. . . . .	ʒ xxlij

## ELIXIR PAREGÓRICO

DE EDIMBURGO.

Acido benzoico. . . . . 3 jv

Estracto seco de opio. . . . . 3 ij

Espíritu volatil aromático. . . ʒ j

Póngase á digerir durante cinco dias, y  
filtrese á una temperatura baja.

Se usa del mismo modo que el pre-  
cedente.

## ELIXIR ANTI-APOPLÉTICO

DE LOS JACOBINOS DE RUAN.

Sándalo rojo pulverizado. . . . . 3 vj

— blanco. . . . . } ʒ 3 v

— citrino. . . . . }

Simiente de anís. . . . . } ʒ 3 j

Bayas de enebro. . . . . }

Canela. . . . . 3 j 3 v

Regaliz. . . . . }

Galanga. . . . . } ʒ 3 vij

Imperatoria. . . . . }

Clavos. . . . . }

Simiente de angélica. . . . . }

Contrayerba. . . . . } ʒ 3 v

Polvos de vívora. . . . . }

Alcool rectificado (1). . . . . ʒ vij

(1) Segun M. D. farmacéutico de Ruan el  
agua o elixir de los Jacobinos contiene ademas

Casia lígnea. . . . . 3 ij

Anís estrellado. . . . . 3 jv

Leño aloes. . . . . }

Raíces de imperatoria. . . . } ʒ 3 j

Hágase digerir por espacio de un mes y fíltrese.

(Este elixir seria pernicioso en las constituciones pletóricas y es útil en las húmedas. P.)

## ELIXIR FEBRIFUGO DE WHITT.

Quina del Perú. . . . . 3 iij

Raiz de genciana. . . . . } aa 3 ij

Corteza de naranja. . . . . }

Alcool rectificado. . . . . ℥ j

Agua de canela hordeada. . . 3 viij

Infúndese durante veinte y cuatro horas, y fíltrese.

Este elixir se da en dosis de media onza en las calenturas adinámicas, leucorreas é ictericia.

## ELIXIR FÉTIDO DE FULDE.

Castoreos. . . . . 3 jv.

Asafétida. . . . . 3 ij

Opio. . . . . ℥ xxxvj

Espíritu de cuerno de ciervo. 3 j

Alcool rectificado. . . . . 3 jv

Se pone todo á digerir durante cuatro dias y se filtra.

Este elixir conviene en los espasmos y en los efectos histéricos. La dosis es de una dracma á una y media con una bebida apropiada, ó solo.

## ELIXIR AMERICANO

DE COURCELLES.

Flores de hipericon. . . . .	℥ viij
— de sauco. . . . .	℥ v
Hojas de naranjo. . . . .	℥ vj
Raíces de enula campana. .	℥ xvj
— de caña de Provence. .	℥ ij
Bayas de enebro. . . . .	℥ ij
Flores de tilia. . . . .	℥ ij ℞
— de romero. . . . .	℥ ij
Hojas de balsamina. . . . .	℥ jv
Raíces de asaro. . . . .	℥
Opio. . . . .	℥ ij
Alcool. . . . .	pintas 120.

Agua s. q. para que el licor quede á vein-  
te y cuatro grados; todo esto debe dar dos-  
cientas pintas de elixir, que se colora con las  
amapolas (1).

El elixir americano se da en dosis  
de una buena cucharada de las de  
tomar café, que se puede reiterar se-  
gun las circunstancias dos ó tres ve-  
ces al dia. Se toma solo ó con medio  
vaso de tisana apropiada. El elixir de

---

(1) Como no es posible preparar en Fran-  
cia el elixir americano tal como lo compuso  
Courcelles, por esto no publicamos en la pri-  
mera edición sino la formula reformada, mas  
ahora añadiremos la verdadera para los que  
vayan á América.



Courcelles goza de una grande reputacion. Tal vez se han exagerado sus propiedades. Se da en los dolores de parir en retortijones despues del parto, en las enfermedades lacteas, en las diarreas, leucorreas, supresiones, vómitos, debilidad de estómago, clorosis, &c.

---

Raices de asaro. . . . .	} aa 3 j
—de palmito (cocos accileatus. . . . .	3
Calabazas. . . . .	3 ij ß
Opio purificado. . . . .	3 vj
Corteza de palo de hierro ( <i>ery-</i> <i>throxylum</i> ). . . . .	3 ij
Justicia asurgens. . . . .	ß ij
H jas de palto. . . . .	ß j
Flores de Hipericon. . . . .	3 viij
—de sauco. . . . .	3 jv
Hojas de naranjo. . . . .	3 ij
Flores de naranjo. . . . .	ß jv
Raices de caña campana. . . . .	—de caña de azucar. . . . .
—de aristoloquia redonda. . . . .	} aa ß iij
—de caña comun. . . . .	ß ij
Bayas de enebro. . . . .	3 iij
Flores de tila. . . . .	} aa 3 ij
Cogollos de romero. . . . .	3 jv
De croton que lleva bálsamo ó bal-	
samitro. . . . .	azumbres jv
Alcohol de 32º . . . . .	
Apuardiente de 21º . . . . .	
Despues de haber hecho macerar todas las	

plantas en el alcohol y colado la tintura; se quema el residuo, se hacen infundir las cenizas en el licor con seis onzas de flores de amapola y tres onzas de granza y se filtra.

## ELIXIR ANTI-ARTRÍTICO

DE LA ISLA DE FRANCIA.

Acibar socotrino. . . . .	3 x
Mirra. . . . .	3 xij
Resina de guayaco. . . . .	3 x

Se reducen estas sustancias á polvo fino, y cada una se disuelve aparte en una pinta de alcohol de n.º 1.º despues se mezclan estas tinturas por partes iguales.

Este elixir es estomacal, emenagogo y vermifugo; promueve la transpiracion, las orinas y disipa los dolores del reumatismo ó de la gota.

Se da en dosis de una á dos cucharadas en ayunas. Al cabo de una hora se toma una ligera infusion de té, azucar, ó una infusion de tila ó de flor de naranjo.



## EMPLASTO DE FOUQUET.

- Manteca de puerco desalada. . . 3 ij  
 Dia; alma (emplasto de) . . . 3 jv  
 Cera blanca. . . . . 3 ij  
 Hágase derretir y añádese  
 Minio pulverizado. . . . . 3 ij

Este emplasto es resolutivo. Se aplica sobre los tumores.

## EMPLASTO ANTI HISTÉRICO.

- Galbano. . . . . 3 iij  
 Tacamaca en polvo. . . . . } 3a 3 j B  
 Cera virgen. . . . . }  
 Trementina de Venecia. . . . . } 3a 3 j  
 Simiente de cominos pul-  
 verizadas. . . . . }

Se estiende una suficiente cantidad de este emplasto sobre un pedazo de badana, y se aplica á la boca del estómago. Se puede rociar con treinta ó cuarenta gotas de laudano líquido.

## EMPLASTO DE CAUT-CHUC

DE SWEDIAUR.

- Caut-chuc dividido en pe-  
 queñas tiras. . . . . 3 iv  
 Aceite y laril de trementina  
 rectificada. . . . . 3 xv B  
 Aceite de olivas. . . . . } 3a 3 ij  
 Cera blanca. . . . . }

Se hace derretir en un calor suave el caut-chuc con el aceyte de trementina. Cuando la solucion del caut-chuc está hecha se añade la cera, el aceyte, y se hace hervir ligeramente hasta que todo el aceyte volatil esté evaporado; y cuando la masa está fria, se conserva en un vaso vidriado.

Este emplasto muy aglutinativo consolida las heridas y las defiende muy bien del contacto del ayre.

## EMPLASTO ANTI-VENÉREO

DE BOERHAAVE.

Flores de azufre. . . . . ʒ ij

En estas se extinguen dos dracmas de mercurio, y se añade

Sal de saturno. . . . . ʒ iij

Mézclese exactamente y se incorpora todo con

Emplasto de meliloto. . .

— de gálbano. . . . . } āā ʒ iij

— de amoniaco. . . . . }

Se aplica este emplasto sobre los bubones venéreos, ó sobre los testículos hinchados por efecto sífilítico.

## EMPLASTO DE PELITRE DE FULLER.

Galbano. . . . .	}	āā 3 j
Sagapeno. . . . .		
Goma amoniaco. . . . .	}	āā 3 jv
Raiz de pelitre en polvo. . . . .		
Simiente de mostaza. . . . .		
Cera amarilla. . . . .		3 j 3 jv
Trementina q. s.		

Se hace derretir á fuego lento la cera con la trementina; y se añaden despues las gomas resinas que deben estar purificadas por su solucion en el vino ó alcohol debilitado, y reducidas á una consistencia blanda y viscosa, y cuando la masa emplástica está á medio enfriar, se incorpora el pelitre y la mostaza, que deben estar reducidas á polvo fino.

(Este emplasto es fuuente, estimulante, resolutivo, incisivo: se aplica sobre los tumores indolentes. P.)

## EMPLASTO DE CANET.

Emplasto de diaquilon. . . . .	}	āā 3 viij
Diapalma. . . . .		
Colcotar. . . . .		
Aceyte comun, q. s.		

Se muele el colcotar sobre un pórfido con un poco de aceyte, y se mezcla despues con los emplastos derretidos.

Este emplasto es madurativo: atrae la supuracion y al mismo tiempo es desecante.

### EMPLASTO FUNDENTE DE LA MOTHE.

Cera amarilla. . . . .	3 jv
Aceyte comun. . . . .	℥ j 3 xij
Minio en polvo finísimo. . . . .	℥ j
Alcanfor. . . . .	3 ij
Incienso pulverizado. . . . .	5 iij
Almaciga. . . . .	} 3ā 3 iij
Mirra. . . . .	
Alumbre de roca. . . . .	
Trementina de Venecia. . . . .	3 j β
Iman en polvo levigado. . . . .	3 j β
F. S. A.	

Este emplasto está recomendado contra los panadizos. Se usa con suceso en los infartos glandulosos de los pechos. Se extiende sobre un lienzo como un espadrapo.

### EMPLASTO ESTIPTICO

#### DE SWEDIAUR.

Oxido de hierro rojo. . . . .	} 3ā 3 jv
Pez de Borgoña. . . . .	
Aceite comun, q. s. para formar un emplasto.	
Opio. . . . .	3 ij

Este emplasto se aplica á los lomos en la leucorrea y debilidad dorsal.

## EMPLASTO DEL ABATE DOYEN.

Aceyte de hipericon. . . . .	} 3a 1b j
Minio. . . . .	
Pez resina. . . . .	3 jv
Incienso macho ó olivano. . . . .	3 ij
Xabon blanco. . . . .	3 B

Hágase un emplasto S. A.

## EMPLASTO AMONIACO MERCURIAL

DEL DR. SELLE.

Mercurio. . . . .	3 ij
Bálsamo de azufre simple. . . . .	3 j

Mézclese exactamente y añádase poco á poco.

Goma amoniaco derretida (1). . . 1b ij

Este emplasto es un excelente resolutivo en las estagnaciones sifilíticas.

---

(1) Para hacer este emplasto segun la intencion del autor mal explicada en esta fórmula, se necesita seguir un método mejor descrito.



### EMULSION DE QUARIN CONTRA LA CIATICA LOMBAR.

Aceyte de almendras dulces. . . 3 j ß  
 Jarabe de malvavisco. . . . . 3 ij  
 Yemas de huevo, q. s.

Despues de haber incorporado todas estas sustancias añádese

Agua comun. . . . . 3 x  
 Carbonato de potasa. . . . . 3 ß

Se toma esta emulsion dividida en tres vasos, mediando entre toma y toma media hora.

(Cuando la enfermedad diurna de los abusos de los ácidos. P.)

### EMULSION DEL DR. WILLIS

CONTRA LOS EFECTOS REUMATICOS.

Raiz reciente de aro. . . . } 3 ij  
 Goma arábiga. . . . . } 3 ij  
 Blanco de ballena. . . . . 3 ij  
 Agua comun. . . . . 3 v  
 Agua de tuez moscada. . . }  
 Jarabe de cortezas de na- } 3 jv  
 ranjos. . . . . }

Se hace disolver la goma con una parte de agua, de modo que forme



un mucílago que se agitará con el blanco de ballena para formar una pasta blanda. Añádese la raíz de aro reducida á pulpa fina. Tritúrese todo para hacer una mezcla exacta; se echan poco á poco las aguas y el jarabe, y se cuele la emulsion.

## EMULSION DE CADET (1)

PARA TERMINAR LAS GONORREAS ANTIGUAS.

Bálsamo de copaiva. . . . .	} $\overline{3a}$ 3 j
Jarabe tolutano. . . . .	
Agua de rosas. . . . .	3 vj
Goma arábica. . . . .	3 j
Espíritu de nitro dulcificado. .	3 j

M. F. S. A.

Se toma la mitad de esta emulsion al momento de acostarse, y la otra mitad al despertarse. Se reitera cuatro ó cinco dias seguidos.



## ESENCIA ESCILÍTICA DE KEUQ.

Carbonato de potasa. . . . .	3 jv
Vinagre escilítico preparado con el vinagre destilado. .	3 xij

---

(1) El Cirujano.

Mézclese y evapórese hasta la consistencia de miel: añádese

Alcool de 36º . . . . . 3 vj

Hágase digerir durante algunos dias y se decanta.

Se da esta esencia en el asma y en la hidropesia, á la dosis de 40 á 60 gotas con un vehiculo apropiado.

## ESENCIA DULCE DE HALES.

Acetato de potasa. . . . . 3 ij

Azucar muy blanco. . . . . 3 ij

Agua de rio. . . . . 3 jß

Se hace cocer esta mezcla en un cazo de plata ó de porcelana, hasta que el contenido parezca negro.

Se añade cuando éste está frío

Alcool de 30º. . . . . 3 xij

Se hace derretir el azucar caramelizado y el acetato de potasa agitando de tiempo en tiempo el licor, y se filtra.

Esta esencia se prescribe en dosis de 20 gotas con un vehiculo diurético. Conviene en algunas enfermedades de la vegiga para promover las orinas.

# ESENCIA CARMINATIVA DE WEDELIUS.

Raiz de zedoaria. . . . .	3 j
Carlina. . . . .	} aa 3 ß
Cálamo aromático. . . . .	
Galanga. . . . .	} aa 3 ij
Flores de manzanilla romana. . . . .	
Simiente de anis. . . . .	} aa 3 j ß
— de alcaravea. . . . .	
Clavos de especia. . . . .	3 j
Bayas de laurel. . . . .	3 ij
Macias. . . . .	ß j
Cortezas de naranjas secas. . . . .	3 v
Espíritu de limon. . . . .	
— de nitro . . . . .	

F. S. A.

Esta tintura es estomacal, carminativa y emenagoga. La dosis es desde media dracma hasta una.

# ESENCIA ALEXIFARMACA DE STHAL.

Raiz de imperatoria. . . . .	} aa 3 jv
— de carlina. . . . .	
— de angélica. . . . .	
— de pimpinela blanca. . . . .	
— de asclepias ó vecen- tósigo. . . . .	} aa 3 j
— de énula campana. . . . .	
— de dictamo blanco. . . . .	
— de contraverba. . . . .	
— de valeriana silvestre. . . . .	
Alcool rectificado, q. s.	(ß jv)

Los prácticos alemanes prescriben este remedio en las fiebres lentas, y con mas frecuencia en las exantemáticas, en las viruelas y sarampion. La dosis es de 20 á 30 gotas, y aun mas.

(Cuando se inclinan á la adinamia. P.)

### ESENCIA DEL DR. WARD.

Alcanfor. . . . . 3j

Espíritu volatil aromático de sil-

vio. . . . . 3 viij

Se usa esta esencia en fricciones en los <sup>ca-</sup>sos de parálisis, de reumatismos crónicos, <sup>en</sup>la cefalalgia, magulladuras y contusiones.

### ESENCIA ANTI-HISTÉRICA

DE LEMORT.

Castoreos. . . . . 3jv

Asafétida. . . . . 3ij

Aceyte volatil de sabina. . . } 3a 3b

— de ruda . . . . . }

— de succino. . . . . 3j

Alcohol rectificado. . . . . 3x

Se pone en maceracion y se destila (1)  
despues se añade al producto

Alcanfor. . . . . 3j

Carbonato oleoso de amoniaco. . 3ij

(1) Casi hasta la sequedad. N. T.

Destílese de nuevo hasta sequedad, ó bien póngase solamente en maceracion durante algunos dias, y fíltrese.

Se da esta esencia en dosis de 20 á 40 gotas con un vehículo apropiado. Conviene en los efectos nerviosos del útero.



## ESPADRAPO ASTRINGENTE

DE LOUSTONAU.

Cerusa en polvo fino. . . . .	3 jß
Piedra calaminar levigada. . . . .	3 jß
Cera amarilla. . . . .	3 jv
Aceyte comun. . . . .	3 vj

Se hace derretir en un fuego muy suave la cera con el aceyte; con los que se mezclan exactamente los polvos preparados, y se extiende este emplasto sobre vendas de lienzo fino.

Este espadrapo se usa cuando se quiere disminuir la demasiada secrecion de las úlceras, de los cauterios, ó de los vexigatorios.

## ESPECIES VERMIFUGAS

Agénjo marino (*absinthium seriphium galicum*  
Lin.) . . . . . 3 partes.

Tanaceto. . . . . } aa dos partes.

Manzanilla. . . . . }

Graciola. . . . . una parte.

Todo picado muy menudo y dividido en paquetes de una onza, se ponen en infusión con vino blanco.

Se toman uno ó dos vasos de esta infusión por día, antes de comer.

## ESPECIES EN LUGAR DEL TÉ

(ESPECIES PROTHEA.)

*Farínacopea austriaca.*

Hojas de betónica. . . . .	} aa 3 iij
— de yedra terrestre. . . . .	
— de tuellago. . . . .	
— de escabiosa. . . . .	} aa 3 b
— de torongil. . . . .	
— de salvia. . . . .	

Se parten gruesamente y se ponen en infusión del mismo modo y á la misma dosis del té; se toman cuatro ó cinco tazas en ayunas en los romadizos y catarros.



# ESPÍRITU DE HOLLIN DE REUSS.

Destílese con cuidado hollin negro compacto y brillante, sepárese la fleuma del aceite empireumático y destílese de nuevo.

Este licor se administra en dosis de 20 á 30 gotas con un vehículo apropiado. Se prescribe en los efectos nerviosos é histéricos.

# ESPÍRITU ETereo AROMÁTICO.

*Pharmacopeya Londinensis.*

Canela quebrantada. . . . .	3 iij
Simiente de cardamomo. . . .	3 jß
Pimienta larga. . . . .	} 3j
Gengibre. . . . .	
Espritu de eter sulfúrico (1). .	℥ j

Se hace macerar por espacio de catorce dias en un vaso de vidrio tapado, y se filtra.

---

(1) El espíritu de eter es una mezcla de una parte de eter sulfúrico y de dos de alcohol.



## ETER ACÉTIDO FERRUGINOSO DE KLAPROTH.

Acetato de hierro líquido (1).	3 jx
Eter acético. . . . .	3 ij
Alcool. . . . .	3 ij
Mézclese.	

Este eter se da como antiespasmódico en dosis de 15 á 40 gotas.

## ETER MURIÁTICO DE BRUGNATELLI.

Muriato de potasa oxigenado. .	3 x
Alcool concentrado. . . . .	3 v
Mézclese y añádase poco á poco	
Ácido sulfúrico. . . . .	3 v

Déjase digerir en frio durante la noche, el dia siguiente se decanta el eter que sobrenada. Si contiene algo de ácido sulfúrico añádese una porcion de muriato sobreoxigenado de potasa, y fíltrese, ó destílese á fuego lento con la potasa líquida. Como esta preparacion no es muy exacta juzgamos conveniente referir la siguiente.

---

(1) Disolucion saturada de óxido de hierro rojo con el ácido acético concentrado (vinagre radical.)



## ETER MURIÁTICO DE THENARD.

Se mete en una retorta capaz solamente de contener la mezcla en su panza, partes iguales en volúmen de ácido muriático, y de alcohol el mas concentrado posible. Se agitan bien para poner en contacto todas sus moléculas; hecho esto se echan tres ó cuatro granos de arena en la retorta, para evitar los sobresaltos que, sin esta precaucion, podrian acontecer en el curso de la operacion; despues se coloca á fuego inmediato sobre un hornillo ordinario por medio de una reja de hilo de hierro, adaptándole un tubo de Wolter, que va á parar en un frasco de tres tubuluras, cuya capacidad es al doble de la retorta que se emplea y está medio lleno de agua á 20 ó 25 granos, de manera que el tubo se sumerge en el agua hasta la profundidad de siete ú ocho centímetros; despues se introduce en la segunda tubulura un tubo recto de seguridad, y en la tercera uno recorbado que va á cogerse debajo los frascos llenos de agua, al mismo grado que la precedente. Cuando el aparato está dispuesto así, se calienta poco á poco la retorta, y al cabo de veinte ó veinte y cinco minutos que se ha aplicado el fuego se ven subir unas gorgoritas de la parte inferior del líquido, y particularmente de la superficie de los granos de arena. Estas gorgoritas no tardan á multiplicarse, y desde luego se obtiene gas etéreo. Al mismo tiempo pasa ácido, alcohol y agua, pero se quedan en el primer frasco. De quinientas dracmas de ácido concentrado y de un volúmen igual de alcohol, se pueden sacar

hasta treinta litros de gas etéreo perfectamente puro.

Este gas es absolutamente sin color, su olor es vivamente etéreo, y el sabor sensiblemente azucarado. No tiene ninguna especie de acción ni sobre la tintura de tornasol, ni sobre el jarabe de violas, ni tampoco sobre el agua de cal. A 18 grados de termómetro centigrado y á 0 m. 75 de presión el agua disuelve un volumen de eter igual al suyo.

A  $+ 11$  granos de temperatura el gas etéreo, se vuelve líquido. Es notablemente limpio. Echado sobre la mano desde luego entra en ebullición y produce un frío considerable.

## ETER BALSÁMICO TOLUTANO

DEL DR. MOREAU.

Eter sulfúrico. . . . . 3 ij

Bálsamo tolutano escogido. . . 3 iij

Se reduce el bálsamo á polvo, y se hace digerir en el eter, quien lo disuelve casi todo al estado frío. Se filtra prontamente (1).

Se usa el eter balsámico en forma de vapor por medio de un frasco

---

(1) Es poco exacto el método de mandarlo filtrar; es mejor sacarlo por decantación. N. T.

co conocido bajo el nombre de *inspirador* (1).

Se prescribe en los catarros laríngeos ó pulmonales, en la afonía, y en las irritaciones nerviosas del pulmón, sofocaciones, opresiones, &c. (2).

### ETER ACÉTICO CANTARIDADO

DEL DR. DOUBLE.

Eter acético rectificado. . . . 3 ij

Cantáridas pulverizadas. . . . 3 j

Se hace macerar en un frasco tapado con tapon esmerilado por muchos días. Se filtra con presteza y á una temperatura muy baja para evitar la evaporacion (3).

Este eter se usa en fricciones en dosis de dos dracmas, en seguida de

(1) Se halla la descripción de este aparato en el boletín de farmacia (año 1811, pág. 485.). Sirve para inspirar diferentes éteres compuestos, ya sea con el toluano, ya también con el bálsamo de azufre anisado, digital purpúrea, cicuta, opio, &c.

Se vende este frasco en casa M. Desroches, lezera, frasquero, calle J. J. Rousseau, frente á la casa de Correos.

(2) Yo no tengo por cierto ni seguro el modo de administrar este eter en vapor: si alguna virtud particular puede tener, será administrado en gotas con azucar. N. T.

(3) Es mas espedido sacarle por decantacion. N. T.

la apoplexia, en la parálisis, infartos lentos del tejido celular, en los reumatismos crónicos y sin inflamación. Obra como á rubefaciente, y su acción es muy pronta.

ETER SULFÚRICO FERRUGINOSO  
TINTURA DORADA DE HALL.

V. TINTURA NERVINO-TÓNICA DE BESTUCHER.

ETER NÍTRICO TEREINTINADO.

Alcool de vino. . . . . ℥ ij

Mézclese con aceyte de trementina <sup>q.</sup>  
s. (1). Meneese con cuidado, añádese poco á poco.

Áccido nítrico concentrado. . . ℥ ij

Destílese á fuego lento, y se extraerá la mitad de la mezcla (2).

(1) Es muy reparable que no fixe la cantidad de aceyte de trementina, y por lo mismo podrá fixarse en la cantidad de seis onzas.

(2) Tampoco describe como debia el método y aparato para destilar este eter, que no es ciertamente menos gaseoso que el eter muriático; y aunque el aparato allí descrito no sea el mejor, ni el mas cómodo, debe á lo menos ponerse en este cuando menos dos recipientes entilados, y mezclar los dos licorres que cada uno recoge, por ser diferentes uno de otro. N. T.

**Uso.** En los cálculos biliares, ictericia tenaz, entorpecimiento epático y reumatismo. Se usa por interno y por externo.

La dosis es de 20 á 40 gotas mezcladas con miel ó con una yema de huevo azucarado.



### ETIOPE ANTIMONIAL DE HUXHAM.

Antimonio crudo preparado. . 3 iij

Mercurio revivificado del cina-

brio. . . . . 3 jv

Flores de azufre. . . . . 3 ij

Mézlense perfectamente estas substancias en un almirez de vidrio ó de ágata, y tritúrese hasta que el mercurio quede enteramente extinguido, y que con el lente no se pueda percibir la mas mínima partícula. Para facilitar esta perfecta extincion, se ricia de tiempo en tiempo la mezcla con una gota de agua.

Este remedio es un excelente vermifugo; se da en dosis de ocho á diez granos. Para los adultos se prescribe en dosis de uno a dos escrúpulos, en los infartos linfáticos, tumores glandulosos del cuello, atro-

fía y sarna gálica. Se emplea contra los depósitos artríticos, amaurosis, carcinoma, &c.

Exteriormente se usa para limpiar las úlceras sifilíticas.

## ETIOPE VEGETAL DE RUSSEL.

Se toma el sargazo llamado *encina marina* (*Fucus vesiculosus*); se hace quemar en un vaso abierto (1); y se obtendrán unos polvos negros y finos.

Se toman en dosis de una dracma como fundentes y resolutivos en los infartos glandulosos y contra las papéras, &c.

Si se mezclan con igual cantidad de azúcar muy fino se tiene un dentrífico propio para disipar el relajamiento escorbútico de las encías y fortificar los dientes.

Con el mismo sargazo, se prepara la gelatina de fuco de Rossel. (Véase esta fórmula á la tabla).

---

(1) Todos los carbones medicinales se hacen en vasos cerrados como se hace con la esporta, que es muy análogo en virtudes al presente, y se da en las mismas enfermedades. N. T.

EXTRACTO DE COLCQUINTIDAS  
COMPUESTO.

*Pharmacopœa Londinensis.*

Pulpa de colocuintidas. . . . .	3 jv
Extracto de acibar. . . . .	3 jß
Escamonea. . . . .	3 jv
Semillas de cardamomo. . . . .	3 j
Xabon amigdalino. . . . .	3 iij
Agua caliente. . . . .	3ß j

Se hace macerar la pulpa coliquintidas en el agua, á un calor suave, durante cuatro dias; cuélese el licor, añádese el acibar, la escamonea y el xabon; se hace evaporar hasta la consistencia conveniente, y al último se añaden las semillas de cardamomo (1).

Este extracto es un drástico fuerte. No se debe emplear sino en corta dosis.

FEBRIFUGO DEL DR. AUDOUART.

Opio sin depurar pero libre de la parte leñosa. . . . .	3 j
Alcanfor. . . . .	} = 3ß
Acibar soc-trino. . . . .	

(1) Es interesante advertir que debe exprimirse la infusion de colocuintides, y que el cardamomo debe hacerse una pasta muy fina. N. T.

Tritúrese todo en un almirez, y añádese de alguna conserva ó jarabe simple la cantidad suficiente para formar una masa pilular que se dividirá en sesenta bolos.

Cada dos horas se da uno de estos bolos en la apirexia, ó mas á menudo si el caso lo exige.

La dosis es de cuatro á ocho ó diez por dia; el médico la arregla segun la fuerza, la accesion y el estado del enfermo. Cada bolo debe considerarse como equivalente á una dracma de quina. Inmediatamente despues de cada bolo se hace tomar medio vaso de vino aguado, ó de infusion de flores ú hojas antiespasmódicas.

## FEBRIFUGO DEL DR. MARC.

### *Agua mineral.*

Sulfato de hierro. . . . .	3 j
Agua de fuente. . . . .	℥ ij

Se manda de esta agua desde medio vaso hasta uno cada dos horas entre las accesiones de las calenturas intermitentes.



(El sulfato de Hierro conviene únicamente en los sujetos húmedos. P.)

### *Bolos.*

Sulfurato de hierro. . . . . 3 j

Polvos de raíz de valeriana. . 3 ij

Miel s. q. para formar ocho bolos que se dan cada dos horas en dosis de uno á dos entre las accesiones.



## FOMENTO RESOLUTIVO

DE RICHTER.

Agua. . . . . ℥ x

Vinagre. . . . . ℥ j

Nitrato de potasa. . . . . 3 jv

Muriato de amoniaco. . . . . 3 ij

Se empapan compresas con esta solución y se aplican sobre las contusiones, equimoses, luxaciones y fracturas.

## FOMENTO DEL DR. JUSTAMOND.

Muriato de amoniaco. . . . . 3 j

Espíritu de romero. . . . . ℥ j

Mézclese.

Se aplican paños empapados con este licor sobre los tumores lacteos de los pechos. Se renuevan á menudo.

(Muchas veces los tumores lácteos no necesitan ningun tratamiento: con el tiempo y un régimen apropiado ellos se curan. Con todo puede emplearse este fomento cuando el tumor es indolente, y que tarda demasiado á resolverse.~P.)

## FOMENTO DEL DR. RICHARD CONTRA LA GANGRENA.

Se hace un cocimiento con una onza de quina y quarenta y ocho de agua que se reducen á treinta y dos. Se añade

Flores de manzanilla romana. }  $\overline{\text{aa}}$  3 jv  
Tanaceto. . . . . }

Despues de un hervor, se cuele el cocimiento, y quando está frio, se mezcla con el

Alcool alcanforado. . . . .  $\frac{3}{4}$  ij  
Acido muriático. . . . .  $\frac{3}{4}$  j


## FRONTAL HIPNÓTICO.

Hojas de beleño. . . . . }  $\overline{\text{m}}$  3 j  
Flores de amapola. . . . . }

Se majan estas plantas secas hasta que estén reducidas á polvo; se añade

Opi sin depurar disuelto en suficiente cantidad de vinagre. . .  $\frac{3}{4}$  jv

Se hace una masa que se aplica sobre la frente del enfermo, envuelto entre dos lienzos, en las cefalagias fuertes.



## GARGARISMO DE QUARIN

EN LA PARALISIS DE LA LENGUA.

Raiz de pelitre pulverizada. . . 3 jß

Muriato de amoniaco. . . . . 3 ij

Agua de salvia. . . . . 3 viij

Espíritu de coclearia. . . . . 3 vj

Déjase en infusion toda la noche; al dia siguiente cuélese, y añádese

Miel. . . . . 3 jv

Déjese al enfermo para lavarse la boca.



## GELATINA DE FUCO DE RUSSEL.

Fuco (1). . . . . } 5 lb ij

Agua del mar. . . . . }

Déjense en maceracion durante quinze dias; se forma una especie de gelatina que tiene la consistencia de miel liquida.

Se emplea con suceso para fric-

---

(1) Véase *Etiopc vegetal*.

cionar las glándulas hinchadas é infartadas, cuando los remedios internos empiezan á resolver dichos tumores.

Este fuco secado se da tambien por interno en dosis de una dracma como fundente.

Esta yerba debe recogerse hácia el mes de julio, en cuyo tiempo sus verguillas estan llenas de un xugo gelatinoso.

## GELATINA DE LOMBARDAS.

Lombardas. . . . .	℥ x
Cola de pescado. . . . .	℥ ij
Azucar. . . . .	℔ j $\frac{5}{2}$

Se hacen hervir las coles en suficiente cantidad de agua, se echa la cola despues de haberla renojado con muy poca agua sobre cenizas calientes. Cuando la cola está derretida, se cuela el cocimiento. Se vuelve al fuego y se añade el azucar. Se clarifica con claras de huevos; se cuela, y se hace espesar

el todo hasta la consistencia de gelatina (1).

Conviene en los romadizos y en la tisis. Se da en dosis de una onza hasta cuatro por dia.

## GELATINA DE LIQUEN.

Liquen islándico. . . . .	℥ iij
Cola de pescado. . . . .	℥ j ℞
Azucar. . . . .	℥ vij

Esta gelatina es útil á los sugetos amenazados de la tisis pulmonar. Se prescribe en dosis de tres á cuatro cucharadas por la mañana en ayunas.

## GELATINA BERMIFUGA

DEL MUSGO DE CÓRCEGA.


Musgo de Córcega. . . . .	℥ jv ℞
Vino tinto. . . . .	pintas xij
Azucar blanco. . . . .	℥ xxjv

---

(1) Bien se conoce que el autor no está enterado en la parte practica de farmacia, pues ademas de ser imposible la clarificacion despues de la mezcla de cola de pescado, cualquier boticario sabe que puede evitarse este embarazo echando el azucar en el cocimiento, hacer un jarabe, y proceder despues á hacer la gelatina. N. T.

Póngase el musgo en el baño maría; échese encima el vino tinto; déjese en infusión veinte y cuatro horas; hágase hervir; cuélese; vuélvese al fuego despues de haberla añadido al azucar. Clarifíquese y cuélese de nuevo; redúzcase despues hasta cerca de 30 libras; se ensaya poniéndolo un poco á enfriar.

Esta gelatina conviene á los niños que tienen gusanos: se les dan tres cucharadas al dia, cada cucharada se toma una hora antes de la comida; se continua tres ó cuatro dias.



## GOTAS D'ELLER,


Ó LICOR ANTI-ARTRITICO.

Licor anodino de Hoffman.	} añ 3 ij
Espíritu de cuerno de ciervo succinado. . . . .	

Mézclese.

Se prescriben de veinte á cuarenta gotas de este licor en los reumatismos crónicos, accesos de gota, espasmos, &c.

NOTA. El licor de cuerno de ciervo succinado se hace mezclando exactamente una onza de sal volátil de succino con suficiente cantidad de espíritu de cuerno de ciervo hasta que la solución esté completa.



### INFUSION DE HOLLIN COMPUESTA DE PIDERIT.

Cenizas graveladas. . . . . 3 vj

Se reducen á legia con infusion  
de flores de sauco. . . . . 3 xxxvj

Se añade

Muriato de amoniaco. . . . . 3 j

Hollin compacto y brillante. . 3 ij

Póngase todo en digestion á un calor suave  
durante tres dias, y filtrese.

Se da esta infusion en dosis de una  
dracina con una onza de vino bueno,  
dos ó tres veces al dia, para facilitar  
la evacuacion menstrual para llamar  
de nuevo una erupcion cutánea. Se  
prescribe contra las obstrucciones,  
infartos linfáticos, asma, ictericia,  
caquexia, dolores artríticos y cuar-  
tana.



### INJECCION DEL DR. PRINGLE.

Sulfato de zink. . . . . } 3 jv

Alumbre calcinado. . . . . } 3 jv

Agua pura. . . . . 1b ij

Mézclese y hágase la solucion.

Se emplea esta inyeccion en la leucorrea. La dosis es una onza por inyeccion.

(Cuando la enfermedad va á terminar, aun el uso de las inyecciones de esta naturaleza es muchas veces dañoso. P.)

### INYECCION DEL DR. YUNG.

Acetato de plomo líquido. . . . .	3 ij
Vinagre destilado. . . . .	3 viij
Agua de rosas destilada. . . . .	1b jß

Mézclese.

Sirve en los mismos casos que la precedente.

### INYECCION DEL DR. CLARE.

Oxido de plomo gris. . . . .	ḡ xx
Sulfato de zink. . . . .	ḡ vj
Agua de rosas. . . . .	3 jv

Mézclese y agítese.

Esta inyeccion se emplea en las blenorragias.

(La observacion precedente se puede aplicar á esta preparacion. P.)



## INJECCION SEDATIVA

DEL DR. HAMILTON.

Estracto de opio desde. . . . . 3 j á iij  
 Agua caliente. . . . . ℥ j  
 Despues de la solucion se añade  
 Acetato de plomo líquido  
 desde. . . . . 3 j á iij  
 Tiene el mismo uso que la precedente.



## JULEPE MOSCADO DE FULLER.

Agua de rosas. . . . .	3 vj
— de flores de naranjo. . . . .	3 j
— de canela hordeada. . . . .	3 ij
— de peonía compuesta. . . . .	3 j β
Mosco. . . . .	} 7ā 8 ij
Ambar gris. . . . .	
Carbonato de amoniaco. . . . .	
Azafran. . . . .	3 j
Esencia de clavos. . . . .	gota j
Confeccion de alquermes. . . . .	3 ij
Xarabe de claveles. . . . .	3 j β

M. et F. S. A.

Este julepe se da en dosis de cinco cucharadas cada tres horas, en los efectos espasmodicos y calambres de estómago.

## JULEPE ESCOCES PARA EL CROUP.

Agua de poleo. . . . . 3 iij  
 Xarabe de malvavisco. . . }  
 ——— tolutano. . . . . } aa 3 j

Mézclese.

Se da á cucharadas de cuarto en cuarto de hora.

(Este julepe es un auxiliar muy débil, el cual no debe excluir los remedios fundamentales que exige esta enfermedad, como la sangría, los eméticos, vegigatorios, baños, frías y los antiespasmódicos mas enérgicos, &c. P.)



LEGIA LITONTRÍPTICA  
 DE SAUNDER.

Conchas de ostras calcinadas. 3 xxjv  
 Potasa recientemente calcinada. . . . . 3 viij  
 Agua hirviendo. . . . . 3b viij

Despues de haber reposado un dia se filtra el licor.

Se dan tres draemas de esta legia por dia distribuidas en tres tomas con una infusion de grana de lino á la que se añade

Magnesia calcinada. . . . . 8 xv

## LINIMENTO DE AJO.

Se prepara machacando el ajo en un mortero de piedra, con igual cantidad de manteca de puerco: con este linimento se friccionan las plantas de los pies dos ó tres veces al dia; pero el mejor modo de emplearle es el de estenderle sobre un lienzo, y aplicarle en forma de emplasto. Se renueva mañana y tarde porque el ajo luego pierde su propiedad.

Este es un buen remedio contra la tos convulsiva y contra la mayor parte de otras toses rebeldes.

( *Extractado de* BUCHAN. )

## LINIMENTO CARMINATIVO DE WHITT.

Bálsamo anodino de Bates. . . 3 j  
Aceite de macias. . . . . 5 jv  
— esencial de yerba buena. . 3 ij

Mézclese exactamente.

Ordinariamente se toma cerca de una cucharada de este linimento, con el que se fricciona al enfermo hácia la region del estómago al acabarse da acostar.

## LINIMENTO DE MUSTARD.

Unguento epispástico. . . . .	3 j
Esencia de trementina. . . . .	3 iij
Alcanfor. . . . .	3 jv

Se usa en la gota y reumatismos.

## LINIMENTO RESOLUTIVO DE POTT.

Aceite esencial de trementina. 3	iij
Acido muriático. . . . .	3 j

Mézclese.

Sirve en los reumatismos y dolores artríticos; se frotan con él los lóbulos y tumores enquistados.

## LINIMENTO DE HUFELAND

*Contra los tumores glandulosos, y sobre todo contra los que provienen de causa escrofulosa.*

Unguento de altea. . . . .	3 j
Hiel reciente de buey. . . . .	} $\overline{aa}$ 3 iij
Xabon blanco. . . . .	
Aceite de petroleo. . . . .	3 ij
Sal volatil de cuerno de ciervo. 3	ß
Alcanfor. . . . .	3 j

Se usa en fricción en dosis de una cucharadita de café cada tres horas.

# LINIMENTO CONTRA LAS ALMORRANAS POR EL DR. ANDRY.

Aceite de olivas. . . . .	} aa 3 j
Miel de Narbona. . . . .	
Trementina de Venecia. . .	

Hágase un linimento S. L.

# LINIMENTO ANTI-OFTÁLMICO DE PLENCK.

Sulfato de alumina en polvo. .	3 j
Yema de huevo. . . . .	nº. j
Agua de rosas. . . . .	3 j

Se disuelve el alumbre en el agua, se añade la alumina, y se cuela la mezcla.

En la oftalmia húmida se aplican sobre los ojos unas compresas pequeñas embebidas con este linimento.

# LINIMENTO XABONOSO DE KAEMPF.

Xabon alcalino de sosa. . . . .	3 j
Alcool. . . . .	3 jv.
Alcantor. . . . .	8 LX

Se raspa el xabon, se mete en una cazuela con el alcool, se le pega fuego agitando la mezcla con una varilla de vidrio, y cuando el alcool para de quemar, se mezcla exactamente el alcanfor.

Esta preparacion análoga al bálsamo apodeldoc, sirve para los mismos casos.

## LINIMENTO ANTI-ARTRÍTICO DE HOME.

Alcanfor. . . . .	3 j
Disuélvese con el aceite de trementina. . . . .	3 ij
Añádese	
Sal de cuerno de ciervo volatil succinada. . . . .	ʒ xv
Simiente de cominos en polvos. . . . .	3 ij
Unguento nervino. . . . .	3 jv
Xabon negro comun. . . . .	3 j

Hágase un linimento.

Se usa en fricciones en los efectos reumáticos prolongados, y particularmente en la ciática nerviosa.

## LINIMENTO ANTI-ARTRÍTICO DE DESBOIS DE ROCHEFORT.

Aceite. . . . .	3 j
Amoníaco líquido. . . . .	5 ij
Agua teriacal. . . . .	3 j
Láudano. . . . .	3 j

## LINIMENTO VOLATIL DE PLENCK.

Aceite de almendras dulces. . . . . ℥ j  
 Amoniaco líquido. . . . . ℥ j  
 Alcanfor. . . . . ℥ xxxvj

Con este linimento se hacen fricciones sobre el abdomen en la perineumonia. pleuresia, inflamacion del bajo vientre, cólico ventoso y timpanitis.

En el angina de pecho se aplica en fricciones sobre el cuello.

## LINIMENTO DIURÉTICO DE KUSER.

Aceite de trementina. . . . . ℥ j  
 Yema de huevo fresco ó cocido. ℥ ij

Se agitan en un almirez de vidrio hasta que sea perfecta la mezcla, despues se echa poco á poco agitando siempre

Agua de yerba buena piperita. ℥ iij

Con este linimento se hacen fricciones sobre la region inguinal; se usa contra la iscuria espasmódica.

LINIMENTO ANTI-ESPASMÓDICO  
DEL DR. SELLE.

Unguento de altea. . . . . ℥ ij  
 Alcanfor. . . . . } āā ℥ j  
 Laudano líquido de Sydenham.  
 Mézclese.

Este linimento es muy eficaz en todos los movimientos espasmódicos de los intestinos. Se unta el bajo vientre con algunas dracmas de él, y se cubre despues con una franela caliente.

**LINIMENTO XABONOSO ALCANFORADO**  
DE FERRIAR.

Unguento digestivo amarillo. . . . . 3 j  
Alcanfor. . . . . 3 ij  
Xabon *verde* ó de trementina. . . . . 3 jv  
Mézclese.

Se usa del mismo modo que el precedente.

**LINIMENTO ESTIMULANTE INGLES**  
Ó BALSAMO DE VIDA ESTERNA.

Xabon medicinal. . . . . 3 viij  
Divídase y añádase  
Accite esencial de trementina. 3 viij  
Espíritu de serpol. . . . . 3b jv  
Amoniaco líquido. . . . . 3 ij á 3 viij

A veces se añade una libra de agua para formar una embrocacion resolutive.

Se usa el bálsamo de vida esterna en la parálisis, en la anquilosis falsa, tumores frios y artrodinia.



## LINIMENTO DE RONCALLI.

Se toma una vegiga de hiel de buey entera; se añaden á la bilis que contiene tres onzas de muriato de sosa en polvo y tres cucharadas de aceite de nueces. Se agita la mezcla y se expone esta vegiga por algun tiempo á un calor suave.

Con este linimento se embeben algunas hilas que se aplican dos ó tres veces al dia sobre los tumores escrofulosos. Este linimento ó promueve la resolucion ó la supuracion de estos tumores, mientras que al mismo tiempo se usen algunos remedios internos.

He aquí los que se acostumbran á usar; se da principio por purgar al enfermo con la jalapa ó cremor tártaro, se pone al uso de un cocimiento de raices de bardana y de polipodio.

Despues se prescriben las píldoras compuestas con el xabon, goma amoniac y ruibarbo; estas dos últimas sustancias en igual cantidad. Estas bebidas y píldoras deben continuarse por algunas semanas.

Si los rumores escrofulosos pare-

cen demasiado inflamados, se suspende el uso de linimento, y se les aplican algunos tópicos suaves ó cataplasmas emolientes.

A veces tambien es preciso aplicar sobre los tumores indolentes de esas escrófulas el remedio ungarino, compuesto de goma amoniaco disuelta con el vinagre y espesada á la consistencia de emplasto.



### LICOR AMONIACAL ANISADO.

*Pharmacopea de Berlin.*

Alcool. . . . .	℥ xij
Amoniaco líquido. . . . .	℥ iij
Aceite volatil de anis. . . . .	℥ jv

Diez gotas por los adultos cuatro veces al dia. Cinco gotas mañana y tarde por los niños.

Se prescribe este licor en las enfermedades adinámicas y sobre todo en el asma espasmódico.

### LICOR ANTI-NEFRÍTICO

DEL DR. ADAMS.

Cabezas de adormideras. . . . .	℥ vj
Agua de fuente. . . . .	℔ ij

Hágase hervir hasta reduccion de ocho onzas, exprímese muy fuertemente y añádase á la colatura

Nitrato de potasa. . . . . 3j

Se dan dos dracmas mañana y tarde, con un vaso de cocimiento tibio de grana de lino ó de raiz de malva-visco.

Este licor se usa en los efectos dolorosos de las vias urinarias.

## LICOR CÁUSTICO DE PLENCK.

Mercurio sublimado corrosivo. . .	} ʒ 3 ij
Sulfato ácido de alumina. . .	
Alcanfor. . . . .	} ʒ 3 ij
Cerusa. . . . .	
Vinagre concentrado. . . . .	} ʒ 3 xxiv
Alcool rectificado. . . . .	

Hágase la mezcla. S. L.

(Este licor destruye los condilomas, las excrescencias venéreas, sin alterar la piel sana. Se aplica dos veces al dia con una compresa ó lechino de hilas. Aplicado del mismo modo, cicatriza las ragadas. P.)

## LICOR DEL DR. SWEDIAUR PARA LAS AFTAS.

Borax en polvo. . . . .	3 ij
Tintura de mirra. . . . .	} aa 3 j
Agua de rosas destilada. . . . .	
Miel rosada. . . . .	3 ij

Se empapa un lechino con este licor y con él se tocan las aftas muchas veces al día.

## LICOR DE PRESAVIN.

Se toma igual cantidad de tártrito ácido de potasa y de mercurio precipitado de su nitrato por la potasa. Se disuelve esta mezcla con veinte veces su peso de agua destilada. Se filtra este licor.

Este tártrico mercurial líquido se usa en dosis de dos cucharadas por media pinta de agua destilada. Se toman de él tres ó cuatro vasitos de los de ratafia por día con una tisana apropiada.

El licor de Presavin es un anti-herpético y anti-venéreo.



LOCION ODONTÁLGICA DE PLENCK.

Raiz de pelitre. . . . .	3 ij
Muriato de amoniaco. . . . .	3 j
Extracto de opio. . . . .	8 ii
Agua destilada de espliego. } Vinagre destilado . . . . . }	7a 3 ij

Se pone en digestion por algunos dias esta mezcla y se filtra.

En los dolores de muelas de tiempo en tiempo se pasa por la boca una cucharada de esta locion. Es menester tener cuidado de no tragársela.

LOCION CONTRA LA TIÑA.

Sosa sulfurada. . . . .	3 vj
Xabon blanco. . . . .	3 iij
Agua de cal. . . . .	3 xvij
Aguardiente. . . . .	3 jv

M. S. A.

Cada dia se cubre la cabeza con un lienzo embebido con esta preparacion.



## LOCH DE ALMIDON.

### *Farmacopea de Edimburgo.*

Almidon . . . . .	3 ij
Catecú. . . . .	3 j
Xarabe tolutano. . . . .	} 1ā 3
Clara de huevo batida con un poco de agua. . . . .	
Hágase un loch. S. A.	

Se usa en las diarreas rebeldes.

## LOCH XABONOSO.

### *Farmacopea de Edimburgo.*

Xabon medicinal. . . . .	3 j
Aceite de almendras dulces. . .	3 j
Xarabe de limon. . . . .	3 jß
Mézclese y hágase un loch.	

## LOCH DE GORDON.

Xarabe de lombarda. . . . .	1k j
Azafran. . . . .	3 iij
Agua. . . . .	3 viij
Cuézase por un momento y cuélese el agua con una estameña.	

Se da á cucharadas en el asma hú-

mido, romadizos y enfermedades de pecho.



## MERMELADA DE TRONCHIN.

Pulpa de cañafistula. . . . .	} aa 3 j
Maná en lágrimas. . . . .	
Aceite de almendras dulces. . . . .	} aa 3 jv
Xarabe de violetas. . . . .	
Agua de flor de naranjo. . . . .	3 ij

M. S. A.

Se toma la mitad por la mañana á cucharadas y de hora en hora; al dia siguiente se toma la otra mitad. Bebiendo despues un caldo ligero.

Esta mermelada es un purgante suave que conviene á los sugetos delicados en las enfermedades catarrales.

## MERMELADA DE ZANETTI.

Maná en lágrimas. . . . .	3 ij
Xarabe de malvavisco. . . . .	3 j 6
Cañafistula cocida. . . . .	} aa 3 j
Aceite de almendras dulces. . . . .	
Manteca de cacao. . . . .	3 vj
Agua de flor de naranjo. . . . .	3 6
Kermes mineral. . . . .	8 jv

r 3

Se administra en los romadizos, como aminorativo. Puede asemejarse á la mermelada de Tronchin. Se prescribe en dosis de una hasta tres cucharaditas de las de café, segun la edad del enfermo y la intencion del médico.



### MIXTURA PECTORAL DE QUARIN.

Goma amoniaco disuelta con	
una yema de huevo. . . . .	3 ij
Estracto de énula campana. . .	3 ij
Agua de hisopo. . . . .	3 viij
Ogimiel escilítico. . . . .	} aa 3 jß
Xarabe de hisopo. . . . .	

Se usa esta mistura á cucharadas en la apoplexia acompañada de tos, con silvido y dificultad de arrojar las materias pituitosas ó tenaces que amenazan al enfermo con la sufocacion.



## MIXTURA PECTORAL DE BOERHAAVE.

Vinagre escilítico. . . . .	3 vj
Ogimiel escilítico. . . . .	3 iij
Sulfato de sosa. . . . .	3 j
Cocimiento de cebada perlada. .	3 viij
Agua destilada de hisopo. . . . .	3 iv

Se da una onza de esta mixtura tibia cada media hora en la perineumonía.

(Cuando la expectoracion es abundante y un poco difícil. P.)

## MIXTURA ANTI-LETARGICA

DEL DR. FRANCK.

Espíritu de yerba buena piperita. .	3 vj
Láudano líquido de Sydenham. .	3 jv
Eter sulfúrico. . . . .	3 vj

Mézclese, y se dará una cucharada de las de café al enfermo cada cuarto de hora.

(Es menester suponer que entonces el letargo proviene de una profunda debilidad nerviosa.

Para el uso de este remedio, es menester que el médico consulte la observacion de Franck. P.)

## MIXTURA DE QUARIN

PARA LA ICTERICIA.

Extracto líquido de tarraxacon.	} aa 5 jv
Acetato de potasa. . . . .	
Extracto de cicuta. . . desde x ̄ hasta xx	
Agua de hinojo. . . . .	3 vj
Xarabe de cinco raizes. . . . .	3 j

La dosis es de dos cucharadas cada tres  
cuatro horas.

## MIXTURA ANTI-SIFILÍTICA

DE CIRILO.

Miel egipciaca (1) . . . . .	3 iij
Agua pura. . . . .	3 ij

Mézclese.

Se aplica dos veces al día una  
compresa embebida con esta mixtura  
sobre las úlceras venéreas.

## MIXTURA RESOLUTIVA

DEL DR. SELLE.

Muriato de amoniaco. . . . .	} aa 5 ij
Vino emético. . . . .	
Oximiél simple. . . . .	3 ij
Agua de manzanilla destilada (2). . .	3 x

Mézclese.

(1) Unguento egipciaco del codex.

(2) Nada vale este agua si no está recién  
destilada y muy poco en este estado, es pues  
mejor una ligera infusion. N. T.

Se da esta mixtura en dosis de media taza cada hora, en las calenturas en que es menester combatir algunas estagnaciones tenaces.

## MIXTURA ANTI-CATARRAL

RUSA.

Elixir paregórico ingles. . . . .  $\frac{3}{4}$  v  
Tintura escilítica. . . . .  $\frac{3}{4}$  j

Una cucharadita de las de café, mañana y tarde.

## MIXTURA HIDRAGOGA

DE VANSVIETEN.

Arrope de enebro. . . . .  $\frac{3}{4}$  jv

Se deslie en una pinta de agua destilada de bayas de enebro, añadiéndole

Espíritu de enebro. . . . .  $\frac{3}{4}$  ij

Se da de cuatro á ocho veces por día, desde media cucharada hasta dos de esta mixtura. Cuando los enfermos estan muy sedientos, á veces se añaden á la mistura cuatro dracmas de espíritu de nitro dulce.

## MIXTURA ODONTÁLGICA

DE CADET.

Eter sulfúrico. . . . . }  
 Láudano líquido. . . . . }  $\overline{aa}$  3 j  
 Bálsamo del Comendador. . . . . }  
 Aceite esencial de clavos. . . . xx gotas.

Mézclese todo junto.

Se empapa un poco de algodón con esta mistura, y se aplica sobre la muela que duele.

## MIXTURA ANTI-ASMÁTICA

DE BRUNER.

Goma amoniaco muy pura. . . 3 ij  
 Disuélvase en  
 Agua destilada de hisopo. . . . 3 jv  
 Vino del Rin, ó vino blanco  
 generoso. . . . . 3 ij  
 Mézclese. . . . .

Se da esta mixtura en dosis de una onza tres veces al dia.

## MIXTURA CATÁRTICA ÁRABE.

Sulfureto de antimonio pulveri-  
 zado. . . . .  $\overline{g}$  xij  
 Escamonea ó diagridio en polvo. 3 j  
 Xarabe de limon. . . . . 3 j

Esta fórmula se alaba contra la hidropesía ascitis.

## MIXTURA RESINO-XABONOSA

DE PLENCK.

Resina de guayaco. . . . .	} aa 3j
Xabon amigdalino. . . . .	
Alcool rectificado. . . . .	3 viij

Hágase una tintura S. A. y fíltrese.

Se emplea esta tintura líquida, ó se hace evaporar hasta sequedad. Se da el xabon seco en dosis de diez y ocho granos, ó la tintura en dosis de una dracma con una bebida apropiada. Este remedio conviene en la gota y en los reumatismos.

## MIXTURA XABONOSA PURGANTE

DEL MISMO.

Se prepara como la precedente, empleando la jalapa en lugar del guayaco.

Purga bien, y sin darles cólicos á los niños; se les da en dosis de una dracma ó de una y media en forma líquida, ó de diez á veinte granos seca.

## MIXTURA DE QUARIN

CONTRA LA EMOPTISIS.

Agua de flor de amapola. . . 3 viij

Goma arábica. . . . . 3 jv

Sulfato ácido de alumina y  
de potasa. . . . . 3 ß

Xarabe de diacodion. . . . 3j

Se da á cucharadas.

(No se debe emplear sino en las emoptisis pasivas. En los casos contrarios deben preceder los medios generales, la sangría, &c. P.)

## MIXTURA DE BOYLE

CONTRA LAS AFTAS.

Zumo de siempreviva mayor. } 7a 3j

Miel. . . . . }

Sulfato ácido de alumina. . . . . 3j

Cada hora se fomentan las aftas con esta mixtura.

## MIXTURA DE WHITT

CONTRA LOS CALCULOS BILIARES.

Eter sulfúrico. . . . . 3j

Eseucia de trementina. . . . . 3jv

(La dosis es de doce á veinte gotas, y aun mas, mezclado con un poco de azucar. Se bebe despues de esta dosis una taza de suero clarificado, ó de agua de cebada. Se debe continuar este régimen por muchos meses; si da demasiado calor, se prescribe un régimen y bebidas atemperantes.

Este es el remedio que recomendaba Durande, médico de Dijon. Cullen le cree sin virtud contra los cálculos biliares. Algunos prácticos instruidos le han usado con suceso. Quarin aconseja de ensayarle. P.)

## MIXTURA LITONTRÍPTICA

DE DURANDE.

Eter sulfúrico. . . . . 3 vij  
Esencia de trementina . . . . . 3 jv

A veces el médico asocia el eter á la yema y al aceite de huevos; otras veces aumenta ó disminuye la proporcion de aceite volatil de trementina, ó añade el xarabe de violetas, de corteza de naranjas, y á veces el

de diacodion ó de amapolas blancas.

El remedio de Durande, muy análogo al de Whitt, no se usa sino como á disolvente de los cálculos biliares.

De esta mixtura se toman doce ó veinte y cuatro gotas por la tarde con un poco de agua azucarada.

## MIXTURA BALSÁMICA

DE FULLER.

Bálsamo de copaiva. . . . .	3 jv
Yemas de huevos. . . . .	n <sup>o</sup> . ij
Xarabe de azucar blanca. . .	3 ii
Vino blanco. . . . .	3 viij

Mézclese.

Se da esta mixtura en dosis de una cucharada mañana y tarde, en la tos catarral crónica pituita ó en la blenorrea crónica.

## MIXTURA FUNDENTE

DE MUTZEL.

Tartrito de potasa. . . . .	3 jv
Estracto de genciana. . .	} aa 3 ij
— de centaurea. . . . .	
Agua. . . . .	3 viij



Se da media onza de esta mixtura cada dos horas á los enfermos que padecen obstrucciones del hígado.

MIXTURA DE MIRRA ALCALIZADA  
DE GRIFFITZ.

Mirra escogida. . . . .	3 ij
Carbonato de potasa. . . . .	3 j
Tritúrese exactamente y añádese	
Agua de yerba buena. . . . .	3 viij
Alcool de yerba buena. . . . .	3 j ß
Sulfato de hierro. . . . .	8 xx á xxx
Xarabe tolutano. . . . .	3 j

Mézclese.

De esta se toman cuatro cucharadas tres veces al dia, á saber; por la mañana, dos horas despues de haber comido, y al acostarse. Es útil en la caquexia hidrópica, en la debilidad que resulta de las calenturas adinámicas, en la pituita y leucorrea.

MIXTURA PARA EL CROUP.

Asafetida. . . . .	3 ij
Espíritu de Mindereto. . . . .	3 j
Agua de poleo. . . . .	3 iij
F. S. A.	

En cada hora se da esta mixtura á cucharadas. (Cuando se han usado los remedios generales. P.)

### MIXTURA ÁCIDA DEL DR. SELLE.

Ácido sulfúrico. . . . .	℥ j
Ogimiel simple. . . . .	℥ jv
Agua pura. . . . .	℥ xx

En las calenturas pútridas, se da una taza de esta mixtura. En la sarna es menester comenzar por una dosis menor.

### MIXTURA DIAFORÉTICA DEL MISMO.

Antimonio diaforético lavado. . . . .	℥ ij
Espíritu de mindero. . . . .	℥ jv
Agua de flor de sauco. . . . .	℥ viij

Mézclese.

Esta mixtura se usa en las calenturas agudas, en que es menester promover la transpiracion y refrescar al mismo tiempo. Cada dos horas se da media taza.

## MURIATO DE AMONIACO COBRIZO

DEL DR. VAN-MONS.

Muriato de cobre. . . } partes iguales.  
— de amoniaco. . . }

Disuélvase en el agua, y se añade de gota en gota cantidad suficiente de amoniaco líquido, hasta que forme un precipitado; se lava y se hace secar.

Se usa en la epilepsia, mezclada con los polvos de valeriana silvestre.

Dosis de dos á veinte y hasta treinta granos por dia mientras no ocasione náuseas.

## MURIATO DE AMONIACO Y DE HIERRO

Sulfato de hierro. . . } partes iguales.  
Muriato de amoniaco. }

Disuélvese en s. q. de agua hirviendo cuando esta esté fria, precipítese la disolucion con el amoniaco líquido y se lava el precipitado.

Se da en las escrófulas, caquexia, raquitis y en las enfermedades linfáticas.

Dosis 12 á 24 granos.

## MURIATO DE ORO Y SOSA.

Oro muy puro. . . . . } partes iguales.  
 Muriato de sosa. . . . }

Disuélvase el oro en el ácido nitro-muriático, añádese el muriato de sosa, fíltrese y evapórese hasta sequedad.

Se usa contra la tisis que resulta de las enfermedades venéreas: se administra cuando ya no sirve el mercurio.

Dosis de 3 á 6 granos por día, incorporados con el xarabe de goma arábica.

## MURIATO DE MERCURIO

DE HARTMANN.

Muriato de mercurio dulce. . . 3 partes  
 Muriato de hierro amoniacal. . 1 parte

Tritúrese y mézclese exactamente.

Estos polvos se dan en dosis de 20 á 30 granos.

En las enfermedades escrofulosas, en los infartos linfáticos y contra los gusanos intestinales.



## OGIMIEL PECTORAL DE LOS DANESSES.

Raiz de éñula campana. . . . . 3 j

Lirios de Florencia. . . . . 3 jv

Se dividen estas raices y se hacen hervir con treinta y seis onzas de agua de fuente.

Se cuele el cocimiento y se añade

Miel blanca. . . . . 16 j

Goma amoniaco. . . . . 3 j

Disuelta en suficiente cantidad de vinagre.

Se vuelve todo al fuego y se hace hervir hasta la consistencia de xarabe.

Esta preparacion se da en la tos y asma húmida, á cucharadas de tiempo en tiempo.

## OGIMIEL PECTORAL DE EDIMBURGO.

Goma amoniaco. . . . . 3 j

Raiz de éñula campana. . . } 3 jv

Lirios de Florencia. . . . . }

Miel. . . . . 3 viij

Despues de haber mondado, dividido y machacado las raices de éñula campana y de lirios, se hacen hervir con veinte onzas de agua hasta la reduccion de siete. Por otra parte se disuelve la goma amoniaco con tres onzas de vinagre bueno. Se mezcla esta dissolution al cocimiento de las raices, despues se decanta, y se cuele con un lienzo tupido; por

fin se añade la miel, y se cuece todo hasta la consistencia conveniente.

Este ogimiel se prescribe en dosis de onza á onza y media por dia en los efectos catarrales.



## OPIATA FEBRIFUGA DEL DR. E.

Diapruna purgante. . . . .	3 j
Xarabe de flores de persico. . .	3 j
Quina roja en polvo. . . . .	3 j
Muriato de amoniaco. . . . .	℥ j

Hágase una opiata que se dividirá en doce tomas.

Se toma una por la mañana y otra por la tarde: y una hora despues se toma caldo.

## OPIATA CONTRA LA LEUCORREA.

Conserva de rosas castellanas. .	3 iij
Conserva de romero. . . . .	} 3 j
Quina. . . . .	
Mucias. . . . .	5 ij
Catecú. . . . .	5 ij
Esencia de canela. . . . .	gotas n.º iij

Incorpórese con s. q. de xarabe de cortezas de naranja.

Se da esta opiata en dosis de dos dracmas mañana y tarde.

## OPIATA ESTOMACAL DE HELVETIUS.

Limonos confitados. . . . .	3 j
Nueces moscadas confitadas. . . . .	5 iij
Clavos confitados. . . . .	3 j
Gengibre confitado. . . . .	3 ij
Opiata de Salomon. . . . .	3 jv
Canela. . . . .	3 iij
Cascarilla. . . . .	3 ß
Acéite esencial de canela. . . . .	gotas x
— de clavos. . . . .	3 ij
Xarabe de claveles q. s.	

Este estomático es afrodisiaco. La dosis es de un escrúpulo hasta una dracma.

## OPIATA FEBRIFUGA DE TISSOT.

Polvos de centaurea. . . . .	} 3 j
— de mirra. . . . .	
— de ajeno. . . . .	
Conserva de enebro. . . . .	

Xarabe de ajenos s. q. para formar una opiata espesa.

La dosis es de dos dracmas.

## OPIATA DEL DR. LARREY.

Bálsamo de copaiva. . . . .	} aa 3 vj
Azucar. . . . .	
Goma arábica. . . . .	3 jß
Laca carmesina. . . . .	3 j
Agua de yerba buena piperita s. q.	

Esta opiata termina las gonorreas rebeldes.

Se toma mañana y tarde, uno ó dos escrúpulos de ella envueltos con un pedazo de hostia mojada. Durante el uso de esta opiata es menester comer poco, abstenerse de crudezas, y hacer ejercicio.

OPIATA Ó PASTA DEL DR. WARD  
PARA LAS ALMORRANAS.

Raiz de énula campana. . . . .	℥ iij
Semillas de hinojo. . . . .	℥ iij
Pimienta negra. . . . .	℥ j

Redúzcanse estas sustancias á polvo fino, y se pasan por un tamiz de seda; incorpórense con una mezcla de dos libras de miel é igual cantidad de azucar.

La dosis es el grueso de una nuez moscada, que se toma tres veces al día, bebiendo despues un vaso de tisana apropiada.




## OPIATA VERMIFUGA DE MALOET.

Sal de seignette en polvo. .	} aa 3 j
Jalapa idem. . . . .	
Valeriana idem. . . . .	
Ogimiel escilítico. . . . .	3 jv

Se mezcla todo bien.

Se da media onza de ella y hasta una onza por dia á los sugetos atormentados de gusanos, y aunque lo sean del ténia.



## OSMAZOMA DE THENARD.

Se escoge un músculo sin grasa, se pica muy menudo, se le echa poco á poco agua fria, y se amasa. Se cuele esta agua con un lienzo apto, y se calienta; se despuma cuando hierve; se filtra despues, y se evapora hasta la consistencia de extracto.

La Osmazoma, dada en dosis de una dracma, escita con su sabor los órganos digestivos, y los dispone para absorber los principios nutritivos. Sirve para restablecer el apetito de los convalecientes sin cargar su estómago.

Se preparan con esta sustancia unos polvos nutritivos muy cómodos para los viages; y son los siguientes:

Osmazoma seca. . . . .	3 j
Gelatina seca. . . . .	3 j
Goma arábica. . . . .	3 j
Clavos de especie. . . . .	} aa 3 xij
Pimienta machacada. . . .	
Simiente de apio. . . . .	
— de zanaoria. . . . .	

Se ponen á hervir tres onzas de estos polvos con una pinta de agua; se añade un poco de sal, se cuele y se tiene un caldo muy agradable y muy sano.



#### PASTA PECTORAL DE PARMENTIER.

Azucar de uvas. . . . .	3 xxviiij
Goma arábica. . . . .	1b ij
Agua q. s.	
Agua de flor de naranjo. . . .	3 iij

Despues de haber disuelto la goma arábica en el agua, se añade el azucar de uvas; se hace evaporar todo hasta la consistencia de xarabe muy espeso: se aromatiza con el agua de flores de naranjo, y se distribuye dicho xarabe en molde de oja de lata que se colocan en una estufa para dar fin á la evaporacion y darle la consistencia de pasta.

## PASTA CONTRA LOS SABAÑONES.

Almeddras amargas mondadas y machacadas. . . . .	3 viij
Miel. . . . .	3 vj
Alcool saturado con alcanfor. . .	3 ʒ
Harina de mostaza negra. . . .	3 jv
Alumbre calcinado. . . . .	} aa 3 ij
Incienso en polvo. . . . .	
Yemas de huevos. . . . .	nº. 8

M. S. A.

Se toma mañana y tarde el grueso de una grande avellana de esta composición; se friega con ella el pie ó la mano enferma añadiendo un poco de agua; despues se lava con agua tibia, y se enjuga con un lienzo fino: ó bien despues de cada friccion de las manos, se ponen los guantes por un cuarto de hora.

Esta pasta no puede servir sino es quando los sabañones no estan aun abiertos.



## PASTILLAS MOGOLAS.

Azucar. . . . .	3 iij ℞
Goma arábica. . . . .	3 j
Clavo. . . . .	} aa 3 iij ℞
Macias. . . . .	
Nuez moscada. . . . .	
Extracto de opio. . . . .	3 vij
Almizcle. . . . .	℥ v
Agua destilada de rosas q. s.	

Estas pastillas se toman despues de la comida, en dosis de una ó dos, para facilitar la digestion y excitar las fuerzas.

## PASTILLAS VERMIFUGAS

DE BARTHEZ.

Azucar. . . . .	℥ j
Muriato de mercurio dulce. . . . .	3 ij
Mucílago q. s.	

Se hacen pastillas de la magnitud de una peseta.

Estas pastillas se dan á los niños atacados de gusanos, á la dosis de una ó dos al dia. Los adultos pueden tomar de seis á ocho.

## PASTILLAS DE PELITRE

DEL DR. LACOMBE.

Infusion alcoólica de pelitre. . . . . 3 j

Azucar pulverizado. . . . . 3 x

Mucílago de goma tragacanto q. s. <sup>para</sup>  
 formar una masa blanda y homogénea, <sup>que</sup>  
 se divide en ciento y cincuenta rodelas.

La dosis es de cuatro á nueve por  
 dia en la angina gutural, laringea,  
 catarro pulmonar y pireneumonia  
 crónica, asma, tos convulsiva, y en  
 la disposicion á la tisis; por fin en  
 todos los casos en que el defecto de  
 expectoracion depende de la atonia  
 de las membranas mucosas sin calen-  
 tura y sin lesion orgánica de los pul-  
 mones.

## PASTILLAS DE GIN-SENG (1).

Gin-seng en polvo . . . . . 3 v

Vainilla. . . . . 3 x

Esencia de ambar. . . . . gotas x

Tintura de cantáridas. . . . . 3 v

Aceite de canela. . . . . gotas L

Azucar. . . . . 16 x

Mucílago q. s.

(1) Especie de panax.

Divídase en pastillas de veinte y cuatro á treinta granos.

Se dice que estas pastillas excitantes sirven para reanimar las fuerzas de los órganos de la generacion. Se toman cuatro ó cinco á una hora de distancia.

# PASTILLAS DE MERCURIO SACCARINO DEL DR. LAGNEAU.

Mercurio vivificado de cinabrio.	3 ij
Gema arábica. . . . .	3 j
Vainilla. . . . .	3 j

*O bien*

Esencia de cidra. . . . .	gotas viij
Azucar en polvo. . . . .	3 x

Háganse quinientas setenta y seis pastillas que cada una contiene dos granos de mercurio (1).

---

(1) Debe procederse para extinguir el mercurio en los mismos términos que para hacer las pildoras gomosas de Plenck antes de hacer las pastillas. N. T.

## PASTILLAS DEL DR. DUBOIS

PARA LOS INFARTOS DEL CUERPO  
TYLOIDES.

Esponja quemada en polvos. . .	3 j
Carbonato de sosa. . . . .	3 jv
Polvos de canela. . . . .	3 ij
Zumo de regaliza. . . . .	3 ij 3 vj
Mucílago de goma tragacanto q. s.	

Háganse S. L. pastillas de diez  
granos para tomar una cada tarde.

PASTILLAS PECTORALES INCISIVAS  
Y CALMANTES DEL DR. A. JOBARD.

Ipecacuana. . . . .	3 lj
Opio gomoso. . . . .	3 j
Cachos de cebolla albarrana seca. . . . .	granos lxjv
Oxido de antimonio sulfurado rojo. . . . .	granos lxij
Azúcar blanco. . . . .	3 ij
Mucílago de goma tragacanto q. s.	

De esta cantidad se hacen cerca de  
cuatrocientas pastillas; mas para los  
niños es menester hacerlas mas pe-  
queñas. No se toma mas de una á la  
vez cada dos horas.



PÍLDORAS FEBRIFUGAS INGLESAS.

Tártaro estiviado. . . . . granos xviii  
Sal de ajeno. . . . . } aa 3 j  
Muriato de amoniaco. . . . }  
Quina. . . . . 3 j  
Xarabe de quina q. s.

(De todo se forman doce bolos de los que se toman cuatro por día antes de la accesion á la mayor distancia posible de la próxima accesion. P.)

PÍLDORAS DE ESCILA COMPUESTAS.

Pharmacopœia de Londres.

Cebolla albarrana seca. . . . . 3 j  
Gengibre. . . . . } 33 3 iiij  
Xabon medicinal. . . . . }  
Goma amoniaco. . . . . 3 ij

Se mezclan los polvos, se incorporan con el xabon, añadiendo una cantidad suficiente de xarabe, para dar á la mezcla la consistencia pilular.

(Estas píldoras se emplean con suceso en los efectos catarrales crónicos de las vías aéreas &c; en dosis de doce, quince, diez y ocho, veinte y

cuatro granos por dia, segun la edad y el estado del enfermo. Aun se puede llevar la dosis mas alla. P.)

## PÍLDORAS TÓNICAS

DE BACHER.

Extracto de eleboro negro.	} aa 3j
Mirra escogida. . . . .	
Cardo santo en polvo. . . . .	3j 3j

Se toma una onza y cinco dracmas de eleboro negro de Suiza, se machaca y se mete en un matras con cuatro libras de alcohol debilitado, y cinco onzas y media de agua, que tienen en disolucion tres dracmas y media de potasa carbonizada. Despues de veinte y cuatro horas de infusion se cuela con un lienzo, se filtra la colatura y se conserva á parte; despues se toma la hez que queda en el lienzo, se pone en el mismo matras con vino del Rin ó de Grabe hasta que este suba arriba dos dedos, se deja en infusion cuarenta y ocho horas; despues de este tiempo se cuela el licor, se esprime la hez, se reunen los licores y se hace evaporar hasta la consistencia pílular. Con este extracto, el cardo santo, y la mirra reducidos á polvo muy fino. Bacher componia sus píldoras.

Nota. Es muy importante escoger el eleboro negro que se cria en Suiza, o mejor aun, el *elleborus hiemalis*.

## PÍLDORAS ESTOMACALES

### DE CADET.

Acibar. . . . .	} āā ḡ viij
Sal esencial de quina. . . . .	
Resina de guayaco. . . . .	ḡ xxijv
Xabon medicinal. . . . .	ḡ vj
Goma amoniaco. . . . .	ḡ jv
Etíope marcial. . . . .	

Para doce píldoras, de las que se tomarán dos al ponerse á comer.

### PÍLDORAS TÓNICAS DE STOLL.

Limaduras de hierro. . . . .	} āā 3 ij
Extracto de centaurea menor. . . . .	
Goma amoniaco. . . . .	

### PÍLDORAS ANTI-DISENTÉRICAS

#### DEL DR. WILLIS.

Cera amarilla. . . . .	3 jv
Blanco de ballena. . . . .	} āā 3 j
Catecú. . . . .	
Aceite esencial de canela. . . . .	gotasxij

Háganse píldoras de seis granos.

(Este medicamento se usa en las disenterias crónicas pasivas. Se toman tres píldoras por día. P.)

## PÍLDORAS ASTRINGENTES

DE CAPURON.

Catecú. . . . .	ʒ xij
Alumbre. . . . .	ʒ vj
Opio. . . . .	ʒ ij
Mézclese.	

Háganse píldoras de cinco granos.  
Se toman una ó dos por dia en la terminacion de las gonorreas.

## PÍLDORAS DE ALUMBRE

DE HELVETIUS.

Alumbre de roca. . . . .	ʒ ij
Sangre de drago en polvo. . . .	ʒ j

Se hace derretir el alumbre en una cuchara de hierro; se añade la sangre de drago, se forma una pasta que se divide en píldoras de tres granos, mientras que la mezcla está caliente.

(Estas píldoras son astringentes. Se dan de seis, doce y treinta y seis granos en los perdimientos, hemorragias pasivas, flujo hemorroidal inmoderado, esputo y vómito de sangre pasivos. P.)

## PÍLDORAS ANTI-HISTÉRICAS

DE BUCHAN,

Acibar socotrino. . . . .	} aa 3 j
Rubarbo. . . . .	
Xabon medicinal. . . . .	
Xarabe común q. s.	

Háganse píldoras de cinco á seis granos.

(Se dan cinco ó seis dos ó tres veces al dia, en la íctericia, despues del período del espasmo. P.)

## PÍLDORAS DE GREDING

CONTRÁ LA ICTERICIA.

Estracto de bella dona. . . .	℥ xxjv
Polvos de las hojas de la misma planta. . . . .	℥ xv

Háganse píldoras de medio grano.

Todos los dias se dan dos, una por la mañana y otra por la tarde. Los enfermos experimentan un calor considerable en todo el cuerpo, pulsaciones de las arterias mas frecuentes, una especie de embriaguez y sudores. A estos síntomas se siguen cá

maras verdosas y orinas copiosas: se concluye la curacion con el ruibarbo y el sulfato de magnesia.

(*Estractado de QUARIN.*)

PÍLDORAS FUNDENTES DE LEMONNIER,  
MEDICO DEL REY.

Azafran de Marte aperitivo.	℥ij
Mirra escogida. . . . .	} āā ℥ij
Goma amoniaco. . . . .	
Gálbano. . . . .	
Acibar socotrino. . . . .	} āā ℥ xij
Muriato de mercurio dulce. . . . .	
Azufre dorado de antimonio. . . . .	

Se incorpora todo con suficiente cantidad de xarabe de las cinco raices aperitivas, y se hacen píldoras de tres granos cada una.

Se dan tres por la mañana á los enfermos atacados de obstrucciones, y otras tres una hora antes de cenar.

PÍLDORAS DE ACÓNITO MERCURIALES  
DEL DR. DOUBLE.

Extracto de acónito napello. . .	℥ij
Sublimado corrosivo. . . . .	℥ ij

Tritúrese mucho tiempo en un almirez de

vidrio para hacer una mezcla muy exacta, y divídase en veinte píldoras iguales.

Estas píldoras son útiles contra los herpes inveterados, complicados con afecto sórico ó venéreo, contra las enfermedades venéreas antiguas, los infartos linfáticos, las escrófulas &c.

Se dan en dosis de una píldora mañana y tarde: aumentando todos los dias una píldora.

## PILDORAS DEL DR. MERAT

CONTRA EL BAILE DE SAN VITO.

Nitrato de plata fundido. . . .	ꝯvj
Extracto de opio gomoso. . . .	3j
Mosco en polvo. . . . .	ʒij
Alcanfor. . . . .	ʒiv

Háganse noventa y seis píldoras.

Cada píldora contiene:

$\frac{1}{16}$  gr. de nitrato de plata.

$\frac{3}{4}$  gr. de opio.

$\frac{1}{2}$  gr. de mosco.

I gr. de alcanfor.

Cuando se empieza el tratamiento se dan dos al dia, una por la mañana, y otra por la tarde: mas adelante se pueden dar tres, y hasta cuatro.

Se bebe al mismo tiempo una tisana anti-espasmódica qualquiera.

(Se podrian usar estas píldoras contra ciertas epilepsias. P.)

## PÍLDORAS ORIENTALES.

Opio purificado. . . . .	} partes iguales.
Azafran. . . . .	
Canela. . . . .	
Nuez moscada. . . . .	
Cardamomo. . . . .	

Xarabe de flor de azahar q. s.

Se hacen píldoras de tres granos.

Esta preparacion se usa para procurar un sueño acompañado de ensueños extáticos.

Se dan dos ó tres píldoras por la noche una hora antes de acostarse.

## PÍLDORAS MARCIALES

DE SIDENHAM.

Limaduras de hierro porfirisadas. . 3 ij

Extracto blando de ajeno s. q.

Se forma una masa pilular, á la que conviene añadir á veces, segun la prescripcion del médico, un drac-



ma de canela en polvo, y alguna vez media dracma de acibar.

(Estas píldoras son tónicas fortificantes; se toman en dosis de un escrúpulo, dos veces al día, en la hipochondria, histérico y caquexia. P.)

### PÍLDORAS ANTI-ESPASMÓDICAS DE PIDERIT.

Asafétida. . . . .	} āā 3j
Castoreos. . . . .	
Acido succínico concreto. . . .	ḡ xxxvj
Aceite animal de Dippel. . . .	gotas xx
Tintura de mirra q. s.	

Se forma segun arte una masa que se divide en píldoras del peso de cinco granos.

Algunas veces se añade, segun la prescripcion del médico, cierta cantidad de extracto de opio.

(La dosis es de doce á treinta y seis granos. P.)

## PÍLDORAS DE LOS TRES DIABLOS *de Maétzius.*

Trociscos de coliquintidas (alhandal). . . . .	}	āā ḡ jv
Escamonea de Alepo (dia- gridio). . . . .	}	
Muriato de mercurio dulce. . .		ḡ viij
Xarabe de cantueso s. q.		

Háganse segun arte cuatro píldoras, lo que segun dice el autor, es la mayor dosis que se pueda dar al hombre mas robusto.

(Maétzius prescribe estas píldoras en la gonorrea, para relajar el vientre, disminuir la inflamacion del canal de la uretra, y favorecer la reaccion crítica: no se deben emplear estos medios derivativos, sino es con mucha precaucion. Muchas veces son inútiles. P.)

## PÍLDORAS ANTI-CATARRALES

DEL DR. PARISET.

Tartrito antimoniado de potasa. . . . .	}	āā ḡ liij
Opio gomoso. . . . .	}	
Goma tragacanto. . . . .		ḡ x

Conserva de rosas, suficiente cantidad para hacer sesenta píldoras de las que se tomarán dos por la mañana, y dos por la tarde.

Esta preparacion obtiene felices efectos sobre todo en los catarros antiguos, que por exceso de irritacion se ha resistido al tiempo y á los remedios.

## PÍLDORAS ANTI-CATARRALES

Y CALMANTES DEL DR. PETIT.

Manteca de cacao. . . . . }  $\overline{\text{sa}}$   $\text{D}$  ij  
 Goma arábica. . . . . }  
 Extracto gomoso de opio. . . .  $\text{f}$  xij  
 Xarabe de ipecacuana q. s.

Háganse píldoras de cinco granos, que se envolverán con los polvos de raiz de malvavisco. Se da una todas las noches al momento de acostarse.

## PÍLDORAS ANTI-SIFILÍTICAS

DE ALIBERT.

Muriato de mercurio dulce. }  $\overline{\text{aa}}$   $\text{3}$  ij  
 Resina de guayaco. . . . . }  
 Malvavisco en polvo. . . . .  $\text{3}$  jv  
 Xarabe de membrillo q. s.

Háganse píldoras de cuatro granos.

La dosis es de cinco á seis píldoras por dia.

PÍLDORAS LAXANTES Y FUNDENTES  
DEL DR. SANCHEZ.

Sublimado corrosivo. . . . .	} $\overline{\text{aa}}$ $\overline{\text{ss}}$ viij
Turbith mineral. . . . .	
Mercurio sublimado dos veces. $\overline{\text{ss}}$ xij	
Alcanfor. . . . .	} $\overline{\text{aa}}$ 3 $\beta$
Almizcle. . . . .	
Raiz de gengibre. . . . .	} $\overline{\text{aa}}$ 3 ij
Azucar. . . . .	

Tritúrese exactamente en un almirez de vidrio; añádase

Extracto de jalapa. . . . .	} $\overline{\text{aa}}$ 3 ij
— catártico de la farmacia de Londres. . . . .	
Píldoras de Rufus. . . . .	} $\overline{\text{aa}}$ 3 j
Gálbano. . . . .	
Extracto de regalicia. . . . .	} $\overline{\text{aa}}$ 3 j $\beta$
Asafétida. . . . .	
Sal de duobus. . . . .	} 3 $\beta$
Bálsamo peruviano. . . . .	
Elixir de propiedad dulce q. s.	

Hágase una masa pilular que se dividirá en píldoras de cuatro granos.

Tomándolas á la dosis de cuatro, seis, ocho, diez, doce, quince por dia, siguiendo gradualmente.

(Cada píldora contiene  $\frac{1}{11}$  de sal mercurial. P.)

# PILDORAS MERCURIALES

## DE MOSCATI.

Mercurio soluble de Moscati (1).  $\mathfrak{z}$  ij  
 Extracto de *mosco* de quina. . .  $\mathfrak{z}$  ij  
 — gomoso de opio. . . . .  $\mathfrak{g}$  xij

Háganse veinte píldoras de las que se toma una por la mañana y otra por la tarde.

Si el enfermo es de buena constitucion, que no haya experimentado la salivacion durante el uso de otros mercuriales, el Dr. Moscati prescribe cuatro escrúpulos de óxido de mercurio, un escrúpulo de opio, y media onza de extracto de quina, y hace dividir la masa en veinte bolos, que se toman del mismo modo mañana y tarde. Si por el contrario el sujeto es debil, y ha padecido el tialismo, M. Moscati limita la prescripcion á un solo escrúpulo de óxido de mercurio, doce granos de opio, con media onza de extracto de corteza del Perú.

---

(1) Se puede emplear el mercurio de Hahenmann ó el de Moretti. (*Véanse* estos nombres en la tabla).

Otro medicamento que M. el Dr. Franck ha visto contribuir de un modo especial á los buenos efectos del óxido de *Moscatti* es el cocimiento de la corteza de *mecereon*. El aconseja prescribirla de este modo:

Corteza de la raíz de *mecereon*. 3 ij

Hágase hervir con una pinta de agua, y cuélase. Añádese á la colatura tres onzas de *xarabe de altea*.

Se toma este cocimiento en el espacio de veinte y cuatro horas. Si produce calor al paladar ó al estómago, se reducirá la dosis de *mecereon* á una sola dracma por la misma cantidad de agua; ó bien se añadirá ya sea leche, ya sea goma arábiga, ó la raíz de *regalicia*, de *malvavisco*, de *zarparrilla*, segun lo exigen los casos.

## PÍLDORAS PURGATIVAS FUNDENTES

DEL DR. SAIFERT.

Extracto de genciana. . . . . 3 jv

Hiel de buey. . . . . 3 iij

Escamonea. . . . . 3 ij

Mézclese y divídese en ciento sesenta y dos píldoras.

Todos los dias se dan cuatro á seis en ayunas, ó antes de comer.

## PÍLDORAS MATRICALES

DE KOEMPF.

Gálbano purificado. . . . .	} aa 3 j
Muriato de amoniaco. . . . .	
Asafétida. . . . .	} aa 3 jv
Sulfato de potasa. . . . .	
— de hierro. . . . .	3 xxjv
Vinagre escilítico. . . . .	

Póngase todo al fuego y agítese hasta que la mezcla espesada tenga la consistencia de extracto.

Añádanse á la masa enfriada cuarenta y ocho gotas de aceite de succino; mézclese y divídase en píldoras de cuatro granos.

(Se dan en dosis de doce, veinte, treinta, treinta y seis granos por dia en la caquexia y clorosis. P.)

## PÍLDORAS SUDORÍFICAS CALMANTES

DE M. DUMERIL.

Extracto de beleño. . . . .	3 ij
— gomoso de opio. . . . .	8 xij
Oxido de antimonio sulfu-	} aa 8 xxij
rado paranjado. . . . .	
— hidro sulfurado rojo. . . . .	

Háganse S. L. setenta y dos píldoras iguales.

La dosis es de dos á cuatro, la mitad por la mañana y la otra por la tarde, segun la edad y el estado del enfermo; estas píldoras son anti-espasmódicas; son útiles en las toses nerviosas rebeldes; y excitan el sudor.

## PÍLDORAS DE BOULLAY

CONTRA LA GONORREA.

Xabon medicinal. . . . . 3 j  
 Nitro. . . . . }  $\overline{aa}$  3 jv  
 Alcanfor. . . . . }  
 Extracto aquoso de opio. . . . . 3 j  
 Xarabe de ninfea s. q.

Para formar segun arte, píldoras de cuatro granos cada una.  
 Se dan de dos á seis granos por dia.

## PÍLDORAS FUNDENTES

DEL DR. SMITH.

Goma amoniaco. . . . . }  $\overline{aa}$  3 j  $\beta$   
 Xabon medicinal. . . . . }  
 Cebolla albarrana. . . . . }  $\overline{m}$  3  $\beta$   
 Polvo diarematon. . . . . }  
 Aceite volatil de enebro. . . . gotas xx  
 Xarabe de cortezas de naranja q. s.



Háganse píldoras de cinco granos. Cada tres dias se toman cuatro de estas píldoras, y despues se beben cuatro onzas de cocimiento de rubia ó granza.

Es útil en la ictericia y en los efectos epáticos.

## PÍLDORAS FUNDENTES

DE RICHTER.

Goma amoniaco. . . . .	} 3ā 3 ij
Asafétida. . . . .	
Xabon medicinal. . . . .	
Raíz de valeriana. . . . .	
Flores de arnica montana.	
Tartrito antimoniado de po-	
tasa disuelto en el agua. . .	ḡ viijá x

Mézclese ; háganse píldoras de cuatro granos.

Se dan estas píldoras en los mismos casos que las precedentes, cada tres ó cuatro horas.

## PÍLDORAS INCISIVAS

DEL DR. J. J. LE-ROUX.

Cebolla albarrana en polvo. . .	3 j
Extracto gomoso de opio. . . .	ḡ vj
Kermes mineral. . . . .	ḡ viij

Manteca de cacao, q. s. para formar treinta y seis píldoras.

Estas píldoras convienen en los efectos catarrales; se dan tres ó cuatro por día.

## PILDORAS DE DEDALERA

DE WITHERING.

Hojas de dedalera purpúrea	} āā 3 j
secas. . . . .	
Asafétida. . . . .	

Se dan una ó dos de estas píldoras en los afectos hidrópicos.

## PÍLDORAS PURGANTES DE HAEN.

Extracto católico (1). . . . .	3 j
Resina de jalapa. . . . .	} āā 3 jv
Escamonea. . . . .	

(1) El extracto católico se hace con  
 extracto de acibar. . . . . 3 j  
 — de eleboro negro. . . . . 3 ij  
 — de colocintida. . . . . 3 j  
 Raiz de jalapa. . . . . } āā 3 j β  
 Escamonea. . . . . }

(Se usa á veces para purgar en dosis de doce á diez y ocho granos; mas este dáctico violento no conviene sino á los temperamentos flegmáticos. P.)

Alcool para reblandecer las sustancias, cantidad suficiente.

Se hacen píldoras de cuatro granos.

Este dástrico violento no se administra sino en dosis de diez á veinte granos en la hidropesía y en las enfermedades asténicas.

## PÍLDORAS DE PLUMIER.

Muriato de mercurio dulce	} = 5 iij	
Azufre dorado de antimonio.		
Zumo de regaliza depurado. . .		5 ij
Mucílago de goma arábica q. s.		

Fórmense píldoras de seis granos.

Estas píldoras se toman en dosis de dos ó tres, mañana y tarde, en las enfermedades cutáneas, ó síñtíticas. Se bebe despues de cada dosis un vaso de cocimiento de los leños sudoríficos ó de zarzaparrilla.

## PÍLDORAS ESCOCESAS.

Hay muchas fórmulas con el nombre de píldoras escocesas en los dis-

pensatorios ingleses. La receta *del Dr. Anderson* es la siguiente

Guta gamba (cambogia) . . . . .	} añ 3 ij
Acibar socotrino. . . . .	
Aceite volatil de anis. . . . .	gotas xxx
Xarabe simple q. s.	

Se hacen píldoras de cuatro granos. En dosis de tres á cuatro: son purgantes. Cuando no se desea mas que tener el vientre libre, solo se toma una al acostarse. Los ingleses llaman tambien á estas píldoras *scotch pills*.

### OTRA RECETA.

Guta gamba. . . . .	} añ 3 ij
Azibar socotrino. . . . .	
Polvos de canela compuestos. . . . .	} añ 3 ij
Xabon medicinal. . . . .	

### OTRA RECETA.

Tártaro emético. . de medio á un grano.  
 Acibar socotrino. . . . . ḡ xvj  
 Mucílago de goma tragacanto s. q.

De todo háganse cuatro píldoras arrollándolas en los polvos de lirios.

Estas píldoras muchas veces obran como á vomitivas, y fatigan á los en-

fermos. No se debe llamar pues con el nombre de píldoras escocesas sino á las dos primeras fórmulas, que son muy análogas.

Estas son purgantes. Se dan en dosis de una á dos.

## PÍLDORAS EMÉTICAS

DE BOERHAAVE.

Tártaro emético. . . . . ʒ iv

Miga de pan q. s.

Háganse cuatro píldoras.

Se toman en las calenturas intermitentes. La dosis es de una á dos ántes del paroxismo.

## PÍLDORAS LAXANTES DE BUCHAN.

Xabon blanco. . . . . ʒ iʒ

Sagapeno. . . . . ʒ i

Extracto de taraxacon. . . . . ʒ i

Acibar socotrino. . . . . ʒ i

Mézclese y háganse píldoras de tres granos cada una.

La dosis de estas píldoras que se dan en la constipacion ó estreñimiento, es de tres á nueve que se toman en dos veces, por la mañana y por la tarde.

## PÍLDORAS HIDRAGOGAS

DE JANIN DE LION.

Sen. . . . .	℥ j
Acido tartaroso. . . . .	℥ ij ℥ j ℞
Agárico. . . . .	} āā ℥ vj ℥ ij
Mechoacan. . . . .	
Ruibarbo. . . . .	
Escamonea. . . . .	
Raiz de brionia. . . . .	
Hermodátiles. . . . .	
Turbit gomoso. . . . .	} āā ℥ ij
Gota gamba. . . . .	
Trociscos de alhandal. . . . .	
Muriato de mercurio dulce. . . . .	
Tárritrto de potasa antimoniado. . . . .	
Carbonato de hierro. . . . .	} āā ℥ viij ℞
Nitrato de potasa. . . . .	
Jalapa. . . . .	} āā ℥ j
Acibar socotrina. . . . .	
Sulfureto negro de mercurio. . . . .	℥ v
Agua comun. . . . .	℥ vj

Hágase hervir el sen y el ácido tartaroso con las seis libras de agua durante un cuarto de hora, cuélese despues esprimiendo fuertemente; métese el licor en una holla de hierro que se pondrá al fuego; añádanse las otras sustancias poco á poco y que estén porfirizadas y mezcladas exactamente, agítese esta mezcla sin parar, y déjese á un fuego suave hasta que tenga la consistencia pilular; retírese la olla del fuego y divídase la masa en

Píldoras del peso de cuatro granos. Envuélvanse en los polvos de jalapa, y háganse secar (1).

## PÍLDORAS ESCILÍTICAS

*de la farmacopea de Edimburgo.*

Xabon medicinal. . . . .	3 j
Cebolla albarrana pulveri-	} aa 3 B
zada. . . . .	
Nitrato de potasa. . . . .	
Bálsamo de copaiva q. s.	

Se forma una masa que se divide en píldoras de cuatro granos.

Se dan en la hidropesía, y en la retencion de orina. La dosis es de tres á cuatro en ayunas.

## PÍLDORAS INCISIVAS DE CADET.

Ipecacuana. . . . .	3 ij
Cebolla albarrana en polvo. . .	3 jv
Extracto gomoso de opio. . . .	8 xv
Manteca de cacao. . . . .	3 j
Xarabe de goma s. q.	

---

(1) La jalapa no es á propósito para envolver las píldoras porque escitan fuertemente las fauces causando tos, ardor y una molestia insupportable. N. T.

Estas píldoras convienen en los romadizos y en los catarros. Se dan dos por mañana y otras dos por la tarde.

## PÍLDORAS ANTI-ARTRÍTICAS

DE VICQ D'AZIR.

Raiz de guayaco. . . . .	} 3ā 3 j
Muriato de mercurio dulce. . . . .	
Xabon medicinal. . . . .	3 jv
Extracto de hiel de buey (seco). . . . .	3 ij
Guayaco en polvos q. s.	

Háganse píldoras de cuatro granos. La dosis es de dos á cuatro, la mitad por la mañana y la otra por la tarde.

## PÍLDORAS FUNDENTES

DEL MISMO.

Extracto de hiel de buey (seco). . . . .	} 3ā 3 ij
— De centaurea menor. . . . .	
Corteza Winterana. . . . .	} 3ā 3 j
Etíope marcial. . . . .	

Háganse píldoras de cuatro granos.

Se prescriben en las obstrucciones. La dosis es de cuatro á seis por día.



## PÍLDORAS STÉNICAS

DE BRORON.

Kermes mineral. . . . .  $\text{ḡ xv}$   
 Opio puro. . . . . }  $\text{āā ḡ x}$   
 Muriato de mercurio dulce.  
 Bálsamo peruviano s. q.

Para formar píldoras de un grano, de las que se toman una ó dos por la mañana y otras tantas por la tarde.

El Dr. Broron aconseja estas píldoras en la tisis pulmonar, hidropesía y espasmo.

## PÍLDORAS INCISIVAS PECTORALES

DE BUCHAN.

Bulvos de cebolla albarra-  
 na fresca. . . . . }  $\text{āā 3 ij}$   
 Goma amoniaco. . . . .  
 Semillas de cardamomo. .

Xarabe comun q. s. para píldoras de cuatro granos.

Se dan tres ó cuatro de estas píldoras, dos ó tres veces al dia en la tisis incipiente.

## CONFITES Ó PILDORAS

DE KEYSER.

Tierra foliada mercurial (acetato de mercurio). . . . .	3 ij
Azucar. . . . .	3 vj
Goma arábica. . . . .	3 j
Malvavisco en polvo. . . . .	} aa 3 jv
Almidon. . . . .	
Mucilago de goma arábica q. s.	

Háganse píldoras de un grano, envolviéndolas en el azucar.

La dosis es de dos á cuatro por día en las enfermedades sifilíticas.

## PILDORAS MERCURIALES

DE RENOU.

Mercurio destilado. . . . .	3 xj
Acibar socotrino. . . . .	3 v
Ruibarbo. . . . .	3 iij
Escamonea. . . . .	3 ij
Agarico blanco. . . . .	3 j
Sassafras. . . . .	} aa 3 j
Canela. . . . .	
Macis. . . . .	
Miel de Narbona q. s.	

Estas píldoras son algo purgantes;

y convienen en las enfermedades cutáneas. La dosis es de doce á cuarenta y ocho granos.

## PÍLDORAS MERCURIALES DE BRUGNATELLI.

Mercurio purificado. . . . .	} ʒ 3 j
Conserva de rosas. . . . .	
Almidon. . . . .	ʒ ij

Estíngase el mercurio en la conserva. Añádese si es menester un poco de mucilago; agréguese el almidon, y divídase la masa en cuatrocientas ochenta píldoras iguales.

Cada cuatro granos contienen un grano de mercurio.

Se dan en las enfermedades sifilíticas.

## PÍLDORAS MERCURIALES DE PLENK.

Mercurio destilado. . . . .	ʒ j
Mucilago de goma arábiga. . . . .	ʒ vj

Estíngase perfectamente el mercurio; después añádese

Extracto de cicuta. . . . .	ʒ j
-----------------------------	-----

Háganse píldoras de dos granos.

Se dan de cuatro á seis de estas píldoras por dia en las enfermedades venéreas.

## PÍLDORAS MERCURIALES

DEL DR. SEDILLOT EL MAYOR.

Pomada mercurial. . . . . 3 iij

Xabon medicinal. . . . . 3 ij

Almidon ó polvos de regalicia. 3 j

Mézclese, y háganse píldoras de cuatro ó seis granos. Se toman dos ó tres por dia en las enfermedades venéreas graves.

## PÍLDORAS MERCURIALES

DE CADET.

Mercurio líquido y purificado. . 3 ij

Trementina. . . . .

Flores de azufre. . . . . } añ 3 ij

Gutagamba. . . . .

Maná en lágrimas. . . . . 3 j

Jalapa en polvos. . . . . 3 jv

Xarabe de espinó cervical q. s.

Háganse píldoras de cuatro granos.

Estas píldoras se dan en dosis de tres á seis por dia, en los efectos venereos o herpéticos.

## PILDORAS DE QUARIN

CONTRA EL ASMA.

Esponja marina calcinada. . . . .	3 jv
Extracto de fumaria. . . . .	} 3ā 3 ij
Goma amoniaco. . . . .	
Flores de azufre. . . . .	
Sulfureto de antimonio. . . . .	3 j

Háganse píldoras de tres granos.

Se toman seis, y gradualmente hasta diez ó doce, tres veces al dia.

Convienen particularmente en el asma causado por las escrófulas ó en el asma húmedo.

## PÍLDORAS ANTI-EPILEPTICAS

INGLESAS.

Nitrato de plata. . . . .	8 j
Miga de pan. . . . .	3 j

Amásese exactamente, y divídase en veinte píldoras, de modo que cada una no contenga sino una vigésima parte de grano.

No se dá mas que una á la vez.

## PILDORAS DE QUARIN,

CONTRA LA EPILEPSIA.

Raiz de valeriana silvestre. . . . .	3 vj
Gálbano. . . . .	} añ 3 j ß
Sagapeno. . . . .	
Asafétida. . . . .	3 j

Háganse píldoras de tres granos.

Se dan de dos á cuatro á las mu-  
geres histericas, que experimentan  
accidentes epilépticos.

## PILDORAS BLANCAS

DE BARTHEZ.

Jalapa. . . . .	3 ß
Azulraa de Marte. . . . .	3 ij
Muriato de mercurio dulce. . . . .	5 ß
Mil pies. . . . .	9 ij

Xarabe de cinco raices q. s.

Háganse píldoras de cuatro gra-  
nos.

Se dan dos de estas píldoras por  
dia en las enfermedades escrofulosas.

## PILDORAS CARMINATIVAS

DEL MISMO.

Asafétida. . . . .	3 ij
Aeibar socotrino. . . . .	} aa 3 j
Sal de Marte. . . . .	
Gengibre en polvo. . . . .	

Elixir de propiedad q. s.

Háganse píldoras de cuatro granos.  
Se dan cuatro ó cinco cada noche al momento de acostarse el enfermo.

## PILDORAS ANTI-HELMÍNTICAS

DE SCHMUCHER.

Semillas de cebadilla. . . . .	} aa 3 jv
Miel. . . . .	

Aceite volatil de hinojo. . . . . gotas xx

Háganse píldoras de veinte granos.

La dosis para los adultos, es de seis mañana y tarde; para los niños una ó dos.

## PÍLDORAS ANTI-CAQUÉCTICAS

### DE HAEN.

Xabon medicinal. . . . . 3 jv  
 Goma amoniaco. . . . . 3 iij  
 Masa de píldoras de Rufo. . . . 3 ß  
 Tintura de mirra q. s.

Se hacen píldoras de tres granos.

Se dan cuatro cada tres dias en la supresion de la menstruacion.

## PÍLDORAS ESTOMÁTICAS

### DE SMITH.

Resina de acibar socotrino.	} rā 3j
— de sagapeno. . . . .	
Ruibarbo en polvo. . . . .	
Polvo diaromaton. . . . .	} rā x gotas
Aceite esencial de yerba buena. . . . .	
— de clavos. . . . .	

Bálsamo líquido del Perú q. s.

Háganse píldoras de cuatro granos.

Se dan tres ó seis de estas píldoras todas las tardes en la dispepsia y en las indigestiones.



# PILDORAS TÓNICAS DEL DR. HULN Ó PILDORAS DE MOSCOU.

Extracto de raíz de colombo. . .	} aa 3 ij
— de raíz de genciana . . . . .	
— de quasía amarga. . . . .	
— de hiel de buey. . . . .	
Polvos de genciana q. s.	

Dívidase en píldoras de cuatro granos.

Se da este remedio en dosis de una ó dos píldoras inmediatamente después de haber comido.

Se bebe después una taza de infusión fría de quasía.

Conviene en la debilidad de estómago y en las digestiones perezosas.

## PILDORAS COBRIZAS

DE SWEDIAUR.

Sulfato de cobre amoniaco. . .	℥ xvj
Miga de pan. . . . .	℥ jv
Carbonato de amoniaco líquido q. s.	

Se divide la masa en noventa y seis píldoras. Cada píldora debe contener una sexta parte de grano de sal cobriza.

Se dan dos ó tres por día en la epilepsia y en las enfermedades rebeldes.

### PÍLDORAS DEL DR. SANTA MARÍA

PARA TERMINAR LA GONORREA.

Conserva de rosas castellanas. . . . .	3 jv
Sangre de drago. . . . .	3 jv
Muriato de mercurio dulce. . . . .	3 j
Bálsamo de copaiva. . . . .	3 j
Mézclese.	

Se da en dosis de media dracma dos veces al día; se puede llevar hasta dos escrúpulos en los sujetos robustos. El uso del agua acerada mezclada con una cuarta parte ó con la mitad de buen vino en las comidas principales, favorece perfectamente los efectos de este remedio.

### PÍLDORAS DE QUARIN

PARA TERMINAR LA GONORREA.

Goma arábiga. . . . .	3 jv
Almáciga en lágrimas. . . . .	3 ij
Extracto de trementina. . . . .	3 j
Trementina cocida q. s.	

Háganse píldoras de cuatro granos.

Se toman de cinco á seis por la mañana y otras tantas por la tarde.

## PILDORAS ANTI-HISTÉRICAS

DEL DR. SELLE.

Gálvano. . . . .	} aa 3 jv
Asafétida. . . . .	
Extracto de angélica. . . . .	} aa 3 j
Castoreos. . . . .	
Azafran. . . . .	} 3 β
Opio. . . . .	

Háganse pildoras con la esencia de castoreos del peso de dos granos.

En los espasmos histéricos se pueden administrar desde cinco hasta ocho antes y despues de medio dia.

## PILDORAS BALSÁMICAS

DE BOERHAAVE.

Mirra. . . . .	3 ij
Blanco de Ballena. . . . .	3 jv

Macháquese y mézelese exactamente. Añá-  
dese

Trementina del chio. . . . . 3 jv  
Polvos de olibano q. s. para hacer píldo-  
ras de tres granos.

Se toma una cada tres horas en la tisis pulmonar.

## PÍLDORAS TARTÁREAS

DE SCHRODER.

Extracto seco de acibar preparado con el ácido tartaroso. . . . .	3 jv
Goma amoniaco en lágrimas. . . . .	3 jβ
Sulfato de hierro. . . . .	} 3̄ 3 jv
Extracto de azafran. . . . .	
Acetato de potasa. . . . .	3 j
Extracto de genciana. . . . .	3 vj
Tintura de hierro tartarizada q. s.	

Háganse píldoras de seis granos.

Se prescriben estas píldoras en las calenturas intermitentes, ictericia, clorosis y en las obstrucciones.

La dosis es de cuatro á ocho. Purgan ligeramente.

## PÍLDORAS DEL DR. DUPUY

CONTRA EL HIDRO TORAX.

Polvos de dedalera encarnada. . . . .	} 3̄ 3 j
— de asaétida. . . . .	
Extracto de trifolio acuático. . . . .	} 3̄ 3 jβ
Polvos de bulbo de cebolla albarrana. . . . .	

Mézclese exactamente, y háganse ciento y ocho píldoras.

El enfermo toma cuatro por la

mañana y otras cuatro por la tarde. Se favorece el efecto de estas píldoras con una bebida de parietaria nitrada, y á veces se hace mas activa añadiéndole, tres veces al dia, media onza de ogimiel escilítico.

## PÍLDORAS ANTI-HISTÉRICAS

DEL DR. COEROLOY.

Calomelanos. . . . . 3 j

Extracto de xabonera. . . . . 3 ij

Mézclese y háganse setenta y dos píldoras de las que el enfermo toma de una á dos por dia.



## POCION DIURÉTICA DE M. HALLE.

Aguas de las tres nueces. . . . 3 jv

Agua destilada de yerba buena. 3 j

Ogimiel escilítico. . . . . 3 jv

M. S. A.

Se da al enfermo una cucharada cada hora.

## POCION DEL DR. AUDRY.

Mercurio. . . . . 8 vj

Agua de rosas. . . . . } aa 3 j

Xarabe de diacodio. . . . . }

Agua de azahar. . . . . 3 ij

Extínguese el mercurio en el xarabe, mézclese despues con las aguas.

Se da una cucharada, mañana y tarde en la cardialgia, gastrodinia y vómitos espasmódicos.

### POCION BALSÁMICA DE CHOPPART.

Agua destilada de yerba buena.	} aa 3 ij
Alcool. . . . .	
Dálcamo de copaiva. . . . .	
Xarabe de culantrillo. . . . .	
Agua de azahar. . . . .	3 j
Espíritu de nitro dulcificado. . . . .	3 j
Mézelese.	

Se toman dos cucharadas de esta pocion por la mañana, una á medio dia y otra por la tarde: continúese este remedio por espacio de doce dias.

Este remedio conviene en la blenorragia, leucorrea y gonorrea sifilítica; aunque sea en el estado de irritacion. El enfermo debe agitar la botella cada vez que quiere tomarle.

### POCION DE IPECACUANA DE HALLER.

Ipecacuana en polvo. . . . .	3 j 6
Corteza de naranja. . . . .	3 ij
Cremor tartaro. . . . .	℥ xxxvj

Hágase hervir en cuatro onzas de agua de fuente, cuélese y añádese á la coladera media onza de opíamel escalfico.

Se da esta pocion á cucharadas en el aparato gástrico, ictericia, calenturas intermitentes, asina, tos estomacal, hidropesía.

## POCION DIURÉTICA DE BUCHAN.

Cocimiento de cebada. . . . .	media pinta
Xarabe de malvavisco. . . . .	$\frac{3}{4}$ xj
Aceite de almendras dulces. . . . .	$\frac{3}{4}$ jv
Nitrato de potasa. . . . .	$\frac{3}{4}$ jv
Mézclese.	

Se da una taza de cuatro en cuatro horas en la disuria ó estranguria.

## POCION DE M. JEANROY

CONTRA LA TOS CONVULSIVA.

Raiz de ipecacuana. . . . .	$\frac{3}{4}$ j
Foliculos de sen. . . . .	$\frac{3}{4}$ ij

Infúndase en una pocion de agua hirviente. Cuélese y añádase

Ozimiel escilítico. . . . .	} $\overline{\text{aa}}$ $\frac{3}{4}$ j
Xarabe de hisopo. . . . .	

Se da esta pocion á los niños, en dosis de seis cucharadas de las de café en el curso de la mañana.

## POCION ANTI-ESCORBÚTICA

DEL DR. FRANCH.

Cocimiento de quina. . . . .	$\frac{3}{4}$ v
Extracto de quina. . . . .	$\frac{3}{4}$ vj
Agua de canela espiritosa. . . . .	$\frac{3}{4}$ ij
Xarabe de adormideras blancas. . . . .	$\frac{3}{4}$ j

Se toma á cucharadas de media en media hora.

No se da esta pocion sino cuando el escorbuto está á un grado muy elevado.

### POCION LAXANTE DE VIENA.

Hojas de sen. . . . .	3 vj
Pasas de Corinto. . . . .	} āā 3 ij
Polipodio. . . . .	
Culantro (simiente de) . . . . .	3 β
Cremor tártaro. . . . .	3 j
Maná en lágrimas. . . . .	3 ij
Agua. . . . .	3 x reducidas á 3 vj

Esta pocion purga muy bien.

### POCION DEL DR. MONGENOT

#### CONTRA LA AFONIA.

Té hyswen. . . . .	} āā 3 ij
Yedra terrestre. . . . .	
Flores de gordolobo. . . . .	3 j
Lirios de Florencia. . . . .	3 ij

Echése sobre esto seis onzas de agua hirviente. Déjese en infusion hasta quedar frío.  
Cuélese y añádase

Rom. . . . .	} āā 3 j
Xarabe de erísimo. . . . .	
Xarabe tolutano. . . . .	3 jv
Tintura de canela. . . . .	3 j

Se taman dos cucharadas de esta pocion, cada dos horas, en el catarro bronquial, asma, afonia &c.



POCION CATÁRTICA DEL DR. MENDE.

Sulfato de sosa. . . . .	}	āā 3 jv
Maná en lágrimas. . . . .		
Tartrato de potasa antimoniado. . . . .		8 ij
Disuélvese en agua destilada. . . . .		3 jv
Añádase despues		
Ogimiel escilítico. . . . .		3 j

Se da una cucharada cada dos horas.

POCION EMENAGOGA DE DESBOIS.

Agua destilada de artemisia. . . . .	3 v
— de azahar. . . . .	3 jv
Aceite esencial de ruda. . . . .	} gotas vj
— de sabina. . . . .	
Xarabe de azahar. . . . .	3 j

Se toma á cucharaditas.

POCION DE QUARIN

CONTRA LA TOS SOFOCANTE.

Ogimiel excilítico. . . . .	}	āā 3 x
Aceite de almendras dulces. . . . .		
Xarabe de malvavisco. . . . .		
Goma amoniaco. . . . .		3 j

Yema de huevo q. s.

Despues de haber bien molido todas estas sustancias juntamente, se les añade

Agua de hisopo. . . . . 3 vj

La dosis es de una onza cada tres ó cuatro horas.

## POCION DE HUFELAND

CONTRA LAS IDROPESIAS ESPASMÓDICAS.

Se hacen hervir cuatro dracmas de bulbos de cebolla albarrana con diez onzas de agua de fuente, que se reducirán por la ebullicion. Por último se añade

Polvos de raiz de valeriana. . .	3 ij
Se cuele el cocimiento y se le echa	
Goma resina de guayaco en	
polvo. . . . .	3 ij
Mucílago de goma arábica. . .	3 iij
Tintura acre de antimonio. . .	3 ij
Láudano líquido de Sidenham.	gotasxx
Espíritu de nitro dulcificado. .	5 ij
—de corteza de naranjo. . .	3 j

Se da una cucharada de dos en dos horas.

## POCION DEL DR. ANDRY

CONTRA LOS ENVENENAMIENTOS

*por los ácidos minerales.*

Agua comun. . . . .	3 jv
Xarabe de malvavisco. . . . .	3 j
Magnesia. . . . .	3 j
Xabon medicinal. . . . .	3 iij

Se dan tres cucharadas de esta pacion al enfermo cada medio cuarto de hora. Cuando han parado los vomitos, se da un loc hecho con aceite de almendras dulces, xarabe de malvavisco, goma arábica, magnesia y agua destilada.

## POCION CONTRA LA TOS CONVULSIVA

POR EL DR. ROBERT TOMAS DE SALISBURY.

Acetato de plomo cristalizado. 2 ȳ á 5

Agua de rosas. . . . . 3 ij

Xarabe de violetas. . . . . 3 ij

M. S. A.

Se da una cucharadita de cuatro en cuatro horas.

## POCION CONTRA EL TENIA.

Aceite volatil de trementina. . 3 iiij

Miel. . . . . 3 vj

Agua destilada de yerba buena. 3 iiij

Mézclese.

Se tomará la tercera parte de esta pocion en la mañana, y las otras dos terceras partes á cierta distancia de tiempo.

## POCION PURGANTE Y VERMIFUGA

DEL DR. MACARTAN.

Agua de yerba buena piperita. 3 iiij

Aceite de ricino. . . . . 3 ij

Xarabe de culantrillo. . . . . 3 jv

Carbonato de potasa. . . . . 3 j

Se tritura al principio en un mortero de vidrio el carbonato de potasa y el aceite de ricino; despues se añade el xarabe: y cuando la mezcla está bien hecha, se dilata con el agua de yerba buena.

Se da esta pocion en dos tomas, median-do una hora y media entre una y otra.

## POCION ANTI-TETÁNICA

DEL DR. FOURNIER.

Puro almizcle. . . . .	3 ij
Alcanfor. . . . .	3 ij
Espíritu de sal amoniacal lacteo.	3 ij
Infusion muy fuerte de flor de arnica. . . . .	3 jv

Hágase una pocion que se administrará á cucharadas de hora en hora.

Se puede añadir dos, tres y hasta cuatro escrúpulos de nitro segun el estado del sistema urinario. Esta pocion se da en el tétanos traumático.

## POCION ANTI-NEFRÍTICA

DEL DR. WILLIAMS NORFORD.

Cocimiento de cebada perlada.	3 ij
Goma arábiga. . . . .	3 iij
Agua de bayas de enebro com- puesta (1). . . . .	3 ij
Xarabe de altea. . . . .	3 jß

Se da la mitad de la dosis al día en el cólico nefrítico.

## POCION CAPIVI DADA POR WILLIS.

Bálsamo de copaiva. . . . .	3 iij
Aceite de enebro. . . . .	gotas xxx
Agua comun. . . . .	3 vj
Alcool. . . . .	} aa 3 j
Xarabe de malvavisco. . .	
Mucílago de goma arábiga q. s.	

(1) Véase la farmacopea de Londres.

La dosis es dos cucharadas dos veces al día.  
(Esta mixtura se administra como diurética en los casos de nefritis crónica, y como á deterensiva contra las úlceras de la uretra. P.)

POCION DE JUSSIEU

CONTRA EL ESPUTO DE SANGRE.

Agua de llanten. . . . .	} aa 3 ij
— de buglosa. . . . .	
Xarabe de suelda consuela. . .	3 j
Esencia de rabel. . . . .	gotas n.º 3
Agua de azahar. . . . .	3 fl

Mézclese.

Hágase una pocion para dos tomas.

POCION DE SPIELMAN

CONTRA LOS RETORTIJONES DE LOS NIÑOS.

Agua de yerba buena rizada destilada . . . . .	} aa 3 ij
Agua de manzanilla destilada. . . . .	
Xarabe de flores de adormidera. . . . .	} aa 3 jv
Xarabe de manzanilla. . .	

Mézclese.

Se da esta pocion á cucharadas de cuatro en cuatro horas.

POCION PURGANTE DEL DR. ANDRY.

Agua de azahar. . . . .	} aa 3 j
Xarabe de flor de persicó. . . . .	
Espíritu de romero. . . . .	3 j
Diagridio. . . . .	℥ vij

Este remedio conviene á los sugetos á quienes repugnan la medecinas, sobre todo las ordinarias compuestas de maná, sen y sales.

### POCION ANTI-EMÉTICA DE RIVERIO.

Carbonato de potasa. . . . .  $\bar{g}$  xxiv

Disuélvase en cuatro dracmas de agua de fuente. Al momento de darla al enfermo se añaden cuatro dracmas de zumo de limon y una porcion de azucar blanco. Algunos prefieren el xarabe tartaroso.

Esta pocion calma los accidentes ocasionados por la demasiada violencia de los eméticos (1).

(1) M. Chaussier aconseja preparar la pocion emética del modo siguiente.

Acido tartárico en polvo. . . . 3 j

Carbonato de potasa cristalizado  
y pulverizado. . . . . 3 ij

Azucar blanco en polvo. . . . . 3 j

Mézclese exactamente para una dosis que se deslie en un vaso de tisana de agua destilada apropiada, y se hace tomar al instante.

O bien

Acido cítrico. . . . . 3 j

Carbonato de sosa pulverizado. 3 ij

Azucar blanco. . . . . 3 j

Igualmente se puede emplear el acido cálcico concreto, y mezclarle con diferentes carbonatos alcalinos y terrosos, segun el objeto que se propone el médico.



## POLVOS ANTI-ARTRÍTICOS DEL DR. MARC.

Rhododendrum chrisantum (1).  $\tilde{g} \times$

Polvos de regaliza. . . . . 3 ij

Mézclese y divídese en seis paquetes.

Estos polvos se dan en dosis de un paquete por la mañana, y otro por la tarde. Cada día se aumenta la dosis de un paquete hasta promover un sudor abundante ó aumentar á la excrecion de la orina. A veces es preciso administrar hasta treinta granos por día. Es de notar que el sudor de muchos individuos que usan este remedio, contrae un olor aromático que se parece á la pimienta.

## POLVOS ANTI-SÓRICOS.

Se hace derretir azufre en canuto en un crisol. Cuando esté liquido se le añade una décima parte de cal viva pulverizada; se menea sobre una plancha de fundicion. Cuando está frio y endurecido, se pulveriza y se pasa por un tamiz de seda.

Se forma en esta operacion sulfureto de cal y óxido de azufre (si asi se puede llamar

---

(1) *Oleandro crisanto*. Planta de la decandria monoginia. Se cria en Siberia. Los Rusos la usan para la curacion de los herpes, sarna, cancer, enfermedades venéreas y reumáticas: su uso no está aun adoptado en Francia.

el azufre rojo dispuesto á pasar al estado de ácido sulfuroso).

Se usan estos polvos del modo siguiente.

El sugeto que tiene sarna toma un buen pellizcado de ellos (como un polvo de tabaco), el que pone en el cóncavo de la mano izquierda, y con dos ó tres gotas de aceite comun, forman una especie de pomada, entonces con la palma de la otra mano, con una fricción activa, se hace penetrar la mezcla dentro de la piel. Se llevan guantes por una hora, y pasada ésta se pueden lavar las manos.

La simple aplicacion de los polvos á las manos, continuada mañana y tarde por espacio de diez ó doce dias, basta para curar la sarna cuando no está complicada.

Esta preparacion, que no ensucia los lienzos, puede aromatizarse á gusto de los enfermos. Se añade ademas el uso de las bebidas apropiadas.

## POLVOS ARSENICALES DE JUSTAMOND.

Sulfato de antimonio (I). . . . 3 j

Oxido blanco de arsénico. . . . 3 jv

Mézelese y háganse derretir en un crisol; cuando la masa está fria se pulveriza y se le mezcla

Extracto seco de opio. . . . . 3 ij ß

(I) Es de presumir que sea el sulfureto de antimonio y no el sulfato, el que aqui se quiere pedir. N. T.



Se polvorean con esta composicion las ex-  
crescencias, las úlceras fongosas y rebeldes.

## POLVOS ANTI-CARCINOMATOSOS

DE F. COSMA.

Cinabrio. . . . .	3 ij
Cenizas de suelas viejas. . . . .	8 viij
Sangre de drago. . . . .	8 xij
Oxido blanco de arsénico. . . . .	3 ij

Se mezcla y se hacen unos polvos muy  
finos. Se empapan estos polvos con un poco  
de agua, y con un pincel se estiende sobre  
la úlcera cancerosa que se cubre con un  
lienzo.

Al cabo de tres ó cuatro dias cae la es-  
cara (1).

## POLVOS ARSENICALES

DE PLUNCQUET.

Ranúnculo flámula. . . . .	3 j
Cótula fétida. . . . .	3 B
Flores de azufre. . . . .	3 j
Oxido blanco de arsénico. . . . .	3 ij

Háganse polvos muy finos.

Se mezcla una parte con un poco de cla-  
ra de huevo, y se cubren con esta mezcla  
las úlceras ó carcinomas. Al cabo de cua-  
renta y ocho horas cae la escara (2).

---

(1) Véase la nota puesta debajo de la fór-  
mula de los polvos de Reusselot.

(2) Véase la nota precedente.

## POLVOS ANTI-SÉPTICOS

DE SWEDIAUR.

Polvos de la raíz de	} partes iguales.
arnica montana. . .	
— de quina. . . . .	
— de alcanfor. . . .	

Mézclese.

Se esparcen estos polvos sobre las úlceras rebeldes, ó que estan afectadas de gangrena.

## POLVOS DE PRÍNCIPE.

Estos polvos empleados en Inglaterra en las enfermedades sífilíticas y escrofulosas, no son otra cosa que el mercurio precipitado *per se*, ú en otros términos el óxido rojo de mercurio perfectamente lavado y despojado de todo lo que podría contener de salino y soluble, ya fuese en el agua ó en el alcohol.

Se usa en particular exteriormente: sirve para curar las úlceras sífilíticas, callosas ó fungosas, y la oftalmia crónica.

## POLVOS FEBRIFUCOS Y PURGANTES

DE HELVETIUS.

Quina. . . . .	3 vj
Sulfato de potasa. . . . .	3 j
Nitrato de potasa. . . . .	3 j
Azafran. . . . .	} aa 8 xij
Gota gamba. . . . .	
Diagridio. . . . .	3 jv
Tárrito acídulo de potasa. . .	3 xvj
Tárrito de potasa y de sosa. . .	3 iij
Emético (tártaro). . . . .	3 ij
Sulfureto rojo de mercurio. . .	8 vj
Jalapa. . . . .	3 ij
Zumo de ajo. . . . .	3 j

Estos polvos se dan en dosis de diez y ocho granos á media dracma en las calenturas intermitentes. Se emplean tambien como á vermífugos.

PÓLVOS FEBRIFUGOS DE BOULLEMER.

Ojos de cangrejo. . . . .	3 j
Muriato de amoniaco. . . . .	3 ß
Mirra. . . . .	3 j

Se pulverizan y se mezclan estas sustancias; se dividen en tres partes iguales que se toman en tres dias, la primera dosis dos horas antes del paroxismo, la segunda al dia siguiente á la misma hora, y al otro dia la tercera.

PÓLVOS DE GIMS Ó JAMES (1).

Sulfato de antimonio. . . . .	3 ij
Fosfato de cal calcinado. . . . .	3 j ß
Nitrato de potasa. . . . .	3 jv

(1) Esta fórmula está hecha segun la analisis publicada por M. Pearson, y segun la de M. Pullis (Anales de química, tom. 56 pag. 77).

Mas un diario ingles de medicina ha publicado últimamente una fórmula de los polvos de James que es muy diferente de la que publicamos. Vedla aqui.

Antimonio diaforético bien lavado (ú óxido de antimonio blanco. . . . . de 12 á 24

Muriato de mercurio dulce sublimado seis veces. . . . . de 1

Mézclese exactamente.

Se dan estos polvos en las calenturas adinámicas en dosis de una dracma á dracma y media.

### POLVOS DE GRIMALDI.

Escamonea. . . . .	3 ij 3 j
Oxido de hierro amarillo. . .	3 jv 3 jv
Magnesia blanca. . . . .	} aa 3 jv
Cremor de tártaro. . . . .	
Humo de pez olin. . . . .	3 vj
Perlas finas preparadas. . .	} aa 3 viij
Bezoar oriental. . . . .	
Aceite esencial de enebro. .	} aa 3 iij
Bálsamo de copaiva . . . . .	

### POLVOS CORROBORANTES

DE WERLHOFF.

Quina. . . . .	3 ℥
Canela. . . . .	℥ vi
Mézclese. . . . .	( 2 )

Werlhoff los mandaba en la convalecencia de las calenturas intermitentes.

### POLVOS CÁUSTICOS DE KRUGER.

Muriato de mercurio sobre oxigenado. . . . .	} aa x ℥
Sulfato de cobre. . . . .	
Nitrato de plata. . . . .	vj ℥

Pulverízese y mézclese.

Se pone un poco de estos polvos sobre las verrugas ó excrecencias sifilíticas que se quieren destruir, y se humedecen con un pincel.

### POLVOS DEL CONDE WARRVICK.

Diagridio sulfurado. . . . . 3 ij  
 Antimonio diaforético. . . . . 3 j  
 Tartrito acídulo de potasa. . . 3 jv

Mézclese. . . . .

Se purga con estos polvos en dosis de doce á veinte y cuatro granos.

### POLVOS ANTI-CATARRALES

DE LA FARMACOEPA DE VIENA.

Goma arábiga. . . . . } 3a 3 j  
 Almidon. . . . . }  
 Regaliza. . . . . 3 iij 3 j  
 Lirios de Florencia. . . . . 3 j 3 j  
 Flores de azufre. . . . . 3 j  
 Azafran oriental. . . . . 3 j  
 Azucar. . . . . 3 iij

Estos polvos se dan á la dosis de una ó dos dracmas.

### POLVOS VOMITIVOS DE HELVETIUS.

Tártaro emético. . . . . 3 j  
 Ipecacuana. . . . . 3 jv  
 Cremor de tártaro. . . . . 3 viij

Se trituran con cuidado estas sustancias mezcladas; y se pasa la mezcla por un tamiz de seda.

Se da en dosis de diez y ocho granos para excitar el vómito sin sacudimientos violentos. A veces obra como purgante.

### POLVOS ESTOMACALES DE BIRCKMANN.

Raíces de aro. . . . . 3 ij

— de cálamo aromático. } aa 3 j

— de saxifraga. . . . . }

Ojos de cangrejo. . . . . 3 jv

Canela fina. . . . . 3 iij

Sulfato de potasa. . . . . 3 ij

Muriato de amoniaco. . . . . 3 j

Se da de dos á cuatro granos en la debilidad de estómago producida por saburras mucosas.

### POLVOS PECTORALES DE WEDELIUS.

Raiz de regaliza. . . . . } aa 3 ij

— de lirios de Florencia. . . . . }

Flores de azufre. . . . . 3 jv

Acido benzoico. . . . . 3 j

Azucar blanco. . . . . 3 ij

Aceite volatil de anis. . . . . } aa gotas x

— de hinojo. . . . . }

Mézclense y háganse polvos.

En los catarros pulmonales crónicos se dan uno ó dos escrúpulos.

### POLVO DIAROMATON (1) INGLES.

Canela. . . . . 3 ij

Simiente de cardamomo. . . . . }

Raiz de gengibre. . . . . } aa 3 j

Nuez moscada. . . . . }

Mézelese y háganse polvos.

---

(1) Odorífero, fragante.

Se dan de cinco á veinte granos en la dispepsia sin calor, flatuosidades, eructaciones y astenia general.

### POLVOS ANTI-CAQUÉCTICOS DE HARTMANN.

Azafran de Marte (carbonato de hierro). . . . .	3 jv
Canela. . . . .	3 jß
Azucar. . . . .	3 ij

Se dan estos polvos desde media dracma hasta dos dracmas en la caquexia.

(Convienen particularmente en la caquexia serosa. P.)

### POLVOS ANODINOS DE HELVETIUS.

Opio. . . . .	3 jv
Mirra. . . . .	1ß jß
Cascarilla (chacarila). . . . .	1ß j
Bolo arménico. . . . .	3 jv
Casia cariofilada. . . . .	1ß j
Coral rojo preparado. . . . .	3 jv

Se prescribe en las disenterias, en los cólicos de estómagos y en la pleuresia. La dosis es de diez y ocho granos hasta dos escrúpulos.

(Con respecto á la disenteria no se deben emplear estos polvos ni en su principio, ni tampoco en el estado de esta enfermedad; y sí solamente hácia la terminacion. P.)

## POLVOS DE HALY.

Simiente de membrillo. . .	} 3 j
— de adormideras blancas. . .	
Almidon. . . . .	
Almendras dulces. . . . .	3 ij
Azucar piedra. . . . .	3 vj
Goma arábica. . . . .	} 3 j
— tragacanto. . . . .	
Regaliza de España. . . . .	3 B

Háganse polvos bien mezclados.

Se da en los esputos de sangre, en las diarreas y debilidad de estómago. La dosis es de media dracma á una dracma y media por día.

Estos polvos no pueden guardarse mucho tiempo. Es menester no preparar mas cantidad de la que se puede consumir en pocos días.

## POLVOS SEDATIVOS DE WETZLER.

Polvos de raíz de belladona

(atrapa belladona) . . . . . 3 j

Azucar ó polvos de regaliza. . . 3 j 3 j

Mézclese exactamente, y divídase en noventa y seis tomas.

Cada toma contiene un cuarto de grano de belladona.

MM. Schaeffer, Hufeland y Werzler consideran este remedio como específico en la tos convulsiva de los niños.



M. Marc que la administró con suceso en París, cita treinta y cinco curaciones obtenidas del octavo al décimo quinto día de esta enfermedad.

Se administran estos polvos en dosis de una toma, mañana y tarde, á los niños que no llegan á un año; de tres tomas á los que no llegan á dos; de cuatro por los de tres á cuatro años; y de seis por los de cuatro á seis años. Se aumenta gradualmente de modo que la dosis por los mas adelantados sea de doce tomas en veinte y cuatro horas; esto es, un grano y medio de belladona.

Este remedio produce buenos efectos en la tos nerviosa de los adultos.

## POLVOS DE ANTIMONIO MARCIAL

DIAPHORETICO DE KEUP.

Limaduras de hierro. . . . .	} aa 3 vijj
Sulfato de antimonio nativo(1). . . . .	

Macháquese y mézclese; póngase en un crisol hecho ascua, menéuse con una espátula de hierro, hasta que parezcan reducidos á escorias, retírense, y cuando la masa esté fria, macháquense de nuevo con tres veces su peso de nitro seco, y échense los polvos por

---

(1) Es absolutamente equivocado el nombre de sulfato por el de sulfureto que es lo que debe emplearse. N. T.

cucharadas en un crisol candente, cuando se ha terminado la deflagracion y la calcinacion, échese la materia en suficiente cantidad de agua para disolver las sales que ella contiene. Los óxidos se precipitan en forma de polvos amarillos. Se añade una cantidad mayor de agua para volverlos mas ligeros, y separar los que son mas pesados de los mas sùtiles. Estos últimos se recogen con el filtro, y se secan con cuidado (1).

Se dan en dosis de cinco á seis granos en la caquexia, ictericia y en la debilidad de intestinos.

### POLVOS INCISIVOS DEL DR. MONGENOT.

Tártaro emético. . . . .	8 j
Kermes mineral. . . . .	8 ij
Lirios de Florencia. . . . .	3 j
Azucar. . . . .	} añ 3 j
Goma arábiga. . . . .	

Divídase en veinte y cuatro tomas. Se da una de media en media hora.

(En los efectos catarrales con sofocacion, por defecto de esputo ó por atonia. P.)

(1) Estos polvos se conocen con el nombre de *antimonio diaforético marcial* descritos en nuestra farmacopea matritense.

## POLVOS TEMPERANTES LAXANTES

DEL DR. BOUILLON LAGRANGE.

Nitro pulverizado fino. . . . . ℥ iij  
 Acido borácico. . . . . ℥ j  
 Tartrato de potasa. . . . . ℥ jv ℞

Mézclese exactamente, y pásense estas tres sustancias por un tamiz de seda muy fina.

Por pinta de agua se toma

Sulfato de sosa esflorecido. . . . 3 ij ℞  
 Polvos temperantes de arriba. . 3 ℞

Se hacen desleir, y se filtra.

NOTA. Si el farmacéutico quiere preparar esta agua mineral, puede servirse del sulfato de sosa ordinario.

Entonces por pinta de agua se toma

Sulfato de sosa. . . . . 3 vj  
 Polvos temperantes laxantes. . 3 ℞

Estos polvos se usan con suceso en las enfermedades linfáticas cutáneas y otras, en que la intencion es de dividir los humores sin irritar demasiado el tubo intestinal.

Un paquete de estos polvos, disuelto en una pinta de agua y tomado en cuatro vasos á media hora de distancia, purga como corresponde.

En dosis de un vaso cada mañana, se emplea con suceso en algunos efectos catarrales, y en ciertas retenciones de orina.

POLVOS DE TUNQUIN *Reuss.*

Almizcle. . . . .	℥ xvj
Raiz de valeriana en polvos. .	℥ j
Alcanfor. . . . .	℥ vj

Háganse polvos.

Se dan en dosis de doce granos en las enfermedades convulsivas, histéricas, epilépticas, espasmódicas, mania é hidrofobia.

## POLVOS DE ROSENSTEIN

PARA LAS AMAS DE LECHE.

Magnesia inglesa. . . . .	℥ j
Corteza de naranja en polvo. }	āā 3 j
Simiente de hinojo en polvo. }	
Azucar blanco. . . . .	℥ ij

Mézclese con cuidado, y divídase en tomas de una dracma.

Se dan dos ó tres por día.

Estos polvos aumentan la leche de las amas de criar, impiden el que se vuelva agria, y facilita la digestion.

## POLVOS FEBRIFUGOS DE JUNCKER.

Azufre dorado de antimonio (oxido hidro sulfurado na- ranjado) . . . . .	} āā 3 ℞
Magnesia. . . . .	
Sulfato de potasa. . . . .	

Divídanse estos polvos en cuatro partes que se tomarán á distancias iguales en la apirexia.

Estos polvos recomendados por Unzer (de Arzt. XII. pag. 106), como sucedaneos de la quina, no producen ordinariamente ningun otro efecto sensible, que el de disminuir, y por fin parar las accesiones de la calentura; y si este efecto no tiene lugar al cabo de algunos dias, es que aun es preciso volver á los evacuantes, como en los casos en que uno se precipita en administrar la quina. Despues se vuelve á emprender el uso de estos polvos antifebriles (1).

### POLVOS DE CEBOLLA ALBARRANA COMPUESTOS DE STALK.

Cachos de cebolla albarrana recientes. . . . . 3vj  
Raiz de vencetosigo (asclepias vincetosicum, . . . . . 3j

Macháquese la cebolla albarrana en un almirez de marmol. Cuando está reducida á pulpa, se le añaden los polvos de vencetosigo. Se seca todo á una estufa, se pulveriza de nuevo, y se pasa por un tamiz.

(Estos polvos se dan en dosis de tres hasta cinco granos en el asma, hidropesia y catarro pulmonar crónico. P.)

---

(1) Ensayo sobre los medios de disminuir el consumo de la quina, por M. Lauth, profesor de la facultad de Estrasburgo.

## POLVOS DEL CONDE DE PALMA.

Polvos de Sentinelli.

Polvos de Valentini.

Polvos de Zwinger.

Panacea inglesa.

Se ha aconsejado, bajo de estos diferentes nombres, el uso de carbonato de magnesia.

## POLVOS VERMIFUGOS DE BRUGNATELLI.

Estaño de malacaen limaduras. . . . . 3 iij

Azufre sublimado. . . . . 3 j

Se calienta esta mezcla en un crisol sobre carbones ardientes, hasta que aparezca una flama muy viva. Retírese el crisol del fuego, se cubre, déjese enfriar, pulverízese, y se pasa por un tamiz el sulfureto. Consérvese en un vaso de vidrio.

Se dan estos polvos, ya sean solos ó bien mezclados con azúcar ó magnesia, se prescriben en dosis de media á una dracma, cuatro veces al día, á los sugetos que tienen gusanos ó el tenia.

## POLVOS DE KINO COMPUESTOS.

*Farmacopea de Londres.*

Quino. . . . . 3 j 3 vij

Canela. . . . . 3 jv

Opio. . . . . 3 j

Cada sustancia se pulveriza separadamente, y se mezclan.

Estos polvos son estípticos y astringentes. Por cada dracma contienen cuatro granos de opio. Se prescriben en dosis de un escrúpulo en las hemorragias internas.

## POLVOS DE ODIER.

Oxido de vismuto. . . . .	3 j
Magnesia calcinada. . . . .	} aa 3 x
Azucar. . . . .	

Háganse paquetes de veinte granos cada uno.

Se da uno cada tres horas en la gastrodinia y dispepsia. (*Véase Bibh medicale, mars. 1816 pag. 366*).

## POLVOS DE CRETA COMPUESTOS.

*Farmacopea de Londres.*

Creta preparada. . . . .	3 viij
Canela. . . . .	3 jv
Raiz de tormentila. . . . .	} aa 3 iij
Goma de Acacia. . . . .	
Pimienta larga. . . . .	3 jv

Cada sustancia se pulveriza separadamente, y se mezcla exactamente.

Se prescriben estos polvos en dosis de seis á doce granos, tres veces al dia, en los infartos mucosos del estómago, y en la diarrea.

## POLVOS DE CEBOLLA ALBARRANA

NITRADA DE VANHELMONT.

Cachos de cebolla albarrana secos. 3 j  
 Raices de vecentósigo. . . . . 3 vß  
 Nitrato de potasa purificado. . . . 3 vjßj

Se preparan unos polvos homogéneos muy finos. Como la cebolla albarrana, aunque sea bien seca, atrae facilmente la humedad de la atmósfera, es menester tener cuidado de hacer secar el nitrato de potasa para quitarle una parte de agua de cristalización.

Se prescriben estos polvos en dosis de doce granos, dos veces al dia, en la ascitis.

POLVOS ESTÍPTICOS DE COLBATCH,  
 ó ESPECIFICO ASTRINGENTE DE MAETZIUS.

Disolucion saturada de muriato de  
 hierro. . . . . 3 jv

Se hace evaporar la mitad, y se le añade un peso igual de acetato de plomo seco. Continúese la evaporacion á un calor suave hasta sequedad. Se pulveriza y se pasa por un tamiz.

Es menester privar estos polvos del contacto del ayre, porque atraen su humedad.

Se usa interior y exteriormente en toda especie de hemorragias. Interiormente se da en dosis de cuatro á doce granos.

(La administracion de este remedio exige mucho cuidado y precaucion. El plomo que contiene puede volverle muy perjudicial. P.)



## POLVOS DE PLUMMER.

Muriato de mercurio dulce. . . . .	} partes iguales.
Azufre dorado de anti-monio. . . . .	

Se toma á la dosis de cinco á siete granos mañana y tarde, bebiendo despues uno ó dos vasos de cocimiento de zarzaparrilla.

Conviene en las enfermedades sifilíticas y escrofulosas.

## POLVOS DE MERCURIO AZUCARADO

DEL DR. LAGNEAU.

Mercurio vivo. . . . .	3 ij
Azucar blanco. . . . .	3 jv

Tritúrese hasta la extincion completa del mercurio, divídase en treinta partes iguales.

Se emplea en la sífilis de los niños ó de los sugetos delicados, á quienes se da con una taza de chocolate ó de café.

La dosis es de diez granos.

## POLVOS VERMIFUGOS PURGANTES

DE BALL.

Ruibarbo. . . . .	} 3 j
Escamonea. . . . .	
Muriato de mercurio dulce. . . . .	
Azucar muy refinado. . . . .	3 iij

La dosis por un niño es de diez á doce

granos, una ó dos veces por semana; para los adultos es de una dracma.

### POLVOS VERMIFUGOS DE ESTAÑO.

Estaño reducido á polvo muy

fino. . . . . ʒ ij

Etíope mineral. . . . . ʒ ij

Mézclese y divídase en seis tomas iguales. Se da una de estas dosis con un poco de xarabe, miel ó triaca, dos veces al día.

### POLVOS TÓNICOS INCISIVOS

DEL DR. LASSONE.

Kermes mineral. . . . . ʒ ij

Ipecacuana. . . . . ʒ jv

Carbonato de sosa. . . . . } āā ʒ xij

Etíope marcial. . . . . }

Catecú. . . . . }

Canela. . . . . } āā ʒ i

Lirios. . . . . }

Polvos de regaliza. . . . . ʒ j

En los aparatos gástricos se dan estos polvos del modo siguiente. Despues de haber dividido la masa en veinte y cuatro ó treinta dosis, se toman tres dosis con un sorbo de agua y un poco de hostia mojada, mediando un cuarto de hora entre dosis y dosis. El tiempo de tomarlas es una ó dos horas antes de la comida.

## POLVOS DE DOWER.

Sulfato de potasa. . . . .	} aa 3 j
Nitrato de potasa. . . . .	
Ipecacuana. . . . .	} aa 3 ij
Opio seco. . . . .	

Se prescribe en los romadizos y en los dolores reumáticos en dosis de medio á un escrúpulo.

(Estos polvos son diuréticos, diaforéticos, calmantes y ligeramente purgantes. P.)

## POLVOS ANTI-ARTRÍTICOS DE PERARD.

Simiente de cardo santo. . . . .	} aa 3 j 3 ij
— de alazor. . . . .	
Cremor de tártaro. . . . .	} aa 3 jv
Sen mondado. . . . .	
Canela fina. . . . .	5 j
Escamonea. . . . .	} aa 5 ij
Raiz de zarzaparrilla. . . . .	
— de china. . . . .	
Leño de guavaco. . . . .	

Háganse polvos S. A.

La dosis es una dracma cada mes para prevenir los accesos de gota.

## POLVOS DE QUARIN

CONTRA LA TOS CONVULSIVA.

Flores de azufre. . . . .	5 j
Goma arábica. . . . .	} aa 3 β
— tragacanto. . . . .	
Extracto de regaliza. . . . .	} aa 5 ij
Azúcar. . . . .	
Kermes mineral. . . . .	g ij á jv

El enfermo toma media dracma cada cuatro horas.

**POLVOS DEL DR. MARC**  
**CONTRA LA TOS CONVULSIVA Y EL CATARRO**  
**NERVIOSO.**

Raiz de bella dona en polvos. . . . . ḡ iij  
 Polvos de regaliza. . . . . ʒj  
 Azucar. . . . . 3j

Para doce tomas.

**POLVO ECFRATICO DEL DR. SELLE.**

Magnesia inglesa. . . . .	}	āā 3 jv
Cremor de tartaro. . . . .		
Flores de azutre. . . . .		
Ruibarbo en polvo. . . . .		
Flores de manzanilla en polvo. . . . .		
Oleo saccaro de hinojo. . .		

Estos polvos producen muy buenos efectos en las obstrucciones y debilidad de las víceras del bajo vientre, particularmente cuando existe una plétora abdominal. Como favorecen el flujo hemorroidal, no se emplean sino en los casos en que podría ser útil dicho flujo.

La dosis es una cucharada de las de tomar té, que se da diferentes veces al día.

## POLVOS DE LA PRINCESA CARIGNAN.

Vizco cuercino. . . . .	} aa 3 ij ij
Raiz de fraxinella. . . . .	
Cuerno de ciervo preparado. . . . .	} aa 3 v
Raiz de paeonia. . . . .	
Carbonato de amoniaco. . . . .	} 3 ij B
Succino preparado. . . . .	

Estos polvos que se usan en la convulsion de los niños, se dan con leche, caldo ó agua de azahar.

La dosis es de diez y ocho granos por un niño de un año ó cerca de él, de treinta y seis granos á dos años, dos escrúpulos á tres, una dracma de cuatro años per arriba.

## POLVOS DE VERNIX.

Sulfato de zink. . . . .	} aa 3 j
— de cobre. . . . .	
Alumbre calcinado. . . . .	
Cerusa. . . . .	
Tierra sellada. . . . .	

Estos polvos se usan exteriormente para detener la sangre.

## POLVOS DE KNOX.

Muriato sobreoxigenado de cal. 3 partes.

Muriato de sosa pulverizada. . 8 partes.

Se conservan estos polvos en un frasco bien tapado; cuando se echa una una ó dos en un vaso grande de agua, abandonan bastante gas ácido muriatico oxigenado para

formar un anticontagioso muy útil, pero el desprendimiento será mucho mas considerable si se echan algunas gotas de ácido sulfúrico en el agua que tiene los polvos en disolución.

Los ingleses lo miran como un excelente preservativo del contagio sifilítico. Por esto las usan en lociones ántes y despnes del acto venereo.

### POLVOS DE ROUSELOT CONTRA EL CANCER.

Sulfureto de mercurio. . . . . 3 j  
Sangre de drago. . . . . 3 iv  
Oxido de arsénico. . . . . 3 ß

Se echan estos polvos sobre las úlceras cancerosas.

(Es preciso ser estremamente moderado en el uso de este remedio. El arsénico, aunque sea exteriormente, no se aplica impunemente sobre las partes donde existen vasos linfáticos absorventes, como son las atacadas de cancer. P.)

### POLVOS DEL DR. ROBERT THOMAS CONTRA LA GASTRODINIA.

Óxido de bismuto. . . . . de 3 á 10 ñ  
Goma tragacanto. . . . . 3 j

Mézclese.

Se repite esta dosis tres veces al día.

\*\*\*\*\*

**POMADA ANTI-OFTÁLMICA**  
**DE DESAULT.**

Precipitado rojo (óxido ro-	}	3 j
xo de mercurio). . . . .		
Óxido de plomo semivitreo. . . . .		
Tucia preparado. . . . .		
Alumbre calcinado. . . . .	}	3 j
Muriato sobre oxigenado de		
mercurio. . . . .		8 n.º 12

Se pulveriza todo sobre un pórfido, se incorpora con suficiente cantidad de unguento rosado ó de cerato no lavado. Se puede dar color á la pomada con

Cinabrio. . . . . 3 j

*Nota.* Para aplicar como es menester esta pomada en las enfermedades de los ojos y en los herpes, es preciso leer lo que dice Mr. Alibert sobre la teoria de las oftalmias. (*Vase su tratado de materia médica.*)

**POMADA DE LION PARA LOS OJOS.**

Unguento rosado. . . . . 3 j  
Óxido de mercurio rojo. . . . . 3 8

Se extiende ligeramente esta pomada sobre el borde de los párpados infartados, de los que fluye un humor mucoso que se pega durante el sueño.

## POMADA OFTÁLMICA DE JANIN.

Manteca de puerco. . . . .	3 jv
Tucia. . . . .	} 33 3 ij
Óleo arménico. . . . .	
Precipitado blanco. . . . .	3 j

Se lava muchas veces la manteca de puerco con agua de rosas; y en un almirez de vidrio se le mezclan exactamente las drogas bien pulverizadas.

## POMADA DE GRANDJEAN.

Unguento populeon. . . . .	3 j 6
Cera amarilla. . . . .	3 18
Ac. lte de olivas. . . . .	16 j
Castaridas. . . . .	3 xij

F. S. A. una pomada.

Esta pomada es epispástica. Se aplica detrás de las orejas para derivar la fluxion de los ojos.

## POMADA DEL DR. FABRE.

Manteca de puerco. . . . .	3 j
Muriato de amoníaco. . . . .	5 j
Tartaro emético. . . . .	5 6
Alunfor. . . . .	8 xxv
Almizele. . . . .	8 x

Tritúrese con cuidado.

Esta pomada se usa en los infartos indolentes del hígado, y otras obstrucciones análogas.



Se hacen fricciones con esta region del hígado. Se empieza de grano, y se aumenta gradual el grado de sensibilidad de la pi

POMADA OXIGENADA DE ALYON.

Manteca de puerco. . . . . 7j  
Acido nítrico. . . . . 3j B

Se hace derretir la grasa, se echa poco á poco el ácido agitando vivamente. La mezcla se pone al fuego hasta la evulcion; dejese enfriar.

Esta pomada es antiherpética.

POMADA MERCURIAL DE MANTECA  
. . . . . DE CACAO.

Mercurio purificado. . . . }  
Manteca de cacao muy re- } 3j  
ciente. . . . .  
Aceite de huevos muy re-  
ciente. . . . . gotas n.º xx

Esta pomada, cuya fórmula se debe á Mr. Planche, y cuya preparacion está cuidadosamente descrita en el diario de Farmacia (oct. 1815), pag. 453, es muy útil para fricciones, no se vuelve rancia, y tiene un olor muy agradable.

POMADA MERCURIAL DE CIRILLO.

Muriato sobre oxigenado de  
mercurio. . . . . 3j  
Manteca de puerco. . . . . 3j

Mézclese y tritúrese en un almirez de vidrio durante seis horas; á la última hora añádese

Muriato de amoniaco en polvo. . . ʒx

Se hacen fricciones con esta pomada á las plantas de los pies, en dosis de una dracma; pero es menester que el enfermo no esté muy debilitado antes de usar de este remedio.

### POMADA DE LA CONDESA Ó POMADA VIRGINAL.

Agallas. . . . .	} aa 3 ij
Piñas de cipres. . . . .	
Corteza de granada. . . . .	
Hojas de mirra (1) . . . . .	} aa 3 iij
Zumaque. . . . .	
Sulfato de zink. . . . .	3 jv

Pulverízense estas sustancias separadamente; mézclense y pásense por un tamiz muy fino; incorpórense en suficiente cantidad de unguento rosado.

Otros prescriben la conserva de rosas en lugar del unguento; mas entonces debe llamarse esta prescripcion *opiat* y no *pomada*.

Esta preparacion astringente se usa para constreñir los estínteres demasiado dilatados.

(1) Querrá decir murta ó mirto, que es el arrayan; así se infiere de la misma receta.  
N. T.

## POMADA Á LA SULTANA.

Cera blanca. . . . .	3 iij
Blanco de ballena. . . . .	3 i
Aceite de almendras dulces. . . . .	3 ij
Bálsamo de la meca. . . . .	gotas xij
Leche virginal con agua de rosas. . .	3 j

Se hace derretir la cera y el blanco de ballena. Se echa todo en un almirez de marmol, se añade el bálsamo y la leche virginal, y se bate hasta que la pomada sea muy blanca.

Ablanda la piel y destruye los barros.

## POMADA DE TURBITH DEL DR. ALIBERT.

Turbith mineral. . . . .	3 ij
Manteca de puerco. . . . .	15 ij

Se reduce en polvo muy fino el turbith mineral (sulfato de mercurio); se derrite la enjundia á un calor suave; se le incorporan los polvos, se menea con una mano de mortero hasta que la masa esté enteramente fria; se mete en un vaso de loza, y se conserva para el uso.

Esta pomada ha tenido buenos efectos en algunas especies de herpes (1).

---

(1) Véase la obra del Dr. Alibert sobre las enfermedades de la piel, observadas en el hospital de S. Luis, § Herpes.

## POMADA ANTI-SARNOSA

DEL DR. ALIBERT.

Subcarbonato de potasa. . . . . 3 j  
 Flores de azufre. . . . . 3 ij  
 Manteca de puerco. . . . . 3 jv

Tritúrese primero la potasa y el azufre; añádase despues la grasa, y mézclese exactamente.

## POMADA DEL DR. BOYER.

Zumo de siempreviva mayor. } 3 iiij  
 Manteca de puerco lavada. . } 3 jv  
 Aceite de almendras dulces. . . . 3 jv  
 F. S. A.

Esta pomada es dulcificante y refrigerante. Calma las irritaciones de la piel.

## POMADA DEL DR. AUTENRIETH,

CONTRA LA TOS CONVULSIVA.

Tartrito de potasa antimoniado. . . . . v partes.  
 Manteca de puerco. . . . . xvj partes.

Se toma el grueso de una avellana y con él se hace una friccion en el epigástrico. Sobre la parte friccionada sobrevienen pústulas semeiantes a los granos de las viruelas bobas; mas el Dr. Autenriet asegura que los romadizos mas rebeldes han cedido á este remedio.

## POMADA ANTI-SARNOSA

DEL DR. THOMAME.

Polvos de carbon recién preparados. ʒ ij  
 Manteca de vacas fresca. . . . } ʒ iij  
 Manteca de puerco. . . . . }

Se tritura hasta obtener una mezcla íntima. Despues de haber tomado el enfermo un baño tibio, el dia siguiente se fricciona con dos dracmas de esta pomada; y despues se lava con una disolucion de xabon tibio. El siguiente dia se repite la friccion, y al cabo de cinco ó seis dias debe quedar curada la sarna.

## POMADA DE TIERRY.

Unguento populeon. . . . . ʒ viij  
 — basilicon. . . . . ʒ iij  
 Cera amarilla. . . . . ʒ ij  
 Derrítase todo, mézclese y añádase  
 Cantáridas en polvo fino. . . . ʒ jv

Esta pomada es epispástica y sirve para reanimar los vegigatorios.



## PURGANTE DEL DR. WILSON.

Vidrio de antimonio pulverizado. . ʒ jv  
 Acido sulfúrico concentrado. . . . ʒ xij

Se pone la mezcla en digestion durante cuarenta y ocho horas. Destílese despues al

baño de arena, y se lavan los polvos que quedan en la retorta hasta que hayan perdido toda su acrimonia; se hacen secar, se mezclan con un peso igual de sulfato de sosa y el doble de sulfato de potasa. Se mete esta mezcla en un crisol. Se pone en fusión por un cuarto de hora, y después se pulveriza.

Esta preparacion se dá en las enfermedades sífilíticas, escrofulosas, herpéticas &c. en dosis de dos hasta diez granos.

Nota: Este proceder es defectuoso; con todo hemos creído de nuestro deber el producirle como le propone el autor.



## RATAFIA DEL COMENDADOR

DE CAUMARTIN CONTRA LAS ARENILLAS

Ó MAL DE PIEDRA.

Raiz de detiene buey ( <i>uñas gatas</i> ). . . . .	}	aa 3 ij
— de rosa caúina. . . . .		
— de malvavisco. . . . .		
— de sello de Salomon. . . . .		
— de cardo corredor. . . . .	}	3 j
— de consuelda mayor. . . . .		
Nuez moscada. . . . .		3 vj
Simiente de anís. . . . .		3 j
Bayas de enebro. . . . .		3 j
Aguardiente. . . . .		ib x 3 ij
Azúcar. . . . .		ib ij 3 v

Se ponen en maceración las raíces por espacio de quince días en el aguardiente; se

cuela con expresion, se disuelve el azucar en el licor, y se filtra.

La dosis es un vasito mañana y tarde. Se favorece la accion de este remedio con el uso de una infusion de *hinojo marino*, *crithmum*.

## RATAFIA DE LOS CARÍEES.

Resina de guayaco. . . . . 3 ij

Aguardiente de azucar rhom. . . . . iij pintas

Se tritura la resina, y se pone á digerir en el aguardiente por espacio de quince dias.

Este remedio se usa contra la gota en dosis de media onza por dia.

Azucarando y aromatizando este ratafia, se puede obtener un licor agradable.



## REMEDIO DE MADAMA NOUFFER

CONTRA EL TENIA Ó SOLITARIO.

El dia ántes por la tarde el enfermo toma una buena panetela. Por la mañana se engulle tres dracmas de raiz de helecho macho en polvos muy finos, y desleidos con seis onzas de tisana de helecho ó de flor de tila. Se pasa dos ó tres veces tisana por el vaso para que no queden en él. Dos horas despues se toma un bolo purgante compuesto de

Panacea mercurial. . . . . } ʒ x

Escamouca. . . . . } ʒ x

Gota gamba. . . . . ʒ vj

Confeccion de jacintos, q. s.

Se divide esta cantidad en dos ó tres tomas que se tragan á un cuarto de hora de distancia. Despues se beben una ó dos tazas de té.

Cuando el enfermo es un niño se proporcióna el bolo purgante á su edad.

### REMEDIÓ ANTI-SIFILÍTICO

Ó MERCURIO SOLUELE DE HANEMANN,  
*modificado por Moscati.*

Póngase en una redomita

Muriato de mercurio. . . . . 3 jv

Disolucion de sosa caustica. . . 3 jv

Se coloca la redomita sobre cenizas calientes, durante media hora; la sal de blanca y cristalina se vuelve negra, oxidada y como polvo.

Este mercurio oxidado *ad minimum*, se dá en dosis de dos, cuatro y seis granos, ya sea en polvos, ó en pilulras en las enfermedades venéreas. El Dr. Franch ha logrado buenos resultados en casos desesperados, asociándole á la quina ó al opio, segun las circunstancias.

### MERCURIO SOLUBLE

*segun el método del profesor Moretti.*

Se toman seis onzas de ácido sulfúrico concentrado y cinco onzas de mercurio purificado; se introducen estas dos sustancias en una retorta de vidrio que se coloca sobre un baño de arena; adaptándole un recipiente, y se



procede á la destilacion. Se continua el fuego aumentándole gradualmente hasta que no se desprendan mas vapores: es de advertir que al fin de la operacion, el fuego debe ser algo fuerte, para que todo el sulfato mercurial pase al *maximum* de oxidacion. Terminada esta primera operacion se dejan enfriar los vasos, y se saca la sal de la retorta, se mete esta sal en un almirez de vidrio ó de piedra dura, y se tritura con otras cinco onzas de mercurio metálico, hasta que sea completa la combinacion.

Se hace hervir la masa pardusca que resulta con suficiente cantidad de legía cáustica ó de potasa pura, disuelta en el agua; despues se echa todo sobre un filtro: si el óxido todavía contiene algun poco de sulfato de mercurio sin descomponer, se hace hervir de nuevo con la potasa, hasta que tomando una corta porcion de óxido de mercurio, y haciéndole hervir con ácido acético, aquel se disuelve enteramente en este ácido; entónces se lava bien el precipitado con el agua pura y se hace secar á la sombra.

### REMEDIO CONTRA EL TENIA (1).

Raiz de helecho macho. . . . .	℥ jv
Agua comun. . . . .	℔ iij

---

(1) Se ha sacado esta fórmula de los elementos de terapéutica y materia médica del Dr. Alibert.

Hágase hervir hasta que quede reducido el cocimiento á dos libras; añádese

Xarabe de coralina de Córcega.  $\overline{3}$  ij

Esta es la bebida de que hará uso el enfermo.

Tres horas despues de la comida tomará el bolo siguiente.

Muriato de mercurio dulce. }  $\overline{aa}$  2  $\overline{3}$   
Cuerno de ciervo calcinado. }

Conserva de rosas, q. s.

Por la tarde se dá una onza de aceyte de almendras dulces. El dia siguiente por la mañana el enfermo tomará un purgante compuesto de

Escamonea en polvos. . . . .  $\overline{8}$  xvij

Raiz de helecho macho pulverizada. . . . .  $\overline{3}$  j

Gota gamba. . . . . }  $\overline{aa}$   $\overline{8}$  xiiij  
Mercurio dulce. . . . . }

Este purgante se divide en tres dosis.

Se modifica el remedio segun la edad del enfermo, y segun que el ténia resiste mas ó ménos á su accion.

### REMEDIO DEL DR. BARLON

#### CONTEA LA TIÑA.

Sulfurero de sosa reciente. . . .  $\overline{3}$  iij  
Xabon medicinal. . . . .  $\overline{5}$  j 6  
Agua de cal. . . . .  $\overline{3}$  vij 6  
Alcool rectificado. . . . .  $\overline{3}$  ij

Mézelese exactamente y filtrese.

Se lava muchas veces, mañana y tarde, la cabeza del enfermo con esta agua. Se deja secar sin tocar nada. Las costras se desprenden, caen y dejan las partes subyacentes perfectamente sanas. Para hacer uso de esta agua ni es preciso cortar el cabello ni rapar la cabeza.

REMEDIO DEL DR. BICHER

CONTRA LA TIÑA.

Azufre dorado de antimonio (óxido de antimonio sulfurado naranjado. . . . .	} partes iguales.
Mercurio dulce (muriato de mercurio dulce). . . . .	
Azucar blanco. . . . .	

Se dan estos polvos en dosis de medio á un grano, mañana y tarde.

Igualmente se friccionan mañana y tarde las partes en que existe la tiña, con el unguento siguiente.

Verdete cristalizado. . . . .	} 3x 3 ij
Mercurio dulce. . . . .	
Pomada reciente. . . . .	

Las costras caen muy pronto estrogándolas con un cepillo ordinario: se lavan despues los niños con agua tibia, xabon y sulfureto de potasa. Se prescribe una dieta apropiada.

Cuando la tiña haya desaparecido, la cabeza deberá lavarse por mucho tiempo con una disolucion tibia de carbonato de potasa.

## REMEDIO ANTI-SÓRICO

DEL DR. JADELOT.

Este remedio es un baño sulfuroso fuerte análogo al de agua de Baréges artificial, pero mas simple. Se compone con sulfureto de potasa seco ó líquido.

Si se emplea el sulfureto seco, la proporcion es de una grama por litro de agua, ó de cuatro á cinco onzas por 150 libras de agua, esto es 75 pintas.

Si se emplea el sulfureto de potasa líquido, marcando 35 grados al areómetro de Sales, se echan ocho onzas ó 256 gramas en 9 ó 10 cantaros de agua.

Los enfermos infectados de sarna reciente ó antigua ordinariamente quedan curados después de haber tomado cinco, ó lo mas diez de estos baños. Es menester permanecer una hora ó hora y media en ellos. Deben tener una temperatura de 26 á 30 grados. (Reaumur).

## REMEDIO DE CHESTON CONTRA

EL CANCER DE LOS LABIOS Y LAS ULCERAS

MALIGNAS.

Echénse sobre cuatro onzas de hojas recientes de laurel real (*Cinnam. laure. corall.*) dos libras de agua hirviendo; depose enfriado y añádese á la colatura cuatro onzas de miel espumada.

Esta composicion se aplica esteriórmemente en locciones y por medio de compresas.

# REMEDIO DE LA CARIDAD

PARA LA CÓLICA DE LOS PINTORES.

Cuando la enfermedad es reciente (y es muy interesante atacarla desde su principio), se administra al enfermo una lavativa con cantidad suficiente de vino áustero y de aceite de nueces, que se batan juntamente. Una hora despues se da otra compuesta del modo siguiente.

Sen mondado. . . . .	3 ij
Electuario diafenicon. . . . .	3 j
— benedicta laxante. . . . .	3 jv
Miel mercurial. . . . .	3 ij

La pulpa de una coloquintida.

Se hacen hervir todas estas sustancias con un cuartillo de agua, y se cuela.

Despues del efecto de esta lavativa se repite la del aceite y vino. El dia siguiente se hace vomitar al enfermo con tres o cuatro granos de tartaro emético disuelto en agua; y luego despues de la accion del emético, se le da una dracma de triaca con un grano de *laudano opiado*.

Al dia tercero de la enfermedad se vuelve á las lavativas y al emético. El dia cuarto se purga con el remedio siguiente.

Sen mondado. . . . .	} $\overline{m}$ 3 j
Tamarindos. . . . .	
Sal de Epsom. . . . .	
Cremon de tartaro. . . . .	3 ij

Se hace hervir todo con una pinta de.

agua; se cuele, y se disuelve en la colatura

Electuario diafenicon. . . . . 3 jv

Xarabe de espio cervical. . . . 3 ij

Se dan muchos vasos de esta pocion purgante mediando tres cuartos de hora de uno al otro por la mañana.

Se sostendrán los remedios que acabamos de indicar con la media dracma de triaca y el grano de *láudano opiado* que se toma cada tarde, y con la tisana sudorífica siguiente

Leño de guayaco. . . . . } 3 ij  
 — de sasafraz. . . . . }

Raiz de china. . . . . } 3 ij (1)  
 — de zarzaparrilla. . . . }

— de bardana. . . . . }

Se pondrá todo en maceracion por espacio de doce horas en un vaso de tierra vidriado con tres cuartillos de agua que se hará hervir hasta reducirlos á dos.

El enfermo beberá muchos vasos de esta tisana al dia.

Cuando las fuerzas del enfermo estén muy

(1) Segun M. Merat de Vaumartoise, la tisana sudorífica laxante debe componerse así: guayaco, china y zarzaparrilla, de cada cosa una dracma. Haganse hervir durante una hora con tres pintas de agua, redúzcanse á dos, y añádase; sasafraz una onza; sen y regaliza, de cada cosa media onza; hápase hervir ligeramente, y cuélese. (*Véase* Disertacion sobre la colica metálica por V. Merat. Vol. en 6º. Paris 1813, en casa de Rigot, librero).

abatidas, se le dará la poción cordial cuya fórmula es la siguiente.

Agua de melisa simple. . . . .	} āā 3 j
— de cardo santo. . . . .	
— de tres nueces. . . . .	3 ij
Confeccion de jacinto. . . . .	3 iij
Xarabe de claveles. . . . .	3 j

La dosis de esta poción es una cuchara-da por cada hora.

Cuando se ataca la enfermedad desde los primeros dias de su existencia, muchas veces se logra la curacion al cabo de una semana. Si entonces los dolores no estan enteramente calmados, es menester continuar la marcha que acabamos de indicar, y dar los purgantes tan inmediatos los unos de los otros como lo permitan las fuerzas del enfermo.

En los dias de intervalo ó de descanso de los purgantes, se podrán dar los bolos siguientes.

Acibar socotrina. . . . .	} āā 8 x
Extracto de ruibarbo. . . . .	
— de eleboro. . . . .	} āā 8 xvj
— de diagridio. . . . .	
— de jalapa. . . . .	

Xarabe de espiño cerval, q. s. para formar de cinco á seis bolos, los que tomará el enfermo el dia antes de la purga.

## REMEDIO DE CUARIN

### CONTRA LA DISENTERIA.

Polvos de salicaria. . . . .	3 j 8
Agua de flor de amapola. . . . .	3 xvj
Xarabe de malvavisco. . . . .	3 j

Se agita la mezcla, y se toman tres onzas y media cada tres horas.

(Al principio, y cuando se trata de suavizar. P.)

### OTRO DEL MISMO

EN LA DISENTERIA MALIGNA.

Agua de melisa. . . . .	℥ viij
Catecú. . . . .	℥ iij
Alcanfor triturado con la go-	
ma arábiga. . . . .	℥ viij
Xarabe de Kermes. . . . .	℥ j

Se da en dosis de una cucharada de hora en hora.

(Cuando el cuerpo ha sido suficientemente purgado, y que ya no existe inflamacion. P.)

### OTRO DEL MISMO

*cuando son insuficientes los precedentes.*

Conserva de rosas castellanas. .	} añ 3 vj
Xarabe de arravan. . . . .	
Polvos de raiz de tormentila. . . .	℥ j
— de ipecacuana. . . . .	℥ 6
Opio purificado. . . . .	℥ jv

Mézelese exactamente.

Se toma una dracma cada una ó dos horas.

(Cuando las evacuaciones son casi continuas. P.)



## REMEDIO CONTRA EL ATOSIGAMIENTO

POR LOS HONGOS,

*Publicado de órden de M. el prefecto de policia  
con respecto al informe del Consejo de  
Sanidad.*

## ESTRACTO

La primera mira que se ha de tener es procurar la salida de los hongos venenosos. Así es que se debe emplear un emético como el tartrito antimoniado de potasa, pero para que sea eficaz este remedio, es menester prescribirle en suficiente dosis, mezclarle con alguna sal propia para excitar la acción del estómago, diluir y dividir el humor glutinoso y mucoso, cuya secreción se ha hecho mas abundante con la impresión de los hongos.

Se disolverá pues en una libra ó cuartillo (medio Kilogr) de agua caliente, dos ó tres decigramas (cuatro ó cinco granos) de tartrito de potasa antimoniado (tártaro emético) con doce á diez y seis gramos (dos ó tres dracmas) de sulfato de sosa sal de Glaubero.

Se dará tibia esta poción al enfermo y por vasos mas ó ménos inmediatos el uno del otro, aumentando las doses hasta que hayan producido evacuaciones. A los primeros momentos, el vomito basta á veces para arrojar todos los hongos y hacer parar los accidentes; mas si se diferan los socorros necesarios, si los accidentes no sobrevienen sino muchas horas despues

de la comida, es de presumir que parte de los hongos venenosos han pasado al intestino; entonces es preciso recurrir á los purgantes, á las lavativas hechas con la casia, el sen y alguna sal neutra, para determinar evacuaciones prontas y abundantes. En este caso se administrará con suceso una mistura hecha con el aceyte de ricino y el xarabe de persicó, que se aromatizará con algunas gotas del licor mineral de Hoffman, y se administrará á cucharadas mas ó menos repetidas.

Despues de estas evacuaciones que son de una necesidad absoluta, es preciso para remediar á los dolores, y á la irritacion producida por el veneno, recurrir al uso de los mucilaginosos, de los dulcificantes que se asocian á los fortificantes y nervinos. Así se prescribirá á los enfermos el agua de arroz gomosa, una ligera infusion de flores de sauco cortada con leche, á la que se añadirá agua de azahar, de verbena buena simple y un xarabe. Se usarán tambien con provecho las emulsiones, las pociones oleosas aromatizadas con cierta cantidad de eter sulfúrico. En algunos casos será preciso recurrir á los tónicos, á las pociones alcanforadas, y cuando haya tension dolorosa del vientre, será menester valerse de las fomentaciones, algunas veces de los baños y de las sangrías; pero solamente el médico podrá determinar el uso de estos remedios, el cual los modifica segun las circunstancias particulares; porque la eficacia del tratamiento consiste esencialmente, no en los específicos ó antidotos, de quienes se abusa con frecuencia, sino de la aplicacion hecha á proposito de los remedios simples y generalmente bien conocidos.

# REMEDIO DEL DR. MEGLIN

PARA CURAR EL TRISMO DOLOROSO  
DE LA CARA.

Extracto de beleño negro.	} aa 3 ij
— de raíz de valeriana silvestre. . . . .	
Oxido de zink sublimado. . . . .	

Háganse S. L. píldoras de tres granos.

Los enfermos empiezan por una y aumentan progresivamente una hasta seis, otro hasta ocho, y otro hasta diez y ocho mañana y tarde, teniendo cuidado de parar la progresion luego que las píldoras causen náuseas. Despues se continua á la misma dosis mañana y tarde hasta que hayan parado los dolores.

# REMEDIO DE PURMANN

CONTRA LOS TUMORES CRÓNICOS  
DE LAS ARTICULACIONES.

Solucion de muriato de sosa. . . . .	℥ ij
Vinagre concentrado. . . . .	℥ j
Hojas de salvia. . . . .	dos puñados.
Sulfato de cobre. . . . .	3 xij
Sulfato de alumina. . . . .	3 v β

Hágase hervir la mezcla por espacio de media hora.

Se aplica tibia al rededor de las articulaciones hinchadas.

## REMEDIO ANTI-LACTEO DEL DR. WEISS.

Gallium luteum. . . . .	} aa 3 j
Flores de sauco. . . . .	
— de hipericon. . . . .	
— de tila. . . . .	} aa 3 j
Hojas de sen. . . . .	
Sulfato de sosa. . . . .	

Se pone todo en infusion en un cuartillo de suero hirviente; se cuele el licor al cabo de una hora.

El enfermo toma este remedio por la mañana en tres tomas, con intervalo de media hora de una á otra, durante doce ó quince dias.

## REMEDIO ODONTALGICO DE VOGLER.

Almáciga. . . . .	} aa 3 ij 3 vij
Sandaraca ó grasilla. . . . .	
Sangre de drago escogida. . . . .	3 xxxvj
Opio seco. . . . .	3 j
Aceite volatil de romero. . . . .	gotas viij

Espíritu de coclearia s. q.

Despues de haber pulverizado separadamente la almáciga, grasilla, sangre de drago y el opio, se mezclan y se humedecen con el aceyte volatil de romero, se muele en un almirez de marmol, añadiendo poco á poco el espíritu de coclearia en suficiente cantidad para formar una masa uniforme de consistencia blanda, emplástica y semiductil.

Se usa contra los dolores de los dientes, aplicando ó estendiendo sobre la encia una

porcion de esta masa emplástica de la magnitud de un guisante.

REMEDIO ANTI-VENEREO DEL DR.

PEYRILHÉ.

Hojas de melisa. . . . . 3 jv

— de sen. . . . . 3 ß

Agua comun. . . . . 1b

Póngase en infusion á un calor suave en un vaso cerrado durante una hora, cuélese &c.

Tómese de la infusion de arriba. 3 xj

Disuélvase en ella azucar blanco. 3 jv

Métese este semijarave en una botella de cuartillo, y añádase

Carbonato de amoniaco puro. . 3 j ó 3 j ß

Se divide segun las circunstancias esta cantidad en cuatro dosis iguales ó mas.

REMEDIO CONTRA EL TENIA

*publicado de orden del colegio de los médicos*

*de Prusia.*

A.

Limaduras de estaño puro de

Cornovailles . . . . . 3 j

Polvos de la raiz de helecho

macho. . . . . 3 vj

Simiente de santónico. . . . . 3 jv

Polvos de raiz de jalapa. .

Sal policresta (sulfato de } 1a 3 j  
pótasa). . . . . }

Miel s. q. para dar á la mezcla la consistencia de electuario

Mézclese S. L.

B.

Raiz de jalapa en polvos. .	} aa	D ij
Sulfato de potasa. . . . .		
Polvos de escamonea de Alepo. D j		
Gota gamba en polvos. . . . .		g x

Miel, s. q.

El enfermo debe alimentarse poco durante el uso de estos remedios, evitar los alimentos salados, y no tomar mas que panetelas y legumbres ligeras.

Se le dan cada dos horas una cucharada de las de café de electuario A. y se continua así durante dos ó tres dias, hasta que experimente en los intestinos la sensacion que ordinariamente determina la presencia del gusano.

Entónces se administra el electuario B del mismo modo que el precedente, hasta que salga el gusano. En el caso en que esta espulsion no tenga lugar, se procurará con algunas cucharadas de aceyte de ricino, ó bien se dá una lavativa con una onza de este aceyte.

Generalmente se debe arreglar la dosis de estos remedios á la edad, sexo y constitucion del enfermo.

## REMEDIO DEL DR. KUTTINGER

### CONTRA EL TENIA.

Este remedio es el mismo que el de M. Mathieu, farmacéutico de Berlín; y consiste

en dos electuarios. El primero se compone del modo que sigue.

Limaduras de estaño puro. . . . 3 j  
 Raiz de helecho macho . . . . 5 vj  
 Semen contra. . . . . 5 jv  
 Raiz de jalapa en polvos. . } 3 j  
 Sulfato de potasa. . . . . }  
 Miel, q. s.

El electuario se da de dos en dos horas en dosis de una cucharadita de las de café, se pone el enfermo al régimen de pescado y á los alimentos salados. Despues de tres dias de este tratamiento, se dá el segundo electuario compuesto de

Jalapa pulverizada. . . . . } 3 j  
 Sulfato de potasa. . . . . }  
 Resina de escamonea de Alepo. 3 j  
 Cota gamba. . . . . 8 x  
 Miel, q. s.

Se administra este electuario como el primero, teniendo en consideracion la edad y fuerzas del enfermo.

# REMEDIO

CONTRA LOS ACCIDENTES OCASIONADOS  
 POR LOS HONGOS NOCIVOS

Acibar socotrino, pp. . . . . 3 xx  
 Mirra. . . . . 3 xij  
 Resina de guayaco, pp. . . . . 3 x

Métanse estas sustancias cada una de por sí en

Aguardiente á 22°. . . . . 16 j  
 Cada dia se agitará la botella, durante

doce ó quince días; despues se decantan los licores, y se mezclan todos (I).

Al momento de experimentar la menor incomodidad despues de haber comido hongos, se toma un vasito de los de licor de este remedio, y cada vez que se vomita, se toma medio vasito. Algun tiempo despues de haber parado los vómitos, se toma el té bien azucarado.

Este elixir conviene tambien en las indigestiones, en los cólicos de estómago y bajo vientre, en la supresion de los menstruos por debilidad y de la transpiracion. Es vulnerario, y se usa contra la gota y los dolores reumáticos.

### REMEDIO CONTRA EL TIALISMO.

Sulfato de sosa. . . . .	50 partes.
Carbon. . . . .	10
Azufre. . . . .	6

Se derrite en un crisol cubierto; retírese, lávese, fíltrese y hagase cristalizar.

Se dá este remedio en dosis de un escrúpulo, que se repite cuatro veces al día. Para la salivacion escesiva causada por el mercurio.

Se usa tambien en las enfermedades del hígado que se han vuelto crónicas.

(I) Los residuos de esta mezcla son buenos para la cura de las llagas y contusiones.



## SAL DE GUINDRE.

Sulfato de sosa en polvos (1). . . 3 vj  
 Nitrato de potasa. . . . . ʒ xij  
 Tártaro emético. . . . . ʒ ß

Por una dosis.

Se disuelve esta mezcla en una pinta de tisana ó de caldo con yerbas para purgarse.

## SOLUCION ANTI-VENEREA

DE WEIKARD.

Sublimado corrosivo. . . . } ʒā ʒ jv  
 Muriato de amoniaco. . . . }  
 Agua destilada. . . . . 3 ij  
 Láudano líquido. . . . . 3 xxxvj  
 Aceite volatil de canela. . . . gota j

Mézclese.

Se dá esta solucion en dosis de treinta á cuarenta gotas, mañana y tarde, con agua gomosa ó leche. Esta preparacion mercurial conviene particularmente a los sugetos delicados, cuyo estómago no puede soportar el licor de Van-Swieten y los demas remedios mercuriales.

(1) Esta sal debe quedar reducida en polvos por su efflorecencia natural.

## SOLUCION CITRO-MURIÁTICA

FEBRIFUGA DE BROUSSONNET.

Se disuelve muriato de sosa en el zumo es-  
primido del limon, hasta perfecta saturacion.  
Se filtra. . . . .

En las calenturas pútridas y adinámicas,  
se dá una cucharada al enfermo de hora en  
hora. . . . .

## SOLUCION ARSENICAL DE PRUSIA.

Oxido de arsénico subli-	} aa 3 j ĩ jv
mado y pulverizado muy	
fino. . . . .	
Subcarbonato de sosa. . . . .	
Agua destilada. . . . .	3 xij

Se calienta el licor en el baño de arena,  
filtrese y consérvese la solucion en una bote-  
lla bien tapada.

La dracma de esta preparacion contiene  
dos terceras partes de grano de óxido. Se pue-  
de dilatar con xarabe simple.

Los médicos de Berlin la prescriben en las  
calenturas intermitentes rebeldes: no se debe  
tomar mas de la vigésima parte de grano de  
una vez.

NOTA. Las preparaciones arsenicales son  
tan peligrosas, que nunca serán sobradas las  
precauciones que se tomaren en la administra-  
cion de dicho remedio.

SUPOSITORIOS FORTIFICANTES

DE REUSS.

Raiz de tormentila. . . . . } aa 3 ij  
Corteza de encina. . . . . }

Pulverícense estas sustancias; y añádeseles suficiente cantidad de miel para formar ocho supositorios.

Se emplean dichos supositorios en la caída del intestino recto, debilidad de dicho intestino, y despues de las hemorragias.

SUPOSITORIO CONTRA LAS  
ALMORRANAS.

Corcho quemado. . . . . 3 j  
Manteca reciente. . . . . 3 ij  
Cera. . . . . 3 j

Háganse segun arte tres calas.

TABLILLAS ANTI-CATARRALES

DE TRONCHIN.

Goma arábica en polvos. . . . . 3 viij  
Kermes mineral. . . . . } aa 3 j 3 j  
Simiente de anís. . . . . }  
Estracto de regaliza por infusion. 3 ij  
Azucar blanco. . . . . 1b ij  
Estracto de opio gomoso. . . . . 8 xij  
Mucilago de goma tragacanto, q. s.

Háganse segun arte tablillas del peso de seis granos.

Se toman de seis á ocho en el curso del dia.



### TINTURA DE DAFFY'S.

Sen.	.....	3 j
Jalapa.	.....	} 3 jv
Culantro.	.....	
Cremór de tárraro.	.....	
Aguardiente.	.....	cuartillo y medio.
Azucar.	.....	3 vj

Este agradable purgante se dá en dosis de una onza hasta tres, guardando un largo intervalo entre cada toma.

### TINTURA DE RUIBARBO DE SPIELMANN.

Ruibarbõ machacado.	.....	3 j
Agua destilada.	.....	3 jx
Acetato de potasa.	.....	3 j

Mézclese todo junto, déjese en infusion durante cuatro horas, fíltrese.

Se dá en las eructaciones, flatuosidades, para fortalecer el estómago, en dosis de media onza con un vehículo apropiado. Tambien es útil en la ictericia.

## TINTURA SAGRADA.

Acibar. . . . .	3 j
Pimienta de Jamayca (1). . . . .	} aa 3 j
Gengibre. . . . .	
Vino de España. . . . .	3 viij

Se pone en maceracion por espacio de ocho dias, y se filtra:

Se dá en la dispepsia, indigestiones y en los desarreglos de estómagos, en dosis de una cucharada, con un vehículo apropiado.

## TINTURA FEBRÍFUGA DE CLUTTON.

Acido sulfuroso. . . . .	} aa 3 ij
— sulfúrico. . . . .	
Muriato de sosa. . . . .	3 iij
Alcool. . . . .	3 iij

Se tiene en digestion durante un mes, despues se destila hasta sequedad. Se añade al licor destilado

Raiz de angélica. . . . .	} aa 3 j B
— de aristoloquia. . . . .	
Simiente de cardamomo. . . . .	

Se hace digerir durante ocho dias y se filtra. En cinco ó seis libras de agua edulcerada con miel ó xarabe; se añade suficiente cantidad de esta tintura para dar al licor una acidez agradable.

(1) Es una especie de mirto.

Este licor es la bebida ordinaria de los enfermos que tienen una fiebre arreglada cualquiera.

## TINTURA DE ESPLIEGO COMPUESTA

DE LONDRES.

Espíritu de espliego. . . . .	℥ iiij
— de romero. . . . .	℥ j
Canela. . . . .	} aa 3 j ℥
Nuez moscada. . . . .	
Sándalo rubio. . . . .	3 j

Déjese digerir durante seis días, y fíltrese.

Se dá en dosis de diez gotas á una dracma con dos dracmas de azucar en la languidez y as-  
tenia nerviosa.

## TINTURA NERVINO-TÓNICA

DE BESTUCHEF.

Tómense limaduras de hierro puro, disuélvase en suficiente cantidad de ácido muriático, al cual se añade una cuarta parte de ácido nítrico, fíltrese la disolucion que debe estar cargada hasta tal punto que una porcion de hierro quede sin disolver. Se hace evaporar en un vaso de porcelana en el baño de arena. Se expone en una bodega la masa seca; esta atrae la humedad, y se resuelve en un líquido que se llama *aceyte de marte*. Fíltrese este licor, mézclese con el doble de su peso de eter sulfúrico; agítese hasta que despues de haberle dejado reposar, el eter haya tomado un color amarillo de oro; decántese el eter, y

mézclese con el doble de su peso de alcohol muy rectificado, agitando la mezcla en un frasco tapado al emerí.

Esta tintura se dá en dosis de veinte á treinta gotas con un vehículo acuoso. Conviene en las enfermedades espasmódicas y esténicas.

## TINTURA DE HOLLIN

*Farmacopea de Edimburgo.*

Hollin de leño brillante. . . . .	3 j
Asafétida. . . . .	3 jv
Alcool debilitado. . . . .	3 xij

Hágase digerir y cuélese.

Esta tintura se prescribe contra los gases, flatos, en las convulsiones sintomáticas causadas por la dentición, y en las enfermedades histéricas.

La dosis es de quince á treinta gotas con un líquido apropiado.

## TINTURA ANISADA DEL DR. ALIBERT.

Polvos de ipecacuana. . . . .	3 j
-------------------------------	-----

Se pone á digerir con cuatro onzas de espíritu de anís.

Se añádese cada vez un poco de azúcar. La dosis de esta tintura es de una á dos onzas en los romadizos.

Es muy á propósito para los niños porque el perfume que la acompaña disfraza el mal gusto de la ipecacuana.

# TINTURA VOLATIL DE GUAYACO DE LONDRES.

Resina de guayaco. . . . . 3 j

Espíritu volatil aromático de  
Silvio. . . . . 3 vj.

Hágase la disolucion.

Se dá en la gota, cardialgia, cólico nefrítico y en la disuria.

La dosis es de una dracma á media onza, en una taza de leche ó de agua tibia, dos veces al dia: . . . . .

## TINTURA DE ANTIMONIO DE JACOBI.

Se hace hervir una legía fuerte de las escorias recientes de régulo de antimonio, con un aceyte craso recientemente exprimido, hasta que todo haya tomado la consistencia de xabon, se disuelve este xabon en la tintura acre de antimonio, que ordinariamente se llama azufre líquido de antimonio. Se filtra. Esta tintura es un resolutivo y diurético. La dosis depende del modo con que ha sido preparada. Se empieza por algunas gotas, y se aumenta sucesivamente la dosis, segun lo exigen las circunstancias. Se dá en las gonorreas crónicas y en las obstrucciones de las víceras abdominales.



## TINTURA DE MALATO DE HIERRO (1).

Limaduras de hierro porfirisadas. ℥ j  
 Zumo reciente de manzanas áci-  
 das (2). . . . . ℥ iij

Se deja algun tiempo el zumo sobre el metal. Se tiene cuidado de agitarle con frecuencia. Cuando el zumo parece saturado, se decanta y se echa de nuevo otra cantidad, hasta que todo el hierro quede disuelto; se reunen estas disoluciones, y se hacen evaporar hasta la mitad de su peso; entónces se añade una parte de alcohol sobre seis de la disolucion espesada; se hace digerir por algun tiempo la mezcla y se filtra.

Esta tintura se dá en la clorosis, debilidad de estómago y en la tisis mesentérica de los niños. La dosis es de un escrúpulo á una dracma.

## TINTURA DE ALMÁCIGA COMPUESTA (3).

Almáciga en lágrimas. . . . .	} aa 3 ij 3 jv
Mirra. . . . .	
Incienso. . . . .	
Alcohol rectificado. . . . .	℥ iij 3 xij

(1) Extractada de la Farmacopea austriaca.

(2) Se le puede sustituir con ventaja el zumo de membrillos.

(3) Extractada de la Farmacopea austriaca.

Se hacen digerir las resinas hasta que la tintura parezca hecha y se filtra.

Se usa en los sabañones, grietas y endi-  
duras.

(Es necesario que los pediluvios, maniluvios, &c. calientes precedan al uso de esta tintura. P.)

## TINTURA NERVINA Y TÓNICA

*de la Farmacopea de Berlin.*

Raiz de valeriana silvestre.	} añ 3 j ß
Yerba buena piperita. . . . .	
Alcohol. . . . .	℥ ij
Castoreo. . . . .	3 j
Azafran. . . . .	3 jv
Esencia de yerba buena. . . . .	3 j

F. S. A.

Se dá en dosis de veinte á treinta gotas,  
en los espasmos y debilidad de estómago.

## TINTURA ANTI-ESPASMÓDICA

DE HEUP.

Raiz de valeriana silvestre. . .	3 j
Licor anodino mineral de Hoffmann. . . . .	3 jv

Póngase en infusion durante quince dias y decántese.

Esta tintura se da en el cólico ventoso; se le añade la mitad de esencia de corteza de naranja; y despues de haberlas bien mezclado, se dan cuarenta gotas con un vaso de infusion de manzanilla.

## TINTURA DE RUIBARBO INGLESA.

Ruibarbo de china. . . . .	3 iij
Simiente de cardamomo. . . .	3 jv
Alcool. . . . .	1b iijß

Hágase digerir durante ocho dias, y fíltrese.

Esta tñtura se da en dosis de media onza y de una onza con un vehículo apropiado. Conviene para disipar los gases y facilitar las digestiones perezosas.

## TINTURA TEBAICA DE BAMBERG.

Opio sin depurar. . . . .	3 ij
Clavos de especia. . . . .	3 j
Agua de canela hordeada. . . .	3 viij
Alcool. . . . .	3 jv

Se pone todo en maceracion por espacio de seis dias, y se filtra.

(Esta tintura es una especie de láudano que se puede sustituir al de Sidenham. P.)

## TINTURA CON LEGIA DE VOGLER.

Raiz de genciana. . . . .	3 vj
Cortezas de naranja secas. . . .	3 ij
Cenizas graveladas. . . . .	3 xv
Agua hirviendo. . . . .	3 lx

Métase en digestion durante seis dias.

Añádase

Alcool rectificado. . . . . 3 ij

Fíltrese.

(Se da una dracma dos ó tres veces por día en la atrofia, infartos glandulosos, estranguria, gonorrea cuando son atónicas. P.)

### TINTURA ESTOMACAL DE MOSCATI.

Corteza de naranja agria. . . . .	3 j
Cascarilla pulverizada. . .	} aa 3 B
Hojas secas de camedrios. . .	
Agua destilada de cortezas de limon. . . . .	} aa 3 viij
— de hojas de agenjo. . .	
Alcool á 32°. . . . .	

Infúndase durante dos ó tres dias á un calor suave.

Cuélese y filtrese.

La dosis es media onza ó seis dracmas dos veces al dia antes de almorzar y de comer.

### TINTURA ESTOMÁTICA AMARGA

*de Edimburgo.*

Raiz de genciana. . . . .	3 ij
Cortezas secas de naranjas agrias. . .	3 j
Canela blanca. . . . .	3 jv
Cochinilla. . . . .	3 B
Alcool debilitado. . . . .	lb i 3 viij

Póngase en infusion durante cuatro dias y filtrese.

La dosis es de cuatro á seis dracmas por la mañana ántes de almorzar, ó una hora ántes de comer.

## TINTURA DE CARDAMOMO COMPUESTA

*Farmacopeya Londinensis.*

Simiente de cardamomo. . . . .	} aa 3 ij
—de alcaravea. . . . .	

Cochinilla. . . . .	3 iv
---------------------	------

Canela. . . . .	3 iv
-----------------	------

Paeas privadas de sus granitos	3 vj
--------------------------------	------

ó pepitas. . . . .	3 ij
--------------------	------

Alcohol. . . . .	
------------------	--


Se pone en maceracion por espacio de cuatro dias y se filtra.

(Se da una cucharadita con algun vehículo apropiado en la debilidad y languidez de la digestion &c. P.) . . . . .

## TINTURA ETEREA DE KLAPROTH.

(Véase eter acético acerado de Klaproth.)

La tintura de Klaproth se prepara con el óxido de hierro *ad maximum*, lo que le dá un color roxo. Cuando el acetato de hierro es *ad minimum*, la tintura es verde.



## TÉ DE SALUD

de M. de Saint-Germain (1).

Simiente de anis. . . . .	} aa 3 ij
Leño de abedul raspado. . . . .	

Sándalo blanco . . . . .	} aa viij
—rojo. . . . .	

Simiente de berdolaga. . . . .	3 ij
--------------------------------	------

Sen mondado. . . . .	3 ij
----------------------	------

Hágase polvos S. L.	
---------------------	--

---

(1) M. de Saint-Germain no fué médico; pero gozó de grande reputacion, como curandero; y este *infusum* parece produjo muy buenos efectos manejado por él.

Estos polvos fortificantes, y al mismo tiempo laxantes se dan en dosis de una cucharadita de las de tomar café, para seis tazas de agua hirviente que se adulcera con azucar, y se toma por la mañana en ayunas.



### TISANA DE VINACHE.

Zarzaparrilla. . . . .	}	aa 3 j ß
China. . . . .		
Guayaco. . . . .		
Sasafrá. . . . .	}	aa 3 jv
Sen. . . . .		
Sulfureto de antimonio. . . . .		3 ij

Se pone el sulfureto pulverizado en una muñeca de lienzo; se hace hervir con la zarzaparrilla, china y guayaco en tres pintas de agua. Cuando el cocimiento queda reducido á dos terceras partes, se añade el sen y el sasafrá. Se cuele, se deja apurar y se decanta.

Esta tisana purgante y sudorífica conviene en las enfermedades cutáneas y sifilíticas.

### TISANA REGIA.

Tamarindos. . . . .	3 ij	
Sen. . . . .	}	aa 3 ij
Sulfato de sosa. . . . .		
Anís. . . . .	}	aa 1 pulgarada.
Culantro. . . . .		
Perifollo. . . . .		
Pimpinela. . . . .		

Se echa sobre él todo una pinta de agua

hirviendo; se deja infundir media hora teniendo cuidado de agitarlo muchas veces y se cuela.

Esta tisana purga mucho.

## TISANA DE FELTZ.

Zarzaparrilla. . . . .	3 ii
Raices de China. . . . .	3 j
Sulfureto de antimonio. . . . .	3 iv
Cola de pescado . . . . .	} aa 3 i β
Corteza de box. . . . .	
— de yedra. . . . .	℥ xi j
Agua comun. . . . .	

Se envuelve el sulfurato de antimonio en una muñeca de lienzo algo floja, y se hará segun arte un cocimiento que se prolongará hasta la evaporacion de la mitad del licor; cuélese con una estameña, déjese reposar algunos minutos; decántese y hágase disolver en la colatura.

Muriato de mercurio sobreoxigenado. . . . . 3 ii j

Esta tisana se usa en las enfermedades venéreas, en dosis de una pinta por dia.

## TISANA DE BUCHAN.

Cebada perlada. . . . . 3 ij

Hágase hervir en cuatro pintas de agua.

Añádase.

Pasas mondadas. . . . .	} aa 3 ij
Higos secos. . . . .	
Raiz de regaliza mondada. . . . .	

Se hace hervir hasta reduccion de la mitad, y se disuelven en este líquido dos dracmas de nitro.

Esta tisana es emoliente y pectoral.

### TISANA DE VIGAROUS.

Raiz de zarparrilla.....	3 vñ
— de lirios de Florencia.	} aa 3 vijñ
— de aristolochia larga.	
Guayaco en raspaduras. . .	
Sasafras. id. . . . .	
Jalapa quebrantada.....	}
Polipodio de encina. . . .	
China. . . . .	} aa 3 vijñ
Tartarito ácido de potasa	
Sulfureto de antimonio. . .	
Simiente de anis. . . . .	}
Nueces recientes con su corteza	
verde machacadas. . . . .	n.º 12.

Se ponen todas estas sustancias en un vaso algo grande. Se echan encima dos pintas de vino blanco. Se cubre el vaso y se deja infundir todo por espacio de seis horas. Entonces se echan en el mismo vaso cinco pintas de agua hirviendo. Se cubre el vaso y se coloca en una vacía medio llena de agua hirviendo; se prolonga la infusion por espacio de doce horas, despues se cuela y se conserva en botellas que se rubricarán n.º 1.

Sobre las heces ó poso se echa una libra de vino blanco; déjase infundir como antes, añádanse cinco pintas de agua hirviendo; opere-se del mismo modo que antes; cuélese y póngase en botellas que se rubricarán n.º 2.



Esta tisana se usa en los dolores reumáticos, y en los que son ocasionados por antiguas enfermedades venéreas mal tratadas. Se empieza por la que va rubricada con el n.º 2.

Cuando se haya concluido esta se continúa la bebida por la del n.º 1. y se sigue así alternando las botellas hasta que el médico juzgue conveniente suprimirlas ó suspenderlas.

### TROCISCOS DEL DR. CHAUSSIER.

Alcanfor. . . . .	3 j
Opio. . . . .	3 j
Goma tragacanto . . . . .	3 B
Azucar. . . . .	3 jx]
Agua q. s. . . . .	

Para formar ciento cincuenta trociscos.

Se dan en dosis de cuatro á seis por día, en la tisis la ringea ó angina.

### UNGUENTO MONTPELLER.

Unguento de altea. . . . .	} aa 3 ij
— rosado. . . . .	
— populeon. . . . .	
Miel. . . . .	

Mézclese exactamente,

Este unguento se usa contra las amorranas.

# UNGUENTO BLANCO ALCANFORADO

*de la Farmacopea de Viena.*

Albayalde. . . . . ℥ j 3 xiv

Manteca de puerco. . . . . ℥ iij 3 xij

Se hace calentar y se agita hasta que la masa tenga la consistencia de unguento; se añade

Alcanfor en polvos. . . . . 3 ij 3 vi

Se mezcla y se cuele el unguento.

Se usa contra las quemaduras y contusiones seguidas de inflamacion.

# UNGUENTO EPISPÁSTICO SIN

CANTÁRIDAS.

Simiente de mostaza. . . . . 3 jv

Pelitre. . . . .

Albarráz (simiente de). . . } aa 3 j

Pimienta larga. . . . .

Euforbio. . . . . 3 j

Unguento basilicon. . . . . 3 jv

Trementina, q. s.

Este unguento se usa para escitar ó entre-  
tener el flujo de un emunctorio. No ataca la  
vegiga como las cantáridas.

# UNGUENTO DE PIDERIT.

Miel amarilla. . . . . } aa 3 vij

Pulpa de cebollas cocidas. . . . .

Cera amarilla. . . . .

Resina ordinaria. . . . . } aa 3 j 3 iij

Xabon negro. . . . .

Despues de haber hecho cocer las cebollas debajo las cenizas, y de haberlas reducido á pulpa, se hace derretir la cera y la resina, despues se añade la miel, las cebollas reducidas á pulpa y el xabon negro; se mantiene el fuego hasta que se haya evaporado toda la humedad, y se menea continuamente la mezcla con una espátula de madera hasta que esté enteramente fria.

UNGUENTO DE PROPÓLEOS DE CADET.

Propóleos purificado con el agua  
hirviente. . . . . 3 jv  
Aceite de olivas. . . . . 1b 13

Se disuelve el propóleos con el aceite, y despues de haberles bien mezclado, se cuele el unguento caliente.

Se usa en las úlceras antiguas y en el tratamiento de las almorranas.

UNGUENTO DEL DR. PLENCK

*contra los sabañones.*

Manteca de puerco. . . . . }  
Grasa de buey. . . . . } 3 ij  
Aceite de laurel. . . . . }  
Cera. . . . . }

Se derriten á fuego lento y despues de haberse enfriado se añade

Alcanfor. . . . . 3 jv  
Disuelto en alcohol rectificado. 3 j

Mézclese exactamente S. L.

## UNGUENTO DE FALK,

CONTRA LOS TUMORES HEMORROIDALES.

Limaduras de estaño puro. }  $\overline{aa}$  3 ij  
 Mercurio. . . . . }  
 Hagase una amalgama. Añádese  
 Unguento rosado. . . . . 3 j  
 Mercurio precipitado rojo. . . . 3 ij  
 Aceite destilado de yerba buena piperita. . . . . gotas xx  
 Hágase un unguento S. L.

Este unguento se aplica con una compresa de hilas sobre los tumores hemorroidales.

## UNGUENTO MERCURIAL BLANCO

*de Zeller.*

Mercurio precipitado blanco. . . 3 j  
 Cerato ó pomada blanca de rosa. 3 j  
 Mézclese exactamente.

Este unguento se usa como cosmético, y en las enfermedades cutáneas, sarnosas, herpéticas ó venéreas. Se emplea en fricciones ligeras en dosis de una dracma ó menos según las circunstancias.

## UNGUENTO DE RICOUR.

Aceite rosado. . . . . 3 xij  
 Cera blanca. . . . . 3 viij  
 Albayalde. . . . . 3 jv  
 Litargirio. . . . . 3 ij  
 Hacia la fin de la coccion  
 Bálsamo peruviano líquido. . . 3 jv

Este unguento se aplica sobre las úlceras indolentes.

UNGUENTO PARA LA TIÑA.

*Receta del hospicio de la Misericordia.*

Harina de trigo. . . . .	} aa lb v
Pez negra. . . . .	
Pez de Borgoña. . . . .	
Vinagre blanco. . . . .	lb xxx

Se deslie la harina en el vinagre caliente; se añade la pez negra y la de Borgoña derretidas.

Se estiende este unguento sobre un pedazo de piel; despues se aplica tibio sobre las partes de la cabeza infectadas de tiña; al cabo de doce horas se quita, se lava la llaga y se sigue el tratamiento racional usado en esta enfermedad.

UNGUENTO CONTRA LA TIÑA.

Carbon de leña. . . . .	} aa 3 jv
Flores de azufre. . . . .	
Hollin. . . . .	3 ij

Mézclense despues de ser bien pulverizados.

Manteca de puerco. . . . . 3 xv

M. S. A.

Cada tres dias se unta la cabeza mañana y tarde con este unguento despues de haberla lavado con agua de xabon.

## UNGUENTO DE LA ABADIA DEL BEC.

Manteca de puerco. . . . .	} aa lb j
Pez de Borgoña. . . . .	
Resina. . . . .	} aa 3 v
Pez naval. . . . .	
Cera amarilla. . . . .	3 x
Incienso fino en polvos. . . . .	3 x

F. S. A.

Este unguento tiene el mismo uso que el  
de Ricour.

## UNGUENTO DEL DUQUE.

Aceite de nueces. . . . .	3 viij
Flores de azufre. . . . .	3 ij

Se pone todo en el baño de arena durante  
media hora ó hasta que el azufre esté disuel-  
to, y que el aceite se haya vuelto rojo. Des-  
pues se hace derretir y se colora con s. q. de  
anacusa de tintes.

Enjundia. . . . .	3 viij
Cera amarilla. . . . .	3 j

Se cuele con un lienzo y se echa el un-  
guento en un almirez de marmol para mez-  
clarle exactamente el bálsamo azufrado arri-  
ba indicado.

## UNGUENTO DEL DR. SWEDIAUR

PARA SABAÑONES

Almendras amargas mondadas. . . . .	3 viij
Miel. . . . .	3 vj
Alcaufor. . . . .	3 jv
Harina de mostaza. . . . .	3 8
Alumbre calcinado. . . . .	} aa 3 ij
Incienso fino en polvo. . . . .	

Tres yemas de huevos.

Mézelese y formese una pasta.

Con esta composicion se hacen ligeras fricciones sobre los sabalones, y algunos momentos despues se lavan con agua tibia, ó mejor se ponen guantes ó escarpiues, que no se quitan hasta haber pasado cuatro horas.

(Las inmersiones frecuentes en el agua caliente y las lociones con el aguardiente alcanforado y la tintura de menjú son otros tantos medios equivalentes si no preferibles. Lo que tampoco escluye el uso de los guantes forrados. P.)

# UNGUENTO OFTALMICO DE SMELLOME

Alcanfor dividido por el	} aa 3 vj
alcool. . . . .	
Oxido blanco de zinque. . .	
Oxido verde de cobre levigado. 3 ij	

Despues de haberlo triturado todo junto añádase en un almirez caliente, agitando

Manteca de puerco. . . . .	} aa 3 ij
Clara de huevo. . . . .	

F. S. A.

Se estiende un poco de este unguento sobre los bordes de los párpados en la oftalmia crónica.



# VEGIGATORIOS DE LOUYER-VILLERMAY.

Pez de Borgoña. . . . .	3 j
Resina. . . . .	3 iij
Cera amarilla. . . . .	3 j 3 v
Trementina. . . . .	3 8
Unguento basilicon. . . . .	3 ij
Cantaridas en polvo impalpable. 3 ij	

Aromatizese con esencia de espliego, q. s.

## OTRO.

Pez negra. . . . .	℥ jv
Cera amarilla. . . . .	℥ j ℥ viij
Colofonia. . . . .	℥ j ℥ x
Aceite de olivás. . . . .	℥ ij ℥ viij
Cantáridas en polvo impalpable. . . . .	℥ x

F. S. A.

Añádase de nuevo

Cantáridas. . . . .	℥ j ℥ ij
Esencia de espliego. . . . .	℥ β

## OTRO.

Cantáridas en polvo fino. . .	℥ ij β
Cera amarilla. . . . .	℥ x
Pez negra. . . . .	℥ j β
Pez resina. . . . .	℥ ij
Manteca de puerco. . . . .	℥ viij

M. Loyer-Villermay prefiere estos vegigatorios porque no le han presentado los mismos inconvenientes que el del Codex que obra sobre las vías orinarias.

## VEGIGATORIO PERPETUO DE JANIN.

Cantáridas en polvo muy fino	℥ j
Euforbio. . . . .	℥ β
Almáciga. . . . .	} aa ℥ ij
Trementina. . . . .	

Hágase un emplasto S. A.



VEGIGATORIO INGLES.

Se prepara del mismo modo que el tafetan con la cola de pescado, como para el tafetan llamado de *Inglaterra*; y en lugar de una tintura de bálsamo peruviano, se aplican sobre la cola muchas capas de tintura de cantáridas, hecha con el alcohol debilitado á diez y ocho ó veinte grados.

VEGIGATORIO DE M. WAUTERS.

Inciensio pulverizado. . . . . 3 v  
 Pimienta negra ( *Piper nigrum*). 3 iij  
 Muriato de sesa pulverizado. . . 3 iij  
 Xabon blanco en raspaduras. . 3 vj 3 iij

Se hace digerir esta mezcla con seis onzas de alcohol, hasta que el xabon quede derretido. Se cuece durante algunos minutos, y se agita con una espátula. Se estiende este unguento sobre el lienzo y se renueva la cura todos los dias.

Este remedio es un rubefaciente que obra dos ó tres dias. Es útil en los reumatismos. En unos sujetos obra con bastante energia, y en otros con lentitud.

VEGIGATORIO DE M. BONVOISIN.

Se toma un pedazo de tafetan de Inglaterra de la estension que se quiere dar al vegigatorio; se moja la parte que está goma-do con el ácido acético muy concentrado (*vinagre radical*), y se aplica sobre la piel.

## VEGIGATORIO DE LECOMPTE.

Cera amarilla. . . . .	3 x
Derrítase y añádese	
Trementina. . . . .	3 vj
Cantháridas pasadas por un tamiz muy fino. . . . .	3 vj
Euforbio en polvo muy fino. . . . .	3 vj

Se aromatiza á discrecion con una mezcla de aceite de espliego y de bergamota.


## VEGIGATORIO AMONIACAL.

Se hace con el agua de cal y aceite un xabon calcáreo que tiene la consistencia de crema. Se le añade álcali volatil (amoníaco líquido en exceso).

Se empapa un lienzo con esta mezcla y se aplica sobre la piel en el lugar que se quiere vegigar, es conveniente irritar preventivamente la piel, frotándola con un pedazo de franela. Tambien es menester cortar á la redonda el lienzo que se debe embeber con la mezcla (1).

---

(1) Cuando este vegigatorio no tiene más álcali que el preciso para obrar como á rubefaciente, los ingleses le aplican sobre la muñeca de los fibrilantes de intermitentes antes del paroxismo. Algunos farmacéuticos hacen este xabon con partes iguales de manteca de puerco derretida y de amoníaco líquido. Entonces tiene más consistencia. Dentro un cuarto de hora obra como á rubefaciente, y dentro cuatro horas como á vegigatorio.



## VINO DE HUXHAM.

Vino de Málaga. . . . . 3 j  
 Tártaro emético. . . . . 8 n.º I

Se da en dosis de treinta á cuarenta gotas en las enfermedades ocasionadas por la supresion de la transpiración.

## VINO FEBRIFUGO DE S....

Quina amarilla. . . . . }  
 Cortezas secas de naranja. . . . . } 3 v 8 xvij  
 Raíz de genciana. . . . . }  
 Flores de manzanilla. . . . . }  
 Vino de España. . . . . 15 ij  
 Alcohol á 20 grados. . . . . 8 j

Se prescribe en las calenturas intermitentes en dosis de una ó dos onzas mañana y tarde.

## VINO AMARGO Ó ELIXIR DE DUBOIS.

Genciana. . . . . 3 j 8  
 Carbonato de potasa. . . . . 8 l  
 Aguardiente. . . . . una piata

Se deja digerir por espacio de quince días y se filtra para el uso.

(Una, dos, tres, cuatro cucharadas de las de tomar café ó de las regulares y mas segun la edad. P.)

## VINO FEBRIFUGO.

Vino de España. . . . .	℥ ij
Alcool á 35.º grados. . . . .	3 viij
Quina amarilla machacada. . .	3 ij
Leño de Surinam. . . . .	3 j

Se pone en maceracion por espacio de ocho á diez dias.

Se da en dosis de una á dos onzas por la mañana en ayunas.

## VINO AMARGO.

Raices de genciana. . . . .	3 viij
Quina. . . . .	} aa 3 ij
Cortezas de naranja. . . . .	
Corteza de Winter. . . . .	3 j
Alcool. . . . .	3 jv
Vino de España. . . . .	℥ ij

Se pone en maceracion por espacio de cuatro dias y se filtra.

Se da en los mismos casos y en la misma dosis que el vino de quina.

## VINO ESTOMÁTICO DE PLENCK.

Quina escogida machacada. . .	3 jv
Raiz de genciana seca y cortada en pedacitos muy finísimos. . . . .	3 vj
Luquetes de cortezas de naranjas (la parte amarilla). .	3 ij
Vino tinto bueno. . . . .	℥ ij

Se pone en maceracion por espacio de cuatro dias; cuélese, fíltrese y consérvese para el uso.

Este vino se da en dosis de una ó dos onzas en las fiebres adinámicas intermitentes, en la debilidad de estómago y en la convalecencia de las enfermedades agudas.

### VINO ANTIHIDRÓPICO DE FULLER.

Lirios de Florencia. . . . .	3 ij
Enula campana. . . . .	} aa 3 j β
Cebolla albarrana. . . . .	
Corteza de sauco. . . . .	} aa 3 j
— de yezgos. . . . .	
Corteza de Winter. . . . .	3 ij
Sen. . . . .	} aa 3 ij
Raiz de eleboro negro. . .	
— de jalapa. . . . .	
Agarico. . . . .	℥ jv
Vino blanco. . . . .	℥ jv

Infúndase en frío.

La dosis es de cuatro onzas por la mañana en ayunas.

### VINO ANTI-LEUCORRAICO.

Quina parda. . . . .	3 vi
Azafran. . . . .	3 iij 3 j
Cuasia amarga. . . . .	} aa 3 j β
Cálamo aromático. . . . .	
Canela. . . . .	5 vj
Flor de sauco. . . . .	5 vj
Alcohol. . . . .	℥ iij
Tintura de Marte. . . . .	3 xij
Agua pura. . . . .	℥ xvij
Xarabe de azucar. . . . .	3 vj
Agua de azahar. . . . .	℥ j β

Se da en dosis de dos onzas mañana y tarde en la leucorrea y blenorragia.

### VINO ESCILÍTICO DE RICHART.

Cebolla albarrana. . . . .	3 j
Corteza de naranja. . . . .	} 3 ij
Cálamo aromático. . . . .	
Vino blanco. . . . .	3 xxiv

Póngase en digestion por espacio de tres dias; añádase . . . . .

Ogimiel escilítico. . . . .	3 ij
-----------------------------	------

Se da este vino en dosis de tres ó cuatro cucharadas por dia en la hidropesia.

### VINO AMARGO Y DIURETICO

*de M. Corvisart.*

Quina en polvo. . . . .	3 j
Cortezas de Winter. . . . .	} 3 ij
— de limon. . . . .	
Raiz de vencetosigo. . . . .	} 3 ij
— de angélica. . . . .	
Cebolla albarrana seca. . . . .	
Hojas secas de agenjo. . . . .	} 3 ij
— de torongil. . . . .	
Bayas de enebro. . . . .	} 3 ij
Almáciga. . . . .	
Vino blanco. . . . .	3 jv
Alcool á 36.º . . . . .	3 ij

Todo machacado póngase en una botella, hágase digerir en el baño de arena á una temperatura suave durante veinte y cuatro horas agitando la botella de tiempo en tiempo.

po. Cuélese, exprímase y fíltrese con un papel de estraza. Divídase el licor en cuatro cuartillos bien tapados.

La dosis es de cuatro cucharadas por día, una antes de cada comida.

### VINO ANTI-APOPLECTICO.

Raíces de rábano rusticano. . . . . 3 j ß

— de jalapa. . . . . 3 jv

Canela. . . . . 3 ij

Nitrato de potasa. . . . . 3 ß

Ruibarbo. . . . . 3 ij

Vino blanco. . . . . 16 ij ß

Se pone en digestion fria durante cuatro días, fíltrese y añádase

Espíritu aromático oleoso de  
Silvio. . . . . 3 ij

La dosis es de tres á cuatro onzas por la mañana en ayunas.

### VINO AMARGO Y DIURETICO

*de la Caridad.*

Lirios de Florencia. . . . . 3vj

Raiz de éoula campana. . . . . }

Cebolla albarrana. . . . . } 3 ij

Marrubio. . . . . 3 j

Sen mondado. . . . . 3 j ß

Aparico blanco. . . . . 3 ij

Gengibre. . . . . 3 ij

Tartrito acídulo de potasa. . . . . 3 ij

Vino blanco. . . . . 16 ij

Tintura de genciana. . . . . 3 ij

F. S. L. . . . .

Se da en dosis de una á dos onzas mañana y tarde.

### VINO DEL DR. FORDYCE.

Quina en polvos. . . . . 3 ij

Clavos. . . . . 3 ß

Se pone en infusion en una pinta de vino generoso durante dos dias, despues se decanta. Echese sobre los polvos una libra de agua hirviendo, déjase en maceracion por espacio de doce horas. Fíltrese, mézclese esta infusion con el vino.

Se dan cuatro cucharadas por dia á los sujetos atacados de blenorragia cuando haya pasado á crónica.

### VINO DE RUIBARBO COMPUESTO.

Ruibarbo en polvos. . . . . 3 ij

Canela blanca. . . . . 3 j

Alcool. . . . . 3 ij

Vino de España. . . . . 16 j

Póngase en maceracion por espacio de siete dias, y fíltrese.

Se da en las diarreas y en la debilidad de estómago; la dosis es de una á dos onzas.

### VINO ANTI-ICTERICO

*ó contra la ictericia.*

Vino blanco generoso. . . . . 16

Naranjas agrias. . . . . n.º 2

Azafran. . . . . 3 j



El enfermo toma cuatro cucharadas de este vino por la mañana en ayunas, y otras tantas una hora antes de comer hacia á la fin de la ictericia.

VINO DIURETICO INGLES.

- |  |          |
|--|----------|
| Raiz de zedoaria. . . . .                  | 3 ij     |
| Cachos secos de cebolla albarrana. . . . . | } aa 3 j |
| Ruibarbo en polvo. . . . .                 |          |
| Bayas de enebro pulverizadas. . . . .      |          |
| Canela en polvo. . . . .                   | 3 iij    |
| Carbonato de potasa. . . . .               | 3 j ß    |

Póngase en infusion en una pinta de vino blanco viejo. Fíltrese.  
Se da en la hidropesia en dosis de tres ó cuatro vasos por dia.

VINO DE GUAYACO ELEBORADO  
*del Dr. Lewis.*

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Palo santo. . . . .                  | } aa 3 ij |
| Raiz de eleboro negro. . . . .       |           |
| Simiente de cardamomo menor. . . . . | } aa 3 j  |
| Cortezas secas de naranjas. . . . .  |           |
| Vino blanco. . . . .                 | ß jv      |

Se da en infusion durante una semana y aun mas, despues se cuela el vino.  
Este vino estimulante y deobstruente se usa contra la hidropesia y reumatismo. Se toma por la tarde y en cortas dosis.

\*\*\*\*\*

VINAGRE COLCHICO DE REUSS.

Raiz reciente de colchico reco-  
gida en otoño y dividida en  
rodajas. . . . . 3 j  
Vinagre de buena calidad. . . . 3 xij

Se pone en maceracion por espacio de cua-  
tro días, exprímase ligeramente la raiz, y  
añádase al licor

Alcool. . . . . 5vj

Filtrese y guárdese este vinagre en un  
frasco.

Se da este remedio á la dosis de una drac-  
ma hasta una onza en la hidropesia acitis. A  
veces se mezcla con el láudano, y se adulce-  
ra con un xarabe.

VINAGRE ALCANFORADO DE SPIELMANN.

Alcanfor. . . . . 3 j

Se pulveriza en un almirez de marmol,  
añadiendo veinte gotas de alcool. Tritúrese  
con lo referido dos onzas de azucar; échese  
encima diez onzas de buen vinagre; apítrese  
hasta que el licor quede tan saturado como  
sea posible; filtrese y consérvese este vinagre  
en un frasco tapado con tapon esmerilado.

Se usa este remedio en las calenturas ma-  
lignas, pútridas y en los exantemas. Se da en  
dosis de media onza.


Esteriormente sirve como antiséptico para combatir la gangrena.

## VINAGRE BEZOARDICO DE BERLIN.

Raiz de angélica. . . . .	} āā 3 jv
— de valeriana. . . . .	
— de yerba buena. . . . .	
Flores de manzanilla. . . . .	
Bayas de enebro. . . . .	
— de laurel. . . . .	} āā 3 j
Azafran oriental. . . . .	
Alcanfor. . . . .	
Vinagre blanco. . . . .	℥ jv

Se deja en digestion y despues se cuela el licor.

Se usa este vinagre en las calenturas malignas y nerviosas, en la peste y otras enfermedades contagiosas, y en el escorbut. Se empieza la dosis por una dracma que se da en diferentes veces al dia, y se va aumentando despues segun se juzga conveniente.



## WAKAKA DE LAS INDIAS.

Cacao mondado. . . . .	℥ j R
Azucar. . . . .	℥ jv
Azucar de vainilla. . . . .	℥ vj
Canela. . . . .	℥ j
Achiote. . . . .	℥ j

Háganse polvos S. A.

Estos polvos aromáticos y fortificantes rea-

niman el apetito de los viejos y de los convalecientes. Se echa una cucharada en un potage de arroz ó de fideos, ó en un tazón de leche. Los españoles los toman en dosis de media dracma con una taza de chocolate.



### XABON MERCURIAL DEL DR. CHAUSSIER.

Unguento mercurial duplicado. 3 iij ℞

Solucion ó lexia de sosa cáustica. 3 iij

El unguento mercurial se mete en un almirez de vidrio. Se tritura echando poco á poco la legia de sosa, y se continua á triturar hasta que la mezcla haya tomado una grande tenacidad, entonces se mete en un molde ó caxa de papel fuerte, y con el tiempo adquiere la consistencia que le es propia.

Este xabon sirve para hacer fricciones en las enfermedades venereas, sarnosas y herpéticas.

### XABON ACETICO ETEREO DEL

DR. PELLETIER.

Xabon animal. . . . . 3 j

Eter acético. . . . . 3 j

Se hace disolver el xabon con el eter acético en el calor del baño maría, y se filtra (1).

---

(1) Es muy repugnante sujetar al filtro las disoluciones etéreas: es mas espedito usarlas sin esta circunstancia inútil, ó sacarlas por decantacion. N. T.

Este xabon se usa en fricciones en los dolores reumáticos.



## XARABE PECTORAL DULCIFICANTE

DEL DR. SELLE.

Zumo de regaliz. . . . . 3 j  
 Agua destilada de manzanilla. 16 ij  
 Xarabe de malvavisco. . . . . 3 viij

Se administra este xarabe en las tisis, y cuando la sensibilidad del gástrico está aumentada. Lubrifica las partes y favorece la expectoración.

## XARABE PECTORAL RESOLUTIVO

DEL MISMO.

Goma amoniaco. . . . . } 3 ij  
 Muriato de amoniaco. . . . } 3 ij  
 Ogimiel escilítico. . . . . 3 ij  
 Vino emético. . . . . 3 ij  
 Xarabe pectoral antecedente. . 3 viij

Se administra con provecho este xarabe en las tisis todas las veces que la expectoración se vuelve dificultosa, la calentura fuerte y las cámaras demasiado sueltas. Su dosis es una cucharada cada hora.

## XARABE PECTORAL PARA LA TOS

## CONVULSIVA.

Ogimiel escilitico. . . . .	3 j β
Xarabe de ipecacuana. . . .	} aa 3 ij
— de diacodio. . . . .	
— de flores de naranjo. . . .	3 jv

La dosis de este xarabe es una cucharada de hora en hora con una taza de infusion de las cuatro flores pectorales.

## OTRO CITADO POR RIVET.

Quina escogida. . . . .	3 vj 3 ij
Cogollos de centaurea menor. . . .	3 j 3 jv β
Sen de la Palta. . . . .	} aa 3 jx 3 iij
Raiz de regaliz. . . . .	
Simiente de anis. . . . .	3 v
Flor de sauco. . . . .	3 iij 3 j
Ipecacuana. . . . .	3 v
Estracto gomoso de opio. . . .	3 jv β
Azucar blanco. . . . .	lb viij

Agua comun, q. s.

Se hace una infusion prolongada de todas estas sustancias exceptuando el opio y el azucar. Cuélese por espresion, disuélvese despues el azucar y el opio, y conclúyese segun arte.

La dosis es desde media cucharadita de café hasta una cucharada de las regulares con media taza de infusion de hisopo.

XARABE PECTORAL INGLÉS.

Agua. . . . .	℥ xvj
Dátiles. . . . .	℥ ij
Azofaifas. . . . .	℥ j
Raiz de malvavisco. . . . .	℥ jv
Raiz de regaliz. . . . .	℥ viij
Culantrillo brasileño. . . . .	} aa ℥ jv
Cápsulas de dormideras blancas. . . . .	

Hágase un cocimiento, añádese ocho libras de azúcar, y se hace evaporar hasta la consistencia de xarabe.

XARABE PECTORAL BALSÁMICO  
DE CHARLES.

Ipecacuana machacada. . . . .	℥ ij ℥
Vino tinto de Borgoña. . . . .	℥ ij
Infusion de amapola. . . . .	℥ ij ℥ ij
Extracto de opio. . . . .	℥ xx
Infusion alcohólica de bálsamo tolutano. . . . .	℥ ij
Azúcar majado. . . . .	℥ ij

Se da en dosis de una onza á una y media con una taza de infusion pectoral. Conviene en la tos rebelde, en la tos convulsiva y en los catarros agudos.

XARABE PECTORAL DE BOUVART.

Pasas de Corinto. . . . .	℥ ij
Azúcar. . . . .	℥ ij ℥
Dos boses de buey	
Goma arábiga. . . . .	℥ jv
Agua. . . . .	pintas vj

Se hace hervir todo durante seis horas.  
Se cuele y se evapora hasta la consistencia de xarabe.

Se toman dos cucharadas regulares de este xarabe mañana y tarde, con una taza de agua tibia.

### XARABE DEL DR. DESESSARTS

CONTRA LA TOS DE LOS NIÑOS.

Ipecacuana. . . . . ʒ j  
Sen mondado. . . . . ʒ iij

Se pone en maceracion durante dos horas con 24 onzas de vino blanco; decántese, fíltrese el licor y consérvese separadamente.

Añádase al residuo

Sulfato de magnesia. . . . . ʒ iij  
Cogollos de serpol. . . . . ʒ j  
Flores de amapola. . . . . ʒ jv  
Agua hirviendo. . . . . ℥ vj

Se deja en infusion durante cuatro horas; decántese: fíltrese el licor, al cual se añadirá

Agua de flor de naranjo. . . . . ʒ xxjv  
Azucar blanco. . . . . ℥ xv

Y el vino blanco de la maceracion.

Mézclese y disuélvase en frio.

La dosis es de una á dos onzas.

### XARABE DEL DR. GARDANNE

CONTRA LA TOS.

Ipecacuana machacada. . . . . ʒ v ʒ j  
Vino blanco. . . . . ℥ j



Déjese en infusion durante un cuarto de hora; añádese

Sen. . . . . 3 vj

Continuese la infusion durante dos horas; añádese

Serpol. . . . . 3 vj

Cortezas de naranja agria. . . . 3 v 3 j

Sal vegetal. . . . . 3 jv

Agua hirviente. . . . . 16 jv

Déjese en infusion durante cuatro horas; cuélese y añádese

Xarabe de malvavisco. . . . . 16 ij

Agua de flores de naranjo. . . . 3 xij

Este xarabe se da á los niños en dosis de dos cucharadas de café por dia, la primera una hora antes de almorzar, y la segunda una hora antes de comer.

### XARABE DE MIL PIES.

Raiz de espárrago. . . . .

— de regaliz. . . . .

Pasas. . . . .

Hojas de parietaria. . . . .

— de malva. . . . .

Azucar. . . . .

} āā 3 ij  
3 xij

Hágase xarabe; despues se añade

Zumo de borraja. . . . .

— de buglosa. . . . .

Mil pies. . . . . 3 j 3 jv

Se chafan los mil pies, se deslien con el

zumo y se filtra. Sobre cuatro onzas de zumo añádese

Azucar. . . . . 3 viij

Hágase disolver en el baño maría y mézclese este xarabe con el primero.

Conviene en la tos y en la tos convulsiva de los niños. . . . .

### XARABE PECTORAL DEL DR. MALOET.

Azofaifas. . . . .

Dátiles. . . . . } aa 3 j

Pasas de Corinto. . . . .

Raiz de regaliz. . . . . 5 ij

Culantrillo. . . . . 3 jv

Extracto de opio. . . . . 8 n.º 6

Azucar blanco. . . . . 1b ij

Hágase el xarabe S. L.

Se da en dosis de una onza con una taza de infusion pectoral.

### XARABE DE HIGADO DE AZUFRE.

Sulfureto de potasa. . . . . 3 ij

Agua de hinojo. . . . . 3 viij

Azucar. . . . . 1b j

F. S. L. . . . .

Este xarabe debe contener seis granos de sulfureto de potasa por onza (1).

---

(1) Este xarabe se descompone á poco tiempo de hecho: lo mas científico es mezclar el sulfureto de potasa con el xarabe al tiempo de despacharse en las oficinas. N. T.

Se da en los herpes, enfermedades cutáneas, *croup* (angina traqueal de los niños, catarros y tisis pulmonar.)

La dosis es de media onza á una.

## XARABE DE CUSINIER.

Zarzaparrilla. . . . .	℥ ij
Flores de borraja. . . . .	} āā 3 ij
— de rosas. . . . .	
Sen. . . . .	} āā 3 ij
Anis. . . . .	
Miel. . . . .	℥ jv

El médico manda añadir á este xarabe la cantidad de muriato sobreoxigenado de mercurio que juzga necesario desde tres granos hasta ocho. Se señala el número de granos por el nombre *cuite* coedura; así es que se dice xarabe de la tercera, de la cuarta coedura, para significar que contiene tres ó cuatro granos de sublimado.

## XARABE DEPURATIVO DEL DR. LARREY.

Xarabe de zarzaparrilla. . .	} āā litro i
De cuisinier. . . . .	
Muriato de mercurio corro-	} āā 8 xx
sivo. . . . .	
— de amoniaco. . . . .	
Estracto gomoso de opio. . .	
Licor mineral de Hoffman. . .	5 ij

Este xarabe se da en dosis de una onza por la mañana en ayunas con una taza de coedimiento de zarzaparrilla.

Es útil en los efectos venéreos constitucio-

nales degenerados, en las enfermedades herpéticas y otros efectos cutáneos.

# XARABE CONTRA LA TOS CONVULSIVA POR BACLLAY.

Ipecacuana en polvo. . . . . 3 jx  
Quina en polvo. . . . . 3 vj  
Opio sin depurar. . . . . 3 j

Se trata con s. q. de agua fria para extraer las partes solubles, se hace disolver en el licor filtrado.

Azucar. . . . . ℥ vj

Evapórese despues al calor del baño maría hasta la consistencia de xarabe.

Este xarabe se da desde una cucharada de café hasta una cucharada de las regulares, y se repite muchas veces al dia segun la edad de los niños.

# XARABE VERMIFUGO DE BOULLAY.

Musgo de Córcega bien mondado. . . . . 3 xij

Se hace hervir con suficiente cantidad de agua para espesar el cocimiento, cuélese

Añádese media botella de vino blanco, una clara de huevo, cuatro libras de azucar y una mezcla de

Cochinilla. . . . . ℥ xxxvj  
Alumbre. . . . . ℥ xxvj

Se le hace dar un hervor, se filtra y se cuece hasta la consistencia conveniente.

Se da este xarabe por cucharadas puro ó dilatado en igual volumen de agua.

**XARABE ANTI-ARTRÍTICO  
Y ANTI-HIDRÓPICO.**

Escamonea pulverizada. . . . . ʒ jv  
Azucar en polvo. . . . . ʒ jv  
Buen aguardiente. . . . . ʒ viij

Métase todo en un vaso proporcionado; inflámese el aguardiente y déjese quemar la materia agitándola de tiempo en tiempo.

Cuélese por espresion con un lienzo y se añaden cuatro onzas de xarabe de violas.

La dosis es de una á dos dracmas con seis onzas de agua de peregil.

**XARABE DEPURATIVO AMARGO**

*del Dr. Bouillon de la Grange.*

Raiz de rábano rustico. . . . . ʒ ij  
—seca de genciana. . . . . ʒ j  
Hojas de coclearia. . . . . ʒ iiij  
—de trifolio fibrino. . . . . ʒ ij  
Vino blanco. . . . . ʒ xvj

Se pone en maceracion por algunos dias; entonces se toma

Azucar. . . . . ʒ j ʒ xij  
Vino de arriba. . . . . ʒ j

Se hace disolver á un calor suave.

Se añadirá á cada libra de xarabe una onza de xarabe preparado con el espíritu de coclearia.

Este xarabe depurativo, menos calefaciente que el xarabe anti-escorbútico del codex, se prescribe en los mismos casos y en las mismas dosis.

### XARABE VINOSO CARDIACO

DE WIRTEMBERG.

Canela de Ceilan. . . . .	3 iij
Clavos. . . . .	3 ß
Gengibre. . . . .	3 j
Agua de rosas. . . . .	3 xiiij
Vino generoso de Lunel. . . . .	3 viij
Azucar blanco. . . . .	3 xiiij

Se ponen en infusion las sustancias aromáticas en un matraz con el agua de rosas y el vino blanco durante treinta ó treinta y seis horas; se filtra despues el licor, y con él se hace disolver el azucar al calor del baño maría.

Se da este xarabe en dosis de una á dos onzas en la convalecencia de las enfermedades adinámicas, en la disposicion, en la caquexia, en una palabra, en todos los casos en que se quiere reanimar las fuerzas del sistema digestivo. Se dilata este xarabe con una infusion apropiada.

### XARABE DEPURATIVO DE M. MAJAULT.

Raiz de saponaria. . . . .	3 iv
Bayas de enebro. . . . .	} aa 3 ij
Raiz de alcaparras. . . . .	
— de china. . . . .	
— de aro. . . . .	3 j

Hojas de árnica. . . . .	} aa 3 jv
— de trifolio fibrino. . .	
— de fumaria. . . . .	
Flor de sauco. . . . .	} aa 3 ij
Leño de guayaco. . . . .	
— de sasafras. . . . .	
Vino tinto. . . . .	pintas xij

Hágase hervir y añádese

Azucar blanco. . . . . lb xv

Cuélese y evapórese hasta la consistencia de xarabe.

Cuando el xarabe está hecho se añade media dracma de álcali volatil por pinta.

Se da en dosis de dos dracmas hasta onza y media en las enfermedades escrofulosas, herpéticas, sarnosas y sílíticas.

### XARABE DE BELET.

Nitrato de mercurio perfectamente puro y hecho en frío. 3 j β

Eter nítrico rectificado. . . . 3 β

Xarabe de azúcar blanco. . . . lb j

Se hace disolver el nitrato de mercurio en un almirez de vidrio con la menor cantidad posible de agua, y se mezcla esta solución con el xarabe frío y el eter nítrico, agitándole en la botella en que se ha de conservar.

Esta fórmula es la que M. Bouillon la Grangé publicó en el *boletín de Farmacia*, y es la mas exacta.

Se da este xarabe en dosis de una cucharada por la mañana con medio vaso de agua.

## XARABE DE MERCURIO GOMOSO.

*del Dr. Lagneau.*

Mercurio. . . . . ʒj

Goma arábica. . . . . ʒj

Xarabe de chicorias con ruibarbo q. s.

Tritárese en un almirez de vidrio y cuando el mercurio esté bien dividido y mezclado con las otras sustancias; añádese

Xarabe de chicoria con ruibarbo. ʒjß

## XARABE ANTI-ESCORBÚTICO

*del Dr. Portal.*

Raices de genciana. . . . . ʒjv

—— de granza. . . . . ʒij

Quina. . . . . ʒij

Raiz de rábano rústico. . . . . ʒß

Berros. . . . . } aa q. s.

Coclearia. . . . . }

Muriato sobreoxigenado de  
mercurio. . . . . ʒij

Se hacen hervir las raíces con la quina en dos libras de agua que se reducen á una; se cuela el cocimiento; se añade libra y media de azúcar; se clarifica con dos claras de huevo; se hace cocer esta mezcla hasta la consistencia de xarabe, y se cuela.

Por otra parte se machacan en un almirez las hojas de berros, de coclearia y las raíces de rabano; se exprime esto para obtener seis onzas de zumo que se filtra á frio; se añaden



once onzas de azucar reducido á polvo grosero; se calienta en el baño maria hasta que el azucar está disuelto; se cuela y se añade este xarabe al primero.

Por fin se disuelve el sublimado en la cantidad de cerca de una dracma de alcohol, y se mezcla exactamente con el xarabe.

Se da este xarabe en dosis de una ó dos onzas con una tisana apropiada. Es útil en las enfermedades cutáneas, en los efectos escrofulosos escorbúticos, y en las enfermedades venéreas antiguas.

### XARABE VERMIFUGO Y PURGANTE.

Sen. . . . .	3 viij
Semen contra. . . . .	} añ 3 jv
Coralina de Córcega. . . . .	
Ruibarbo. . . . .	3 ij
Cortezas de naranja. . . . .	3 j
Canela. . . . .	3 j
Azucar. . . . .	℥ xxvj

Este xarabe se da en dosis de onza á onza y media.

### XARABE ANTIASMÁTICO.

Goma amoniaco escogida. . . . 3 ij  
 Vino de Chablis 1.ª calidad. . . 3 viij  
 Despues de haber machacado la goma amoniaco, se disuelve en el vino triturándola en un almirez de marmol. Se cuela con un lienzo. Se pone el vino en el baño maria con una libra de azucar y se calienta hasta la consistencia de xarabe.

Este xarabe se da en dosis de una dracma hasta una onza.

### XARABE DE WILLIS.

Sulfureto de potasa. . . . .	3 ij
Vino de España. . . . .	1b iij
Azucar. . . . .	1b ij

Se pone á digerir durante veinte y cuatro horas el sulfureto de potasa en el vino, despues se filtra, y se hace disolver el azucar. Se evapora el xarabe hasta la consistencia que se requiere.

Se da este xarabe en dosis de una cucharada mañana y tarde en las flegmasias de pecho (1).

### XARABE CALIBEADO Ó ACERADO DE WILLIS.

Sulfato de hierro muy verde. . . . .	3 j
Agua hirviente. . . . .	3 viij

(1) El Dr. Chaussier ha modificado la fórmula de Willis. El piensa con razon que el vino debe descomponer una parte del sulfureto de potasa. Por lo que aconseja preparar este xarabe con el agua segun las proporciones siguientes.

Sulfureto de potasa. . . . .	3 j β
Agua destilada de hisopo. . . . .	3 vj
Azucar blanco machacado. . . . .	3 x

Lo mejor es disolver el sulfureto de potasa en el xarabe de hisopo, segun que ya en otro nota sobre otro xarabe igual hemos advertido. N. T.

Hecha la disolucion y filtrada, se añade

Goma arábiga. . . . . 3 ij

Azucar blanco. . . . . ʒ ij


Hágase un xarabe S. A. (I).

Se emplea como tónico y astringente en la clorosis é hidropesía, en las caquexias y leucorrea.

La dosis es de una á dos onzas.

---

(I) Este xarabe y otros muchos de esta clase no deben tenerse repuestos en las boticas porque se alteran fácilmente: el médico debe prescribirlos extemporaneamente arregiando las dosis de sus componentes. N. T.



MEMORIAL  
FARMACEUTICO.



# MEMORIAL

## FARMACEUTICO

*De los principales medicamentos internos clasificados por el uso que se hace de ellos en las enfermedades mas comunes.*

---

*(Debe leerse lo que se dijo de este memorial en el prefacio).*



### AFONÍA.

#### MEDICAMENTOS Y DOSES.

Eter balsámico tolutano.

Pocion del Dr. Mongenot.

#### AGRIOS DEL ESTÓMAGO.

Magnesia calcinada, *media dracma* en un vaso de agua azucarada ó en una taza de leche.

Píldoras de xabon, 2 á 4 mañana y tarde.

Marfil calcinado, de 12 granos á 2 escrúpulos.

Cuerno de ciervo calcinado, de 12 granos á *media dracma*.

Electuario de magnesia, de *media á dos dracmas*.

Lilium de Paracelso de 10 á 30 gotas en medio vaso de infusion de tilia ó en una taza de té.

Espíritu carminativo de Silvio, de 12 gotas á 2 dos dracmas en un vehículo apropiado.

Polvos de Kent, de 12 granos á media dracma.

Confeccion de jacintos, de 18 granos á una dracma y media.

Fastillas de ojos de cangrejo, de 1 á 4 dracmas.

AMENORREA. (Veáse supresion de la menstruacion).

ANASARCA. (Hidropesia del tegido celular).

### MEDIOS GENERALES.

Escarificaciones.

Cauterios debajo de las dos rodillas.

Eméricos, purgantes, diaforéticos y diuréticos.

### MEDIOS PARTICULARES.

Baños de estufa muy caliente.

Fricciones secas y linimento volatil.

Pediluvios calientes y salados.

Dedalera encarnada, su infusion ó tintura.

Cremor de tártaro soluble.

Espíritu de nitro dulcificado 1 dracma  $\frac{1}{2}$  en una pocion diurética.

Tintura de tabaco, de un escrúpulo á una dracma.

Píldoras de Bacher.

Esencia de trementina, 6 gotas tres veces por día. (Veáse el art. general Hidropesia).



## ANGINA TONSILAR.

## MEDIOS GENERALES.

- Sangijuelas detrás de las orejas.
- Tártaro emético, 1, 2 ó 3 granos.
- Laxantes suaves, sales purgantes.
- Una fuente en la nuca si la inflamacion es considerable.
- Gargarismos ligeramente astringentes y acidulados.

## MEDIOS PARTICULARES.

- (Cuando se haya manifestado el efecto febril).*
- Diaforéticos.
- Suero de leche, agua de cebada.
- Cataplasmas emolientes calientes aplicados al cuello.

## ANGINA MALIGNA.

## MEDIOS GENERALES.

- 1 dracma de quina de dos en dos horas.
- Gárgara antiséptica.
- Ipecacuana en cortas doses unida á los diaforéticos.
- Bebidas vinosas y aciduladas.

## MEDIOS PARTICULARES.

El Dr. Tomas de Salisboury aconseja contra la angina gangrenosa, un cocimiento de pimienta de cayena (dos cucharadas por pinta de agua hirviente): se añade un cuartillo de vinagre. La dosis es dos cucharadas de esta mezcla cada media hora.

ANGINA TRAQUEAL. (*Véase CROUP*).  
 APARATO GÁSTRICO, SABURRAS  
 EN LAS PRIMERAS VIAS.

(Necesidad de purgarse).

- Tártaro stibiado, de 1 á 3 granos como vomitivo.  
 Pulpa de caña fistula, de onza á onza y media.  
 Pulpa de tamarindos, de 2 dracmas á 1 onza (1).  
 Catolicon doble, 2 dracmas á 2 onzas.  
 Electuario diaprun simple, de 3 dracmas á 2 onzas.  
 — diaprun solutivo, de 2 dracmas á una onza.  
 — de psyllium, de 1 á 6 dracmas.  
 Tablillas de citro, de 2 á 6 dracmas.  
 — de diacartaneo, de 3 dracmas á 1 onza.  
 Píldoras antecibum, de 12 granos á una dracma y media.

(Purgante suave).

- angélica *idem*.  
 — panquimagogas, de 10 granos á media dracma.  
 — purgantes de Helvecio *idem*.  
 — mayores de un escrúpulo á una dracma.  
 — menores de 12 granos á media dracma.  
 — acibaradas *idem*.  
 — Hidrogogas de Boncio *idem*.  
 — de Rubio, de 12 granos á 2 escrúpulos.

---

(1) Los tamarindos convienen en los tiempos calientes, cuando al mismo tiempo se quiere purgar y refrescar al enfermo.

Cerveza purgante inglesa, *medio cuartillo dos veces al dia.*

Bizcochos purgantes, *n.º I.*

Aguardiente purgante de Mezaice *1 onza y media (1).*

Pocion laxante de Viena, *de 1 á 5 onzas.*

— de ipecacuana de Haller.

— purgante del Dr. Andry.

Mermelada de Zanetti, *de 2 á 4 cucharaditas de las de tomar café.*

Extracto de colocintidas compuesto, *de 10 granos á media dracma.*

Aguardiente aleman *de 2 dracmas á 2 onzas (2).*

Agua de treves *una pinta.*

Elixir sagrado, *de 1 a diez onzas y media.*

— visceral de Hoffmann, *de 1 á 2 dracmas.*

Xarabes de ramno catártico de flor de pericó, de tabaco, de rosas, purgante compuesto, de achicorias compuesto, magistral astringente, *de 2 dracmas á 2 onzas.*

Polvo cornaquino, *de 12 granos á 2 dracmas (3).*

— bomitivo de Helvecio, *18 granos.*

— de Grimaldi, *40 granos.*

— del conde de Warnike, *de 12 á 24 granos.*

Electuario lenitivo, *de 4 granos á 1 onza y media.*

Se da tambien en lavativas.

---

(1) Este purgante no conviene sino á los sujetos flemáticos.

(2) Este purgante no conviene sino á los sujetos flemáticos.

(3) Es menester no usarle en las inflamaciones.

Sal de Guindre, 6 *dracmas y media*.

Azucar naranjado purgante, de 2 á 3 *dracmas*.

Tisana regia, *un cuartillo*.

Tintura de d'Affy, de 1 á 3 *onzas*.

— sagrada, de 1 á 2 *dracmas*.

Cremor de tártaro soluble, de 1 á 2 *dracmas*.

Píldoras escocesas, de 1 *dracma* á 1 *dracma y media*.

Polvos tónicos é incisivos del Dr. Lassone.

(Véase la fórmula).

Purgante del Dr. Wilson, de 2 á 10 *granos*.

## APOPLEXIA SANGUINEA (1).

### MEDIOS GENERALES.

Sangría de la yugular.

Purgante activo.

Lavativas estimulantes.

(Cuando la apoplegia es causada por indigestion, se administra el emético).

### MEDIOS PARTICULARES.

Vino de Huxham, de 2 á 3 *onzas en lavativas*.

Electuario diacoloquithidos, de 1 *dracma* á 1 *onza*.

*Este es un purgante fuerte.*

Píldoras de Rudius, de 12 *granos* á 12 *escrúpulos*.

*Estas purgan fuertemente.*

Gotas cefálicas de Inglaterra, de 10 *gotas* á *media dracma*.

Agua teriacal, de 1 á 4 *dracmas*.

Agua general, de 2 á 4 *dracmas*.

---

(1) Véase la tabla de los remedios externos.

Elixir de los Jacobinos de Ruan, de media dracma á dos dracmas.

Vino antiapoplético, de 3 á 4 onzas.

Eter acético cantaridado, de 2 á 3 dracmas.

Mistura pectoral de Quarin, á cucharadas cada cuatro horas.

Agua espirituosa de Anhalt, de 2 á 3 dracmas.

## APOPLEGIA SEROSA.

### MEDIOS GENERALES.

Ninguna sangría: á lo menos es menester mucha precaucion y en ciertos casos particulares.

Purgantes dástricos.

Esternutatorios.

Vegigatorio á la cabeza, al dorso ó á las estremidades; sinapismos á la planta de los pies.

(Después del ataque) elixir escefálicos.

Purgantes amargos.

Vino anti-escorbútico.

## ASCITIS (*Hidropea de abdomen*).

### MEDIOS GENERALES.

Dástricos y diuréticos.

Fricciones de aceite al vientre.

De tiempo en tiempo un emético.

### MEDIOS PARTICULARES.

(Véase el art. general *Hidropea*).

## ASMA.

### MEDIOS GENERALES.

Magnesia unida al ruibarbo, 6 granos de cada uno mezclados.

Lavativas emolientes.

Ipecacuana como vomitivo.

Eter opiado.

Goma amoniaco y cebolla albarrana.

Pedilubios calientes.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Opio y carbonato de cal combinados.

Tintura de dedalera, 15 gotas dos veces por día.

Quina é infusiones amargas.

Sulfato de hierro.

Tintura de castoreo y de azafran, de cada una media dracma en un vaso de infusion de valeriana.

Agua de brea, 3 vasos por día, uno por la mañana, otro al medio día y otro por la tarde. Se han de pasar dos horas antes de comer.

Píldoras de asafétida y de goma amoniaco, (partes iguales), de 4 á 5 por día.

Vino escilítico, de 1 á 3 onzas, la mitad por la mañana, y la otra por la tarde.

Vino de émula campana, de 4 dracmas á 3 onzas.

Elixir antiasmático de Boerhaave, de 20 á 30 gotas con una tisana pectoral.

Elixir paregorico ingles, de 50 á 100 gotas.

Extracto de aristoloquia, de 6 granos á media dracma.

Extracto de escabiosa, de 6 á 24 granos.

Extracto de émula campana, de 8 granos á media dracma.

Opimiel escilítico, de 1 dracma á 1 onza.

Pocion de ipecacuana Haller.

Polvos escilíticos de Stahl, de 3 á 5 granos.

- Infusion de hollin de Piderit, de 1 dracma á 1 onza con vino.
- Mistura de Bruner, 1 onza tres veces por dia.
- Agua de Barejes artificial, de 1 á 2 pintas por dia.
- Xarabe de Calabria, de 2 dracmas á 1 onza con una infusion pectoral.
- Pastillas de azufre, de 2 dracmas á 1 onza.
- Píldoras de cinoglosa, de 3 á 6 granos.
- Xarabe de tabaco, de 2 dracmas á 2 onzas. Es purgante.
- Trociscos de cebolla albarrana, de 1 escrúpulo á 3 dracmas.
- Xarabe antiasmático, de 1 dracma á 1 onza.
- Píldoras de Quarin, 5 á 6, y 10 á 12.
- Esencia escílítica de Keup, de 40 á 60 gotas.
- Looch de Gordon.

## BLENORREA.

- Mixtura balsámica de Fuller, una cucharada mañana y tarde.
- Vino del Dr. Fortice, 4 cucharadas por dia.
- Pocion balsámica de Choppart.

## CALAMBRES DE ESTÓMAGO.

- Mosco 10 granos con media dracma de triaca.
- Julepe moscado de Fuller, de 4 á 5 onzas, á cucharadas cada cuarto de hora.
- Polvos de Haly, de media dracma á 1 dracma y media.

## CALENTURA ADINÁMICA.

- Electuario antifebril de Boerhaave, media dracma cada cuatro horas.
- Elixir de salud, 1 onza.
- febrífugo de Whitt, media onza.

Solucion febrifuga de Broussonnet.

Mixtura de mirra de Griffith, 4 cucharadas  
tres veces por dia.

Polvos de Gyms 3j á 3jß.

Vino amargo 2 á 3 onzas.

## CALENTURA INTERMITENTE.

### MEDIOS GENERALES.

(En el primer periodo del frio).

Ipecacuana, 20 á 30 granos ó tártaro anti-  
moniado de potasa, de 1 á 3 granos.

Cordiales diaforéticos, como el vino antimo-  
niado y alcanforado, pocion cordial ó infu-  
sion sudorífica.

(En los principios del acceso).

Eter sulfúrico de 1 escrúpulo á 1 dracma.

Tintura de opio de 30 á 40 gotas. (D. Lind).

(En las intermisiones).

Quina, 2 escrúpulos cada dos ó tres horas. Se  
da en infusion ó cocimiento en polvos ó en  
lavativas en diferentes doses.

Cuasia, 1 dracma en infusion.

Angustura, de 1 dracma á 2 en cocimiento.

Swietenia febrifuga idem.

Sauce caprea idem.

Raiz de ratania, 20 granos en polvo.

Corteza de sauce blanca, 2 dracmas en dos to-  
mas, mediando entre ellas dos horas.

— de castaño de Indias, 2 dracmas infundi-  
das en 4 onzas de agua de cardo santo.

— de ciruelo de santa Lucía (Cerasus pa-  
rus), 1 dracma.

— de fresno, dos dracmas en una taza de  
infusion de ojas de fresno cada cuatro horas.

Serpentaria de Virginia idem.



## PURGANTES MINORATIVOS.

Tamarindos, maná, casia.  
 Xarabe de ramno catártico.  
 Ruibarbo.  
 Sulfatos de sosa, de magnesia, de potasa, de  
 fosfato, de sosa &c.

## PREPARACIONES PARTICULARES.

Vino de quina, *un vaso mañana y tarde.*  
 Febrífugo de S..., *1 á 2 onzas por la mañana.*  
 Elixir febrífugo de Whitt, *media onza.*  
 Antiséptico de Huxham, *de 2 á 4 dracmas,*  
*con una bebida apropiada.*  
 Febrífugo del Dr. Audovard.  
 — del Dr. Marc.  
 Xarabe de quina, *de 2 dracmas á 1 onza y*  
*media.*  
 Solucion de arsénico de potasa, *de 2 á 12*  
*gotas.*  
 (La del Dr. Fontler, la del Dr. Darnvin).  
 Esencia alexifarmaca de Sthal, *20 á 30 gotas.*  
 Mixtura ácida del Dr. Selle, *una taza cada*  
*hora.*  
 Resolutiva del Dr. Selle, *media taza cada hora.*  
 Tintura febrífuga de Clutton, *con una tisana*  
*hasta una agradable acidez.*  
 — de quina compuesta de Huxham, *de 2 á*  
*4 dracmas.*  

Extracto de centaurea	}	de 6 á 12 granos.
menor. . . . .		
— de genciana. . .		
— seco de quina. .		

 Electuario de Zaragatona, *de 1 á 6 dracmas.*  
 (Es purgante).

——antifebril de Boerhaave 3  $\beta$  cada cuatro horas.

Opiata febrifuga de Tissot, 2 dracmas.

——Febrifuga del Dr. E. (*Véase la fórmula*).

Píldoras febrifugas inglesas, 4 por día antes de la accesion.

——eméticas de Boerhaave, de 1 á 2.

——tartáreas de Schrodez, de 4 á 8.

Polvos de Grimaldi, 40 granos.

(Son purgantes).

——febrifugos y purgantes de Helvecio, de 18 granos á media dracma.

Polvos de Boullémer, 44 granos por día durante tres días.

——de James, de 1 dracma á 1 y media.

——febrifugos de Juncker, 1 dracma y media en cuatro tomas.

——corroborantes de Worloff, 42 granos.

## CALENTURA REMITENTE.

### MEDIOS GENERALES.

(En los primeros paroxismos).

Limonada. Agua de tamarindos.

Cremor de tártaro soluble, de 1 á 2 dracmas.

Tártaro emético, de 1 á 3 granos.

(En la intensidad mayor del paroxismo).

Efusiones de agua fría, aspersiones de agua y vinagre.

(Durante la remision).

La quina en cocimiento acidulado con el ácido sulfúrico debilitado, ó la quina en polvos, en dosis de 1 onza y media dividida en tomas de dos dracmas por intervalos determinados.

## MEDIOS PARTICULARES.

Solucion arsenical de Fowler, 8 ó 12 gotas.

## CALENTURAS CONTINUAS.

## MEDIOS GENERALES.

- Cocimiento de cebada ó de linaza.
- Limonada ó suero de leche.
- Infusion ligera de yerba buena ó de manzanilla.
- Ipecacuana, 20 á 30 granos.
- Mercurio dulce mezclado con algunos granos de jalapa.
- Infusion de tamarindos nitrada.
- Diaforéticos, tales como el vino antimonialdo, los polvos de James, &c.
- Antiespasmódicos, como eter, alcanfor, mesco, amoniaco, ya sean solos ó mezclados.
- Acido nítrico alcoholizado.
- Quina en infusion ligeramente acidulada.
- Cuasia, 2 dracmas en infusion con doce onzas de agua.
- (Si existe una accion purgante, se añade á la infusion de quina 6 gotas de tintura de opio, ó media dracma de tintura de catecu).

## CALENTURA INFLAMATORIA.

## MEDIOS GENERALES.

- Despues de la sangria se aplican compresas de agua fria ó de eter á la frente.
- Decalera purpurea, 2 dracmas en infusion.
- (Si hay nauseas) pocion emética.
- (Si hay constipacion) laxantes suaves.
- Limonada cocida, nitrada, ó 2 dracmas de cremor de tártaro soluble.

(Medios externos segun el estado del enfermo).

Los amargos y la quina segun la convalecencia.

#### PREPARACIONES PARTICULARES.

Bebida antiilogística de Stoll, 1 taza por hora.  
 Mistura diaforética de Selle, media taza cada hora.

#### CALENTURA NERVIOSA. (*Tiphus ligero*).

##### MEDIOS GENERALES.

(Estos varían segun el aspecto que presenta la enfermedad).

(Si hay náuseas) se facilita el vómito.

(Si hay constipación) laxantes suaves.

Etusiones de agua fría durante el paroxismo.

(Si se declara la diarrea) se da el catecú, la gomakino, el agua de canela y la tintura de opio.

El vino de quina hácia al fin de la enfermedad.

Los antiespasmódicos, como el mosco, amoníaco, alcanfor y opio.

#### CALENTURA PUTRIDA Y MALIGNA.

(*Tiphus conijmado*).

##### MEDIOS GENERALES.

Ipecacuana, 15 granos con 1 grano de tártaro emético y una infusión de manzanilla.

Purgante suave. — Calomelanos.

Abluciones de agua fría, seguidas de un vaso de vino caliente.

Recien. — Infusión de colombo 1 onza y media; tintura de opio 5 gotas, ácido muriático 12 gotas.

La quina, en dosis de media onza, en cocimiento con tres dracmas de serpentaria de virginia, y una libra y media de agua. Se añade una onza de tintura de canela.

Aguas acidulas gaseosas.

Angustura, de 1 dracma á 2 en cocimiento.

Genciana *idem*.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Espíritu volátil y aromático de Silvio, de 6 á 30 gotas.

Solucion febrifuga de Broussonnet.

Agua diurética alcanforada de Fuller, de 1 á 2 dracmas.

Esencia elixifarmaca de Stahl, de 20 á 30 gotas.

Elizir antiséptico de Huxham, de media dracma á una.

— de Mitié, *idem*.

Vino amargo, de 2 á 3 onzas.

— febrifugo de S.... de 3 á 6 onzas.

Bálsamo de Vinceguerre, de 8 á 10 onzas en un terro de azucar.

Orvietanum prestancius, de 12 granos á 1 dracma.

Polvos de Werlos, 2 escrúpulos.

#### CALENTURA ESCARLATINA.

##### MEDIOS GENERALES.

Tisana diluente acidulada.

Ipecacuana, 24 á 30 granos.

Laxante. — Calomelanos, 5 granos.

Ruibarbo 12 granos.

Lavativas purgantes.

Dialforéticos suaves.

## MEDIOS PARTICULARES.

Cocimiento de quina (en la escarlatina anginosa).

Poción amoniaca alcanforada.

## CALENTURA MILIAR.

## MEDIOS GENERALES.

Lavativas laxantes.

Minorativos.

Vino de quina en cortas doses.

Mixtura alcanforada; (*Pharm. Lond.*).

## CALENTURA URTICATA.

Emético.

Cremor de tártaro soluble, de 1 onza á 1 y media.

## CÁLCULOS BILIARES.

Mistura de With, de 12 á 20 gotas con azúcar.

## CÁLCULOS DE LA VEGIGA.

Cerbeza diurética inglesa, de 2 á 3 vasos.

## CANCER.

Píldoras de acónito del Dr. Daublé 1 onza por la mañana y otra por la tarde.

Píldoras mercuriales, 2 por día.

Extracto de cicuta de 1 á 4 granos. Se aumenta poco á poco la dosis hasta 12 y aun más.

CAQUEXIA. (Véase marasmo).

## CARDIALGIA.

Tiatura de guayaco de Londres, de 1 dracma á media onza.

CATARRO. (*Véase romadizo*).

## MEDIOS GENERALES.

Agua de cebada acidulada con el xarabe de limon (si existe diátesis inflamatoria); sangría y sanguijuelas.

Antimoniales y diaforéticos en cortas doses.

Bebidas mucilaginosas aciduladas.

Espíritu de Minderero, *media onza tomada en dos horas*.

Ogimiel escilítico, *media onza*.

Looc azucarado con el xarabe tolutano.

Emulsion con la goma amoniaco, opio &c.

## MEDIOS PARTICULARES.

Tintura de dedalera, *30 gotas*.

Mirra, cebolla albarrana y goma amoniaco combinadas.

## CATARRO LARINGEO.

Eter balsámico tolutano del Dr. Moreau.

CATARRO CRÓNICO. (*Véase tabla de las enfermedades*).

Elixir pectoral ingles, de *media dracma á 2*, con una taza de infusion de las cuat. o flores.

Elixir paregórico, de *50 á 100 gotas*.

Looc de Gordon á cucharadas.

Mermelada de Tronchin, *cucharada de hora en hora*.

Píldoras del Dr. J. J. Lerous, de *3 á 4 por dia*.

Píldoras anticatarrales del Dr. Pariset, *2 mañana y tarde*.

Píldoras anticatarrales del Dr. Petit.

Polvos incisivos del Dr. Mongenot. (*Véase su uso en este volumen*).

Mistura anticatarral rusa, *una cucharada de las de tomar café.*

Polvos anticatarrales de Viena, de 1 á 2 dracmas.

Polvos de Wedelio, de 1 á 2 escrúpulos.

Xarabe pectoral ingles, de 1 á 2 onzas *con una infusion apropiada.*

Tisana de Bucham.

CATARRO DE LA VEGIGA. (*Véase mal de piedra*).

CEFALALGIA. JAQUECA, DOLOR DE CABEZA.  
(*Véase remedios externos*).

COLORIS. COLOR DE OPILADA.

MEDIOS GENERALES.

Emético.

Infusion de genciana y de cuasia.

Preparaciones marciales.

Aguas minerales ferruginosas.

Purgantes dástricos, *en cortas doses.*

MEDIOS PARTICULARES.

Tintura de quina, de muriato, de hierro y de cantaridas, *mezcladas en proporciones correspondientes.*

Limaduras de hierro porfirisadas, de 2 á 24 granos.

*Se disuelven las limaduras con vino generoso, ó con una tisana de especies amargas.*

Amarra de Marte, ó etiope marcial, de 2 á 24 granos.

Fáculas de écula campana, *media onza.*

Vino a erado, de 2 dracmas á 2 onzas. *Se da en una infusion apropiada.*



- Tintura de agénjo, 10 gotas ó 1 dracma con un vaso de tisana.
- Tablillas marciales del Codex, 2 por día.
- Píldoras tónicas de Stoll, de 4 á 6.
- Píldoras tartáreas de Schroder, de 1 escrúpulo á dracma y media.
- Píldoras aceradas, de 6 granos á media dracma.
- Píldoras marciales de Kempf, de 12 á 36 granos por día.
- Confeccion de ruda, de 18 granos á 2 dracmas.
- Elixir americano, 3 cucharaditas de tomar café por día.

### CÓLICO DE ESTÓMAGO.

- Gotas amargas, de 2 á 8 con una infusion de plantas estomáticas.
- Elixir teriacal, de 10 á 30 gotas.
- Polvos de coral de Helvecio, de 18 granos á 2 escrúpulos.
- Teriaca de Venecia, de 18 granos á 2 dracmas.
- Orvietano, de 18 granos á 1 dracma.
- Diascordio, de 18 granos á 2 dracmas.
- Mitridato, de 12 granos á 1 dracma.
- Philonium romanum, de media dracma á 2.

### CÓLICO BILIOSO.

#### MEDIOS GENERALLS.

- Infusion de manzanilla.
- Lavativas laxantes.
- Purgante con xarabe de ramno catártico, jalapa y calomelanos.
- Pocion calmante con un grano de opio.
- Franelas calientes y empapadas con un cocimiento emoliente, aplicadas sobre el ombligo.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Tintura anodina de coral de Helvecio, *de 20 gotas á media dracma.*  
 Agua general, *de 2 á 4 dracmas.*  
 Miel mercurial, *de 1 á 4 onzas en lavativa.*  
 Xarabe de amapolas, *de 2 dracmas á 1 onza y media.*  
 Triaca diatesaron, *de 2 granos á 2 dracmas.*  
 Mitridacio, *de 12 granos á 2 dracmas.*  
 Philonium romanum.  
 Bálsamo tranquilo, *de media onza á 2 en lavativas.*  
 Bálsamo de vida de Hoffman, *de 10 gotas á media dracma.*  
 Láudano de Sydenham, *de 10 gotas á 1 dracma.*  
 Opio de Rousseau, *de 2 á 10 gotas.*

## CÓLICO VENTOSO.

## MEDIOS GENERALES.

- Agua de yerba buena y de azahar.  
 Agua de anís.  
 Xarabe diacodion.  
 Lavativa carminativa.  
 Fomentaciones calientes al abdomen.  
 Tintura de jalapa y de sen compuestas.

## CÓLICO DE LOS PINTORES.

- Remedio de la caridad.

## CÓLICO HISTÉRICO.

## MEDIOS GENERALES.

- Pecion antiespasmódica con la tintura de castor, eter sulfúrico, tintura de opio, agua de azahar, aceite animal de Dippel.

## MEDIOS PARTICULARES.

Aceite de ricino, de media onza á 2 onzas,  
con una onza de xarabe de limon.

Eter sulfúrico, de 10 á 30 gotas.

Tintura de Bestucheff, de 15 á 40 gotas.

## CÓLICO MISERERE.

(Cólera morbo).

## MEDIOS GENERALES.

Agua de cebada ó de linaza.

Agua panada ó de avena.

Caldo de pollo.

Fomentaciones al estómago con un cocimiento de adormideras y una cuarta parte de aguardiente alcanforado.

Píldoras de opio, medio grano cada hora.

Lavativas opiadas.

Baño caliente.

(Hacia el fin) vino de quina, polvos de colombo, ruibarbo.

## CÓLICO NEFRITICO.

Espíritu de nitro dulcificado, una cucharada de las de café, con la mitad de landano, y un vaso de tisana de parietaria.

Agua imperial, de 2 á 4 dracmas.

Licor antinefrítico de Adams, 2 dracmas mañana y tarde.

Bálsamo de pareyra brava, de media dracma á 2.

Xarabe de altea compuesto, de 2 dracmas á 1 onza y media.

Agua de yerba buena compuesta, de 1 á 4 dracmas en un vaso de tisana.

Poción del Dr. Norford.

Bálsamo de Tioraventi, de 5 á 10 gotas con el té.

Espíritu de nitro dulcificado, de 20 á 60 gotas.

Poción capivi, á cucharadas de media en media hora con una tisana diurética.

### CONSTIPACION.

Electuario lenitivo, de 1 á 3 dracmas.

Mermelada de Tronchin, una cucharada cada tarde.

Píldoras laxantes de Buchan, de 3 á 9 parte por la mañana, parte por la tarde.

### CONVULSIONES DE LOS NIÑOS.

Magnesia calcinada, de 8 á 10 granos. Se mezcla con igual cantidad de ruibarbo en una tisana antiespasmódica.

Tintura de Hellin, de 12 á 15 gotas.

Polvos de la princesa de Carignan, de 18 granos á 1 dracma.

Trizca diatesaron, de 10 á 20 granos.

### CONVULSION DE LOS ADULTOS.

Estracto de estramonio, de medio grano á 2 granos dos veces al día.

Estracto de beleño, de 1 á 3 granos.

Polvos antiespasmódicos, de 1 escrúpulo á 1 dracma.

Polvos de guteta, de 2 granos á 1 dracma.

———derados de Zeil, de 6 granos á 1 escrúpulo.

———de Tuquin, 12 granos.

CROUP. (*Angina traqueal*).

## MEDIOS GENERALES.

Sangría, emético.

Vesigatorio al pecho ó á la parte anterior del cuello. *O bien*, fricciones ligeras al cuello con un linimento alcanforado, al que se añaden algunas gotas de tintura de cauteridas.

Minorativos, para mantener el vientre libre.

## MEDIOS PARTICULARES.

Tintura de dedalera purpúrea, 5 gotas cada cuatro horas.

Fricciones sobre el pecho, con una mezcla de eter y de tintura de opio por partes iguales.

Tintura de cebolla alhorrana, media dracma.

Vino de ipecacuana, media onza.

Julepe cáceos, de 4 á 5 onzas.

Mixtura para el croup, a cucharadas.

Sulfureto de potasa, de 1 á 6 granos desleídos con el xarabe de ipecacuana.

Muriato de mercurio dulce, 1 grano en vino, con suficiente cantidad de miga de pan y azucar. Se reitera este remedio cada 4 ó 5 horas.

Xarabe de hígado de azutre, de media á 1 onza.

Pastillas de M. Chaussier, de 4 á 6 por día.

## TOS SOFOCANTE.

Mixtura para el croup.

Pocion de Quarín, 1 onza cada tres horas.

## TOS CONVULSIVA.

Polvos de Quarín, media dracma cada cuatro horas.

Elixir paregórico, *de 50 á 100 gotas.*

### DANZA DE S. VITO.

Píldoras del Dr. Merat, *de 2 á 4 por día.*

### DESMAYO (1).

Agua de la reina de Hungría, general, de colonia, torongil, vulnerarias, de esmeraldas, *de 2 dracmas á una onza, dilatadas con un poco de agua. Con dichas aguas se fricciona la frente y las sienes del enfermo, sin añadirles agua.*

### DIABETES.

#### MEDIOS GENERALES.

Antimoniales unidos al opio.  
Vegigatorios á la region renal.  
Gomo quino catecú, sulfato de zinque.  
Acidos sulfúrico y nítrico.  
Quina, mirra y hierro mezclados.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Dieta animal pura con exclusion de todo vegetal.  
Píldoras xabonesas aloéticas.  
Sulfureto de amoniaco, *de 3 á 4 gotas, cuatro veces por día, en un vehiculo apropiado.*  
Limonada nítrica.

### DIARREA.

#### MEDIOS GENERALES.

Ipecacuana en corta dosis.

---

(1) Véase la tabla de los remedios externos.

Ruibarbo y canela mezclados.

Polvos de James.

Cocimiento de cebada, de arroz, de malva, de cuerno de ciervo.

Agua de goma arábica, agua panada.

(Si existen agrios ó ácidos en el estómago), los absorbentes unidos á los opiados.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Sulfato de sosa y de magnesia. . . . . } Cuando la enfermedad proviene de una acrimonia tenaz.

Fosfato de sosa. . . .

Aceite de ricino y tintura de opio. . . } Cuando ha habido ingestión de sustancia venenosa.

Quina, conserva de mosqueta silvestre.

Preparaciones marciales. . . . .

Catecú gomo-quino.

Agua de cal, leche y goma arábica. . . .

Marfil calcinado, de 12 granos á 2 escrúpulos.

Cuerno de ciervo calcinado. *idem*.

Tintura de coral anodina de Helvecio, de 20

gotas á media dracma.

Arrope de saúco, de 1 escrúpulo á 1 dracma.

Estracto de miler rama, de 12 á 48 granos.

Miel de ninfea, de 1 á 4 onzas, miel rosada, de 1 dracma á 1 onza en una lavativa.

Xarabe de ninfea, de 2 dracmas á onza y media.

Xarabe de rosas secas, *id. m.*

Gelatina de cuerno de ciervo, 2, 4 y 6 onzas.

Conserva de romas y de mosqueta silvestre, de 2 dracmas á 1 onza.

Polvos de Kent, de 12 granos á media dracma.

## DEBILIDAD DE ESTÓMAGO.

*Postracion de fuerzas. Atonia.*

Vino de ruibarbo compuesto, de 1 á 2 onzas.

—— amargo, *idem.*—— Estomático de Plench, *idem.*

Wakaka de los indios, de 1 dracma á 1 onza.

Vino de quina, de 3 á 4 onzas á la hora de comer y lo mismo á la tarde.

—— de agénjo, de 2 á 6 onzas á la hora de comer é igual cantidad por la tarde.

—— de énula campana, de 4 dracmas á 4 onzas.

Bálsamo de vida de Leliebre, de 1 á 3 cucharadas mediando una hora entre toma y toma.

Esencia de Wedelius, de media dracma á 1.

Elixir de vida de Metiolo, de 1 á 4 dracmas.

—— visceral de Hoffman, de 1 á dos dracmas.

—— de Stoughton, de 10 gotas á 1 dracma con una taza de té.

Estracto de agénjo, de 12 granos á 1 dracma.

—— de centaurea menor, de 12 granos á media dracma.

Lilium de Paracelso, de 10 á 30 gotas con un vehiculo estomático.

Estracto de genciana, de 12 granos á media dracma.

—— de ruibarbo, *idem.*

—— de euebro, de 24 granos á 2 dracmas.

—— de acibar, de 2 á 4 granos.

Agua teriacal, de 1 á 4 dracmas.

Xarabe de agénjo, de 2 dracmas á una onza y media.

—— de quina, *idem.*

—— de kermes, de 2 dracmas á 1 onza



- de yerba buena, de 2 dracmas á 1 onza y media.
- Elixir de Garus, *idem*.
- Tintura estomática de Moscati, de 4 á 6 dracmas dos veces al día.
- estomática amarga de Edimburgo, de 4 á 6 dracmas.
- de cardamomo compuesta (Lond.), de 2 á 4 dracmas.
- Agua espirituosa de Anhalt, de 2 á 3 dracmas.
- Pólvos de diarrhodon, de 12 granos á 1 dracma.
- de tres sándalos, *idem*.
- letificantes, *idem*.
- de ambar compuestos, *idem*.
- de aro de Berchmann.
- Confeccion de jacintos, de 18 granos á 1 dracma y media.
- alquermes, de 1 escrúpulo á 1 dracma.
- Triaca, de 18 granos á dos dracmas.
- Orvietan, *idem*.
- Mitridacio, *idem*.
- Diascordio, de 1 escrúpulo á 1 dracma y media.
- Filonio romano, de 36 granos á 1 dracma.
- Opiata de Salomon, de 1 escrúpulo á 1 dracma.
- Electuario de hiera piera, de 1 á 6 dracmas.
- Pastillas de vainilla, de 1 dracma á 1 onza en el curso del día.
- de clavos, de 1 á 4 dracmas.
- de canela, *idem*.
- de catecu, *idem*.
- mogolas.
- de ruibarbo.
- Píldoras balsámicas de Stahl, de 2 á 12 granos.
- de Becher, *idem*.
- calibeadas, de 6 granos á 1 escrúpulo.

Polvos de antimonio marcial de Keup, de 5 á 6 granos.

Tintura de ruibarbo inglesa, de media onza á 1.

Trociscos de cipheos, de 12 granos á 1 dracma.

Bal-samo sajón, 15 gotas sobre un pedazo de azucar.

Cerveza estomática inglesa, 1 vaso mañana y tarde.

Cerveza de quina de mulis, 1 tinta por día.

Bolos fortificantes de Desbois, 6 por día.

Confeccion japónica, de 1 á 2 escrípulos.

Elixir de Mitie, de 2 á 4 dracmas.

Alkermes de los italianos, de 2 á 3 dracmas.

Opiata estomática de Helvecio, de 1 escrípulo á 1 dracma.

Telvos de Haly, de media dracma á 1 y media.

— corroborante de Werlhoff, 42 granos.

Tintura nervinotónica de Berlin, de 1 á 2 dracmas.

Bolo digestivo de Smith.

Agua de magnanimidad, de 1 á 2 dracmas.

Elixir sagrado, de 1 onza á 1 y media.

Polvo diaromaton, de 5 á 20 granos.

Tintura de ruibarbo de Spielman, media onza con un scrúpulo apropiado.

Bolo estomático de Parmentier.

Tintura de malate de hierro, de 1 escrípulo á 1 dracma.

Píldoras del Dr. Huhn, 1 á 2.

Tintura sagrada, 1 cucharada en un vaso de agua azucarada. (Véase la tabla de las enfermedades).

## DEBILIDAD DE LOS ÓRGANOS

### DE LA GENERACION.

Pastillas de guinsen, 4 ó 5 á una hora de distancia.

Wakaka de los indios, de 4 dracmas á 1 onza.

## EFECTOS LACTEOS.

## MEDIOS GENERALES.

Minorativos y sudoríficos.

## MEDIOS PARTICULARES.

Espíritu de Minderero, *media dragma.*  
Elixir de Courcelles, de 1 á 2 dracmas.  
Remedio de Weiss.

EFECTOS HISTÉRICOS. (*Histérico*).

## MEDIOS GENERALES.

Infusion de valeriana, 2 á 4 dracmas *for  
zinta.*  
Lavativas laxantes con adicion asafétida ó cas-  
toreo.  
Pocion eterea con aceite de succino.  
Tintura amoniaca de valeriana.  
Aguas minerales tónicas.  
Eter combinado con el mosco, opio y alcanfor.

## MEDIOS PARTICULARES.

Píldoras marciales de Sidenham, 2 *escrúpulos  
for dia.*  
Polvos de tunquin, de 12 á 24 granos *for dia.*  
Píldoras antihistéricas del Dr. Selie, de 5 á 8.  
Pocion emenagoga de Desbois.

## EFECTOS NERVIOSOS.

(Véase *espasmos, vapores*).

## ENFERMEDADES DE LA PIEL.

(Véase *herpes, sarna, tina &c.*)

## ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS.

Agua de Quercetan, 1 onza á 2.

Esencia dulce de Halles, 20 gotas con una *bebida diuretica*.

Legia de Saunder, 3 dracmas por dia.

Licor antinefrítico del Dr. Adams, 2 dracmas: mañana y tarde. (Véase cálculos de la *vesiga*).

Enfermedades de nervios. (Véase vapores, espasmos, convulsiones).

### ENVINENAMIENTO CAUSADO

#### POR LOS ÓXIDES METÁLICOS.

Tártaro emético, 2 á 3 granos.

Ipecacuana, de 24 á 48 granos.

Vinagre esilítico, de 3 á 4 cucharadas.

Carbonato de cosa de potasa, 1 dracma con una *pinta de agua*.

Sulfureto de potasa, 6 granos con un vaso de *agua ó en píldoras*.

Sulfureto de hierro, de 10 á 12 granos.

Tinta, 1 cucharada con una *pinta de agua*.

#### POR LAS SALES METÁLICAS.

Amoniaco líquido, 30 gotas en un vaso de *bebida*.

Agua de cal, de 6 á 16 onzas.

Quina, de 1 á 4 dracmas.

Balsamo de azufre, de 1 á 2 dracmas.

Trementina, de 1 escrúpulo á 1 dracma.

#### POR EL PLOMO.

Remedio de la caridad.

#### POR LOS ÁCIDOS.

Agua de xabon, de 1 cuartillo á 1 *pinta*.

Magnesia calcinada, de 1 escrúpulo á 1 dracma.

Pocion del Dr. Andry.

Triaca, de 1 á 2 dracmas.

Xarabe de diacodion, de 4 dracmas á 1 onza.

### POR EL OPIO.

Limonada vegetal y mineral, de 1 cuartillo á 1 pinta.

Eter, de 1 escrúpulo á 1 dracma.

### POR LOS ONGOS.

El tratamiento indicado. (*Véase la tabla de la fórmula*).

### EPILEPSIA.

#### MEDIOS GENERALES.

La epilepsia puede ser causada por la dentición, por la supresion de una evacuacion, la obstruccion de los intestinos, por la existencia de un tumor, y por la lesion oculta de una porcion de nervios.

El tratamiento varia segun la causa.

(Cuando hay plethora) sangrias locales, fuentes.

Bedalera, á la dosis de 1 grano.

Opio y valeriana, 2 granos del primero y 2 dracmas de la segunda.

Mosco y opio.

Eter, aceite de succino, aceite animal de

Dippel.

Arnica montana, belladona y beleño.

Flores de cinque, de 3 á 4 granos en píldoras.

Mosco, 5 á 12 granos en píldoras con el extracto de visco cuetano.

Alcanfor, de 8 á 16 granos.

Castoreos, de 3 á 16 granos.

Asafétida, de 12 granos á 1 escrúpulo.

} (1)

#### MEDIOS PARTICULARES.

Quina.

Hierro amoniacal.

Flores de zínque, 5 granos en píldoras.

Nitrato de plata, 3 granos en 20 píldoras de las que se toman dos por día.

Elixir antiepiléptico.

— de vida de Matiolo, de 1 á 4 dracmas por interno. También se friegan con él las sienes y debajo de la nariz.

Elixir de vitriolo de Minsicht, de 20 á 40 gotas con un vehículo acuoso.

Gotas anodinas inglesas, de 10 gotas á media dracma.

Gotas celálicas de Inglaterra, *idem*.

Estracto de estramonio, de medio á 2 granos.

— de beleño, de 1 á 3 granos.

— de valeriana, de 12 á 48 granos.

Polvos antiespasmódicos, de 1 escrúpulo á 1 dracma.

— de guteta, de 2 granos á 1 dracma según la edad.

— de oro de Zell, de 6 granos á 1 escrúpulo.

— de Tunquin, 12 granos.

Triaca diatesaron, de 12 granos á 2 dracmas.

Electuario diacoloquintidos, de 1 dracma á 1 onza.

---

(1) Sustancias simples que se dan solas ó mezcladas.

- Aceite animal de Dippel, de 5 á 30 gotas mezcladas con eter.
- Alcohol amoniacal, de 20 á 40 gotas con un vehiculo apropiado.
- Eter sulfúrico, nítrico, muriatico, de 10 á 20 gotas con azucar.
- Cerbeza cefálica inglesa, de 4 á 5 vasos por dia.
- Píldoras antiepilépticas inglesas, 1 á la vez.
- del Dr. Merat, 2 á 3 por dia.
- cobrizas de Swediaur, 2 á 3.
- de Quarin, 2 á 4.
- Electuario del Dr. Mead, 1 dracma mañana y tarde.

ERUCTACION. (*Véase flatuosidades*).

- Polvo diaromaton, 5 á 20 granos.
- Elixir fortificante de Selle. } 1 dracma.
- carminativo de Wedelius. }
- Tintura de ruibarbo de Spielman, media onza en un vehiculo apropiado.
- de Bestuchef, 20 á 30 gotas.

## ESCORBUTO.

- Tisana de rábano, de colearia, de berros, desde 1 vaso hasta 1 pinta.
- Cocimiento de cogollos de abeto, 1 pinta por dia.
- Conserva antiescorbútica del Dr. Selle, 2 á 3 dracmas.
- Agua de Beaufort, de 4 dracmas á 1 onza, en un vehiculo apropiado.
- Elixir antiescorbútico del Dr. Selle, 2 cucharadas por dia.
- antiescorbútico de Boerhaave, 1 á 2 dracmas con una tisana.

Pocion antiescorbútica del Dr. Franch, á *cu-  
charadas cada media hora.*

Vino antiescorbútico, 4 á 6 onzas por la ma-  
ñana en ayunas.

Gotas anodinas inglesas, de 10 gotas á media  
dracma.

Cefálicas inglesas, *idem.*

Espíritu volátil y aromático de Silvio, 6 á 30  
gotas.

Tintura de goma laca, de 10 gotas á media  
dracma.

Estracto de berros, de 12 granos á media  
dracma.

— de fumaria, de 24 granos á 1 dracma.

Espíritu de coclearia, de 15 gotas á 1 dracma.

Xarabes de coclearia, de berros, de perifollo,  
y antiescorbútico, de 2 dracmas á 1 onza y  
media.

Conserva de coclearia, de 1 á 6 dracmas.

Píldoras de panacea mercurial, de 6 granos á  
1 escrúpulo.

Xarabe del Dr. Portal, 1 onza.

— depurativo de Majault, 1 á 2 onzas.

Cerbeza antiescorbútica, 2 vasos por día.

Pastillas de énula campana, media onza por  
día.

## ESCRÓFULAS.

### MEDIOS GENERALES.

Baños frios, baños de mar.

Calomelanos combinados con el tártaro de an-  
timonio.

Sulfureto de mercurio, en dosis de 15 granos.

Píldoras de Plainer.

Cocimientos de guayacaco, zarzaparrilla, sa-



safras y de mecereon mezclados (llamados tisana de Lisboa).

Muriato de barite líquido, *de 3 á 12 gotas.*

Estracto de cicuta.

Cocimiento fuerte de hojas de tusilago.

Agua de cal combinada con la quina.

Carbonato de sosa, *de 1 escrúpulo á 1 dracma.*

Colombo, cascarilla, genciana, mezclados con los aromáticos.

Limonada nítrica.

Preparaciones marciales, agua mineral ferruginosa.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Resina de guayaco, *6 granos al dia en tres tomas.*

Estracto de cicuta, *2 granos á 1 y 2 dracmas gradualmente.*

Confeccion amec, *de 1 dracma á 1 onza purgante.*

Píldoras de panacea mercurial, *de 6 granos á 1 escrúpulo.*

— de Beloste, *2 á 3 por dia, 6 á 8 por purgar.*

— de acónito del Dr. Double, *1 mañana y tarde.*

Elisir de Raulin, *1 cucharada antes de comer é igual cantidad por la tarde.*

Polvo antimonial de Huxham, *8 á 10 granos.*

Elisir aurífero de Rattron, *de 6 á 12 gotas.*

— de Peyrilhe, *1 cucharada.*

Xarabe depurante de Majault, *1 á 2 onzas.*

— antiescórbutico, *4 dracmas á 1 onza por dia.*

#### ESPASMOS.

Estracto de azafrañ, *de 4 á 24 granos.*

—de valeriana, de 12 á 48 granos.

Mosco, 1 á 3 granos.

Agua de yerba buena compuesta, de 1 á 4 dracmas.

—general, 2 á 4 dracmas.

Eter sulfúrico, de 12 á 24 gotas sobre un ter-  
ron de azucar.

Polvos antiespasmódicos, de 1 escrúpulo á 1 dracma.

Bolos antiespasmódicos de Buchan, 6 por día.

Píldoras antiespasmódicas de Piderit, 12 á 36 granos por día.

Tintura antiespasmódica de Keup, 48 gotas  
cada media hora.

—tebaica de Bamberg, 16 á 40 gotas.

Julepe moscado de Fuller, 2 á 6 onzas.

Píldoras sténicas de Brown, 1 á 2 por la  
mañana.

Tintura nervinotónica de Berlin, 1 á 2 drac-  
mas.

Polvos de Guteta, 2 granos á 1 dracma y  
media.

—de oro de Zell, 6 granos á 1 escrúpulo.

Estracto de artemisia, 12 granos á media  
dracma.

Aceite volátil de succino, 10 á 12 gotas.

Tintura de Bestuchef, 16 á 40 gotas.

Eter acético acerado de Klaproth, 15 á 40  
gotas.

—Muriático, 10 á 30 gotas.

Polvos antiespasmódicos de Sthal, 30 granos  
mañana y tarde.

—sedativos de Wetzler. (Véase su uso en  
este volumen).

—de tunquin, 12 á 24 granos.

Espíritu de hollín de Reiss, de 20 á 30 gotas.

Agua eterea alcanforada de Planche, á cuan-

*radat con xarabe de flor de naranja.*

## ESPUTO DE SANGRE. (*Hemoptisis*).

### MEDIOS GENERALES.

Bebidas aciduladas y astringentes.  
 Laxantes como tamarindos, fosfato de sosa, sulfato de potasa.  
 Tinturas de kino, catecú y de opio mezcladas.  
 Sulfato de hierro y opio, *de cada cosa 2 granos con 12 granos de conserva de rosas.*  
 Dedalera encarnada, *1 grano con 10 granos de conserva de rosas.*

### MEDIOS PARTICULARES.

Mistura de Quarin, á cucharadas.  
 Píldoras de alumbre de Helvecio, *de 6 á 12.*  
 Conserva de rosas, *3 á 4 onzas por día.*  
 Láudano líquido, *10 á 12 gotas con un vaso de agua de cebada.*  
 Elixir de vitriolo de Minsicht, *10 á 40 gotas con un vehículo apropiado.*  
 Xarabe de consuelda mayor, *2 dracmas á 1 onza y media.*  
 Polvos astringentes, *12 granos á 1 dracma.*  
 Píldoras astringentes, *6 granos á 1 escrúpulo.*  
 Hoekiack, *1 escrúpulo á 1 dracma con una bebida pectoral.*  
 Alumbre teñido de Helvecio, *6 granos á media dracma.*  
 Píldoras de helecho compuestas, *6 granos á media dracma.*  
 Troiscos de Karabe, *12 granos á 1 dracma.*  
 Poción de Jusieu, *en 2 doses.*  
 Polvos de Haly, *de media dracma á 1 y media.*  
 Polvos de kino compuestos, *1 escrúpulo.*

Bálsamo astringente de Richard, *1 á 2 escrúpulos.*

Electuario balsámico y astringente de Bartholin, *5 á 6 cucharadas por día.*

Estracto de catecú, *12 granos á 1 dracma.*

## ESQUINENCIA, ANGINA.

### MAL DE LA GARGANTA.

Pulpa de tamarindos, *2 dracmas á 1 onza.*

Ogimiel simple, *2 dracmas á 1 onza.*

Miel rosada, *1 dracma á 1 onza.*

Xarabe de moras, *2 dracmas á 1 onza.*

——— de vinagre, *2 dracmas á 1 onza.*

Polvos temperantes de Stahl, *12 granos.*

Bebida antiflogística de Stoll, *1 taza cada hora.*

Bolos diaforéticos ingleses, *2 por día.*

## ESTRANGURIA. (Véase *Disuria*.)

## ESTINCION DE LA VOZ. (Véase *Afonia*.)

## FLATUOSIDADES, VIENTOS, ERUCTACIONES.

Eter sulfúrico, *15 á 20 gotas.*

Lindano de Sidenham, *1 escrúpulo á 1 dracma.*

Agua de yerba buena piperita, *4 dracmas á 1 onza.*

Quina, *12 á 18 granos.*

Tintura de rubarbo laxante, *de media á 1 onza.*

Pilleres cardinales de Bachan, *4 ó 5 por la noche al acostarse.*

Cápsula japónica, *36 á 48 cápsulas.*

Tintura de ajeno, *10 gotas á 1 dracma con un vaso de infusion de gale.*

Elixir de propiedad de Paracelso, *6 gotas á media dracma.*

Opiata de Salomon, *I escrúpulo á 2 dracmas.*  
 Electuario de bayas de laurel, *idem.*  
 Esencia de Wedelio, *de media dracma á I.*  
 Tintura de hollin, *de 15 á 30 gotas.*  
 Vino de ruibarbo compuesto, *2 á 3 onzas.*  
 — amargo, *idem.*

Tintura de ruibarbo de Spielman, *media onza.*

FLORES BLANCAS. (V. LEUCORREA.)

FLUSION DE PECHO.

(Véase *perineumonía.*)

FLUJO INMODERADO DE LA MENSTRUACION.

(MENORRAGIA.)

MEDIOS GENERALES.

Laxantes poco irritantes.  
 Limonada nítrica ó agua de tamarindos.  
 Compresas empapadas con agua y vinagre,  
 aplicadas al dorso y á las partes de la ge-  
 neracion.  
 Alumbre, catecú, goma kino, bolo armé-  
 co, sulfato de zinque.  
 Inyecciones astringentes en la vagina.

MEDIOS PARTICULARES.

Dodolera encarnada, *en dosis de I grano.*  
 Opio, *I grano mezclado con 5 de ruibarbo.*  
 Quina amarilla.  
 Anestura.  
 Mirta y óxido de hierro.  
 Aguas minerales ferrugineas.

•FRENESÍ.

(Inflamacion del cerebro y de sus membranas.)

MEDIOS GENERALES.

Despues de la sangria.

Yelo y agua con vinagre á la cabeza.

Purgante energético.

Pediluvios calientes. Rubefacientes y sínapsismos.

Bebidas frías y aciduladas. ;

Lavativas laxantes.

#### MEDIOS PARTICULARES.

(*En el frenesí sintomático.*)

Bolo diaforético.

Estracto ó polvos de dedalera encarnada, *de*  
24 granos á media dracma.

#### GASTRITIS.

(*Véase inflamacion del estómago.*)

Golpes y caídas (1).

Especies vulnerarias, *I fulgarada en infusion.*  
Aguas, vulneraria, de esmeraldas, general,  
de tarongil, de Colonia, 2 á 4 dracmas con  
*la infusion referida.*

Se hacen fricciones con estas aguas espirituosas á la parte dañada, á las sienes y frente. Se respiran con fuerza.

#### GONORREA VIRULENTA.

##### MEDIOS GENERALES.

Agua de cebada ó de linaza. Solucion de la goma arábica con la leche. Cocimiento de la raíz de malvavisco.

Laxantes suaves.

Lavativas emolientes con la adicion de una cataplasma de adormideras.

Baños tibios.

---

(1) Véase la tabla de los remedios externos.

Sanguijuelas al ano.  
Inyecciones sedativas.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Píldoras de nitro y alcanfor, 6 á 12 granos por dia.  
 — de calomelanos y de trementina, 5 á 6.  
 Trementina cocida, 1 escrúpulo á 1 dracma, (per 60 píldoras.)  
 Xabon de Starkey, 12 granos á 1 dracma en las gonorreus antiguas.  
 Bolos fortificantes de Desbois, 6 por dia en las antiguas gonorreus.  
 Píldoras astringentes de Capuron, 1 á 2 por dia.  
 — de Boullay, de 2 á 6 por dia.  
 Poción balsámica de Choppart.  
 Emulsion de Cadet.  
 Opiata del Dr. Larrey, 2 á 4 dracmas por dia.  
 Píldoras de Quarin, 5 á 6 por la mañana.  
 — de Maetzio, 2 á 4 por dia.  
 — del Dr. Santa María, media dracma dos veces al dia.  
 Tintura de antimonio de Jacovi, 10 á 20 gotas.

#### GOTA.

#### MEDIOS GENERALES.

Diáforéticos ligeros.  
 Febidas dulces y diluentes.  
 Laxantes y minorativos.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Confeccion opiada de la Farmacopea de Londres, en dosis de 1 escrúpulo ó de 1 dracma.  
 Quina, media dracma á media onza.

Estracto de guayaco, 12 granos á media dracma.

Elixir de guayaco, de media dracma á 1.

Polvos amargos, 12 granos á 1 dracma.

Aguardiente alemán, 1 á 2 onzas para purgar.

Polvos de Perard, 1 dracma.

Electuario cariocostin, 1 á 6 dracmas para purgar.

Tablillas antimonialas de Kunckel, de 1 á 4 dracmas.

Ratafia de los Caribes, 2 cucharaditas por la mañana.

Elixir de salud, de 1 á 3 dracmas.

— antiartrítico de la isla de Francia.

Píldoras de Vicq-d'Azir, 2 á 4 por día.

Conjuntivo antiartrítico de Quarin, de 1 á 3 vasos.

Electuario antiartrítico de Buchan, 1 cucharada de las de tomar café 2 veces al día.

Gotas antiartríticas de Eller, 20 á 30 gotas.

Tintura volátil de guayaco, de 1 dracma á media onza con una taza de leche.

Mixtura resinóxabonosa de Plenck, 1 dracma con una bebida apropiada.

## GUSANOS INTESTINALES.

Aceite de ricino, de media á 2 onzas con xarabe de limon.

Píldoras de Schmucker, 6 mañana y tarde.

Oj lata vermífuga de N.... de media á 1 onza.

Fecion del Dr. Macartan, en 2 veces medianas de una hora entre las 2 tomas.

Fecion contra el ténia.

Agua barrida sobre el mercurio. Se echa una onza de mercurio en un cuartillo de agua.

Estracto de agnijo, 12 granos á 1 dracma.



- Xarabe de agenjo, 2 drachmas á 1 onza y media.  
 — de flor de perico, *idem* como precedente.  
 — vermifugo y purgante, 2 drachmas á 1 onza y media.  
 Azucar vermifugo, 6 á 24 granos.  
 Polvos vermifugos, 6 granos á 1 dracma.  
 Tablillas de rubarbe, 1 á 4 drachmas.  
 Píldoras de Belette, 2 á 3 por día; 6 á 8 para purgar.  
 Píscachos vermifugos, 1 por día.  
 Polvos de Bouvard, 12 granos.  
 Remedio de Madama Nottier.  
 Mago de Corcoya en gelatina, 3 cucharadas por día.  
 Vino de agenjo, 2 á 6 onzas en ayunas.  
 Balsamo de vida de Leliebre, 1 á 3 cucharadas.  
 Estracto de aristoloquia, 12 granos á media dracma.  
 — de centaurea menor, *idem*.  
 — de genciana, 24 granos á 1 dracma.  
 — de rubarbo, 12 granos á media dracma.  
 — de acibar, 4 á 8 granos.  
 Píldoras de paracea mercurial, 6 granos á 1 escrípulo.  
 Polvos de estafío, 2 escrípulos á 1 dracma.  
 Pastillas vermifugas, 2 por día.  
 Elixir visceral de Hollman, 1 á 2 drachmas.  
 Ecuario antielmítico de Vogler, (Véase la fórmula, pag. 56.)  
 Pastillas vermifugas de Barthéz, 1 á 2 por día.  
 Polvos vermifugos de Eruptatelli, de media á 1 dracma cuatro veces al día.  
 Remedio de Prusia contra el ténia. (Véase la fórmula.)  
 Xarabe vermifugo de Boullay, á cucharadas 3 ó 4 veces al día.

Electuario vermífugo de Spielmann, *I dracma mañana y tarde.*

— antielmíntico de Heister, *I dracma mañana y tarde.*

HEMATEMESIS. (V. VÓMITO DE SANGRE.)

HEMATURIA. (V. ORINAR SANGRE.)

#### MEDIOS GENERALES.

Solución de goma arábica.

Cocimiento de cebada y de malvas con miel.

Lavativas emolientes.

Agua alcalina gaseosa.

Alcanfor y opio mezclados.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Cocimiento de uva ursi.

Cocimiento de hojas de persicó, *I onza con 2 pintas de agua reducidas á I pinta y media.*

#### HEMORRAGIAS.

Píldoras coarizas de Swediaur, *2 á 3.*

— de alumbre de Helvecio, *6 á 12.*

Polvos estípticos de Colbatch, *4 á 12 granos.*

— de Kino compuestas, *I escrúpulo.*

Elixir ácido aromático de Brugnatelli, *12 á 48 granos.*

#### HEMORROIDES.

#### MEDIOS GENERALES.

Ligeros laxantes, como electuario lenitivo, aceite de ricino, cremor de tártaro.

Sanguijuelas aplicadas al ano.

Unguento emoliente, como el populeon ó cetrato opiado.

Bebidas ligeramente nitradas y sulfurosas.

MEDIOS PARTICULARES.

Tintura de dedalera, 30 á 40 gotas por la mañana.

Inyeccion astringente.

Conserva de rosas, 1 á 3 onzas.

Quina, *media dracma*.

Electuario lenitivo, 1 á 3 dracmas.

— de Reuss, 2 á 3 dracmas por día.

Alumbre teñido de Helvecio, 6 granos á 1 escrípulo.

Píldoras astringentes, *idem*.

Trociscos de Karabe, 12 granos á una dracma.

HEMOPTISIS. (V. ESPUTO DE SANGRE.)

HEPATITIS. (V. INFLAMACION DEL HIGADO.)

HERPES, ENFERMEDADES CUTÁNEAS (1).

Sulfureto de antimonio, 12 á 18 granos mezclados con igual cantidad de azúcar, y se toman en tres veces.

Nitrato de potasa, de media dracma á 1 por día con una infusion de fumaria.

Bolo diaforético ingles.

Licor de Pressavin, 1 á 3 vasitos de los de rufia per día.

Píldoras de Plumier, 6 por día en 2 tomas.

Píldoras de aconito del Dr. Double, 1 mañana y tarde.

Pulvos de Grimaldi, 48 granas (purgantes).

---

(1) Véase la tabla de los remedios externos.

Xarabe de hígado de azufre, 1 á 2 onzas.

—depurante de Majault, 1 á 2 onzas.

Tisana de Vinache, 1 pinta.

Estracto de fumaria, 24 granos á 1 dracma.

—de escabiosa, 6 á 24 granos.

Xarabe de fumaria, 2 dracmas á 1 onza y media.

—de ramno catártico, 2 dracmas á 2 y 3 onzas (*purgante*.)

Xarabe de Bellet, (*Véase la tabla de las fórmulas*)

Confeccion de Hamec, 1 dracma á 1 onza (*purgante*.)

Tabletas antimoniales de Kunckel, 1 á 4 dracmas.

Pastillas de azufre, 1 dracma á 1 onza.

Píldoras de panacea mercurial, 6 granos á 1 escrúpulo.

Píldoras de Beloste, 2 por dia, 6 á 8 para purgar.

Píldoras de Renaudot, 12 á 48 granos.

Troiscos Alhandal, 2 granos á 1 escrúpulo, (*dástrico*)

Todo diastrético ingles, 2 por dia.

—purgante del Dr. Wilson, 2 á 10 granos.

Agua oxigenada de Alyon, 2 ó 3 vasos por la mañana.

(*Véase la tabla de las enfermedades*.)

### HIDROPEZIA.

Cebolla albarrana en polvo, 6 á 8 granos, con 24 granos de nitro en un vaso de agua de cereza.

Vino diurético ingles, 2 á 4 vasos por dia.

Leche de miacerol, 1 grano 2 ó 3 veces al dia.

Arrope de resaca calistillo, 1 escrúpulo á 1 dracma y media para purgar.

- Estracto de cohombro amargo, I á 6 granos.  
 — de eleboro negro, I á 12 granos.  
 Resina de jalapa, 4 á 12 granos en píldoras.  
 — de escamonea, *idem*.  
 — de turbita, *idem*.  
 Poción de ipecacuana de Haller.  
 — de Halesland, I cucharada cada 2 horas.  
 Polvos de cebolla albarrana de Stahl, de 3 á 5 granos.  
 Vinagre colchico de Reuss, I dracma á 1 onza.  
 Electuario de Quarin, I dracma.  
 Espíritu de coctearia, 15 gotas á 1 dracma.  
 Vinagre escilítico, I á 4 dracmas.  
 Miel de cohombre amargo, I á 4 dracmas en lavativa.  
 Ogimiel colchico, I dracma 2 veces al día con una infusión.  
 Electuario diafenix, I dracma á 1 onza.  
 Xarabe de ramno catártico, 2 dracmas á 2 y 3 onzas para purgar.  
 Polvos hidragogos, 12 granos á 2 escrúpulos para purgar.  
 Píldoras de Starkey, 6 á 8 granos.  
 — tónicas de Bacher, 3 á 6 granos. Se toman por la tarde.  
 — Hidragogos de Bencio, 12 granos á media dracma.  
 — de Rudlo, 12 granos á 2 escrúpulos.  
 Tráqueos Alhandal, 5 granos á 1 cucharada.  
 Cerveza diurética inglesa, 1 pinta por día en la locución de la enfermedad.  
 Vino de Fuller, 4 onzas por la mañana en onzas.  
 Píldoras hidragogas de Janin, 12 granos á media dracma.  
 — Sténicas de Brown, 1 á 2 por la mañana.

Xabon de Starkey, 8 á 10 granos.

Electuario de Quarin, 1 dracma cada hora hasta que se haya evacuado suficientemente.

Polvos de cebolla albarrana nitrados de Van-helmout, 12 granos 2 veces al dia.

Mistura hidragoga de Van-Swieten, 1 cucharada 4 y 6 veces al dia.

Mixtura catártica árabe.

Vino escilítico de Richart, 3 á 4 cucharadas.

Elixir resolutivo del Dr. Selle, 1 cucharada de las de cafe cada dos horas.

Píldoras purgantes de Haen, 10 á 20 granos. — de Withering, 1 á 2.

Vino de guayaco eleborado de Lewis, 1 vaso to por la tarde.

Electuario hidragogo de Fouquier, 12 á 24 granos.

Pastillas de émula campana, media onza.

## HIDROPESIA DEL ABDOMEN.

(V. ASCITIS.)

## HIDROPESIA DEL PECHO.

(V. HIDROTORAX.)

## HIDROPESIA DEL TEGIDO CELULAR.

(V. ANASARCA.)

## HIDROFOBIA.

Poción anti-ídica del Dr. Selle.

Polvos de Cob, 40 granos.

(V. RABIA.)

## HIDROTORAX. (HIDROPESIA DE PECHO.)

### MEDIOS GENERALES.

Tónicos y diuréticos combinados.

Preparaciones escilíticas.  
 Cremor de tártaro combinado con la dedalera.  
 Preparaciones antimoniales diaforéticas.  
 Vegigatorio al pecho.  
 Opio en cortísimas dosis.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Mezcla de ayre atmosférico y de oxígeno dada por respirar.

(Proporciones) ayre vital  $\frac{4}{5}$  ayre ordinario 1.

(Píldoras del Dr. Dupuy, 4 por la mañana y 4 por la tarde.

#### HIPOCONDRIA.

##### MEDIOS GENERALES.

Minorativos.

Carminativos.

Eter, mosco y opio combinados.

Asafétida, alcanfor, valeriana y aceite de succino combinados.

Aguas de Vichy y análogas á ellas. Aguas de Sedlitz.

Baños, fricciones secas, ejercicios.

Infusion de yerba buena ó de salvia.

##### MEDIOS PARTICULARES.

Quina, 12 á 36 granos entre dos sopas.

Píldoras aceradas, 6 granos á media onza.

——— tónicas de Stoll, 4 á 6 granos.

Estracto de elebero negro, 1 á 12 granos.

Polvos absorbentes, 6 granos á media dracma.

Píldoras tónicas de Bacher, 3 á 6 granos por la tarde.

- de Rudio, 12 granos á 2 escrúpulos.  
 — Splénicas inglesas, 3 á 6.  
 — marciales de Sidenham, 2 escrúpulos  
 por día.

## HICTERISMO. (V. EFECTOS HISTERICOS.)

### ICTERICIA.

#### MEDIOS GENERALES.

- Sangría (si el enfermo es pletórico y se duele  
 de un dolor á la region del hígado; si hay  
 supresion de menstruacion ó de almorranas.  
 y si existen síntomas inflamatorios.)  
 Verjivo, ipecacuana, 20 granos.  
 Púldras xaiónicas alvélicas, 5 á 6 por día.  
 Fomentaciones y fricciones al estomago y al  
 hígado.  
 Aguas termales sulfurosas.  
 Cremor de tártaro soluble.

#### MEDIOS PARTICULARES.

- Cañamones, 2 onzas en cocimiento con dos pie-  
 tas de cerveza edulcorada con azucar: medi-  
 ca cuatro por la mañana.  
 Espíritu de trillo lírico, 1 dracma á 1 onza.  
 — de agélica compuesto, 35 á 60 gotas.  
 Tintura de Balaustas, 15 á 40 gotas.  
 Bala dipeptico de Smith.  
 Electuario del Dr. Warch.  
 Poción de ipecacuana de Haller.  
 Polver atmoniales marciales de Keup, 5 á  
 6 granos.  
 — dlanoraton, 5 á 20 granos.  
 Tintura de guala, 1 cucharada con un vaso de  
 agua azucarada.



- Espíritu de nitro dulcificado, 20 á 60 gotas  
*con una bebida diurética.*
- Mixtura de Quarín, 2 cucharadas cada tres  
*horas.*
- Píldoras antihistéricas de Euchar, 5 á 6 por  
*día.*
- fundentes de Smith, 4 cada tres días.
- fundentes de Richter, 8 á 10 cada tres  
*días.*
- de Greding, 1 por la mañana y otra por  
*la tarde.*
- de Starkey, 6 á 8 granos.
- fundentes de Vicq-d' Azyn, 2 á 4 por  
*día.*
- Cremor de tártaro soluble, 1 á 2 dracmas.
- Estracto de triolio líbrino, 12 á 48 granos.
- Espíritu de coclearia, 15 gotas á 1 dracma.
- Electuario de zaragatona, 1 á 6 dracmas.
- Elixir de Witt, *media onza.*
- Vino anti-ictérico, 4 cucharadas por día.

## INDIGESTION.

- Elixir de Garus, 2 dracmas á 1 onza y media.
- Bolo digestivo de Smith.
- Electuario del Dr. Ward, 1 á 2 dracmas.
- Píldoras estomáticas de Smith, 3 á 6.
- tónicas de Huhn, 1 á 2.

(V. DISPEPSIA.)

## INFLAMACION DEL ESTÓMAGO.

## GASTRITIS.

## MEDIOS GENERALES.

Sangría.

Vegigatorio al epigastro.

Lavativas emolientes y laxantes.  
 Baño caliente y pediluvios.  
 Bebidas mucilaginosas.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Pocion anti-emética de Riverio.  
 Disolucion de acetato de sosa.  
 Opio gomoso en cortas doses.

### INFLAMACION DEL HÍGADO.

(HEPATITIS.)

#### MEDIOS GENERALES.

Sangrias ó sanguijuelas y ventosas escarificadas.  
 Calomelanos unidos á la jalapa ú otro catártico.  
 Vegigatorio al lugar doloroso.  
 Lavativas emolientes. Pediluvios.  
 Diaforéticos suaves.  
 Pulpa de tamarindos, *I dracma á I onza.*  
 Nitrato de potasa, *6 á 12 granos con una tisana diurética.*  
 Espíritu de nitro dulcificado, *6 á 8 gotas con una tisana diurética.*

#### MEDIOS PARTICULARES.

(*Cuando hay sintomas de supuracion*), una dracma de quina cada dos horas.  
 En la epatitis aguda (*cuando se sospecha la formacion de un absceso*) fricciones mercuriales á la region del hígado. Píldoras mercuriales al interior.  
 (En la convalecencia) la quina, la gentiana, la raiz de colombo unida á la sal de Seidlitz.

## INFLAMACION DE LOS INTESTINOS.

(ENTERITIS.)

## MEDIOS GENERALES.

Sangrias, sanguijuelas al abdomen.  
Laxantes suaves, como el aceite de riccino,  
sulfato de magnesia, ruibarbo.  
Lavativas emolientes, fomentaciones calientes  
al abdomen.  
Vegigatorios á la parte enferma.  
Semicupios.  
(Cuando hay constipacion) calomelanos, 12  
*granes en píldoras muy pequeñas dadas maña-  
na y tarde.*

## INFLAMACION DE LOS RIÑONES.

(NEFRITIS.)

## MEDIOS GENERALES.

La sangria, aplicacion local de sanguijuelas.  
Cataplasma de las yerbas emolientes.  
Lavativas emolientes, bebidas diluentes y  
suaves, como el agua de cebada, linaza, in-  
fusion de flores de malva.  
Laxantes ligeros.  
Baños calientes.  
Diaforéticos suaves.

## MEDIOS PARTICULARES.

Cocimiento de hojas secas de persicó.  
Cocimiento de uva-ursi.  
Agua ferruginosa y quina.

## INFLAMACION DE LA VECIGA.

(CISTITIS.)

## MEDIOS GENERALES.

Laxantes refrescantes.

Inyecciones emolientes y opiadas.

Opio al interior en cortas doses.

## MEDIOS PARTICULARES.

Bálsamo del Canadá.

Píldoras de cicuta ó de beleño.

## INSOMNIO.

Xarabe diacodion, *de media á 1 onza.*Opio de Rousseau, 2 á 10 gotas con una infu-  
*sión de flores de amapola.*Láudano de Sidenham, 10 gotas á 1 dracma  
*con una pocion calmante.*

Píldoras orientales, 2 á 3 por la tarde.

## ISCURIA.

(V. RETENCION DE ORINA.)

## LETARGIA.

Agua general, 2 á 4 dracmas.

Electuario diacolocintidos, 12 granos á 1  
*onza como purgante.*

Píldoras de Ruttio, 12 granos á 2 escrúpulos.

Mistura del Dr. Franch, 1 cucharadita de las  
*de café, cada cuarto de hora.*

## LEUCORREA.

## MEDIOS GENERALES.

Quina, ferruginosos y ácido ulfúrico.

Baños frios locales.

Inyecciones con el sulfato de cinco ó de alu-  
mina, *I dracma con I pinta de agua.*

Catecú y gomakino.

Bálsamo de copaiva ó del Canadá.

Píldoras de acibar y de mirra.

Vinos generosos, guisados nutritivos.

Aguas minerales ferruginosas.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Xabon de Starkey, *8 á 10 granos.*

Vino del Dr. Fordice, *4 cucharadas per dia.*

Quina, *I escrúpulo á I dracma.*

Ruibarbo, *I dracma en píldoras con el xarabe de  
ramno catártico.*

Agua de bola, *I onza mezclada con vino.*

Poción balsámica de Choppart.

Vino anti-leucorrágico, *2 onzas mañana y  
tarde.*

Emplasto estíptico de Swediaur.

Polvo diarrodón, *12 granos á I dracma.*

Píldoras aceradas, *6 granos á media dracma.*

— astringentes, *6 granos á I escrúpulo.*

— de helecho compuestas, *idem.*

— tónicas de Stoll, *de 4 á 6.*

Polos fortificantes de Desbois, *6 per dia.*

Elixir de Whitt, *media onza.*

— americano, *de media á 2 dracmas.*

— de Garus, *2 dracmas á I onza.*

Opiata de Tissot, *2 dracmas mañana y tarde.*

— anti-leucorrágica, *2 á 4 escrúpulos.*

#### MANÍA.

Polvos de tunquin, *12 granos.*

Marasmo, *caquexia, atonía general.*

Electuario anticaquético de Ward, *1 á 2*

- dracmas, *tres veces por dia.*  
 Elixir fortificante de Selle, *1 cucharadita de dos en dos horas.*  
 — de Mithié, *idem.*  
 Xarabe vinoso cardiaco de Wirtemberg, *1 á 2 onzas.*  
 Elixir resolutivo del Dr. Selle, *1 onza ó 2 cucharadas.*  
 Infusion de hollin de Piderit, *1 dracma con 1 onza de vino bueno.*  
 Elixir pectoral, *media dracma á 2 dracmas en una taza de infusion.*  
 Mistura de Mirra de Griffith, *4 cucharadas tres veces por dia.*  
 Osmazome de Thenard, *1 á 2 dracmas.*  
 Píldoras de Haen, *4 cada tres dias.*  
 — marciales de Sidenham, *2 escrípules, por dia.*  
 — marciales de Kempf, *de 12 á 36 granos por dia.*  
 Polvos antimoniales de Keup, *de 5 á 6 granos.*  
 — corroborantes de Werlhoff, *1 dracma y media.*  
 — diaromaton, *5 á 20 granos.*  
 Tintura de espliego compuesta, *10 gotas á 1 dracma.*  
 Polvos de Hartmann, *de media á 2 dracmas.*

**MENORRAGIA.** (*V. flujo inmoderado de la menstruacion &c.*)

**NEFRÍTICO.** (*V. cólico.*)

**NEFRITIS.** (*Véase inflamacion de los riñones.*)

**OBSTRUCCIONES.**

Mistura fundente de Mutzel, *media onza cada hora.*

- Polvo ecfratico del Dr. Selle, 2 á 4 cucharadas de las de café por dia.
- Tintura antimonial de Jacobi, 10 á 20 gotas.
- Xarabe de nicotiana, 2 dracmas á 2 onzas.
- Conserva de coclearia, 1 á 6 dracmas.
- Polvos de los tres sandalos, 12 granos á 1 dracma.
- de aro de Berckmann, *idem*.
- Electuario de hiera piera, 1 á 6 dracmas.
- benedicto laxante, 1 dracma á 1 onza.
- Opiata mesentérica, de media dracma á 2.
- Píldoras de Starkey, 6 á 8 granos.
- Píldoras tartáreas de Schroder, 1 escrúpulo á 1 dracma y media.
- balsámicas de Sthal, 1 á 12 granos.
- escocesas, 2 á 4 por dia.
- Vino acerado, 2 dracmas á 2 onzas.
- Muchas veces se da con una infusion de artemisia.
- Tintura marcial de Ludovic, 50 á 80 gotas.
- Estracto de chicoria silvestre, 6 granos á 2 dracmas.
- de berros, 12 granos á media dracma.
- de fumaria, 24 granos á 1 dracma.
- de lúpulo, *idem*.
- Ogimiel escilítico, 1 dracma á 1 onza.
- Xarabe de coclearia, 2 dracmas á 1 onza y media.
- de berros, *idem*.
- de perifollo, *idem*.
- de las cinco raices aperitivas, *idem*.
- de flor de persicó, *idem* como purgante.
- Píldoras de Lemonier, 6 por dia en dos tomas.
- Infusion de hollin de Piderit, 1 dracma á 1 onza con vino.
- Agua de Bareges artificial, 1 á 2 pintas por dia.

Cocimiento de acibar compuesto de la farmacia de Londres.

### PALPITACIONES DEL CORAZON.

(VEASE ENFERMEDADES DE NERVIOS,  
ESPASMOS Y EFECTOS HISTERICOS.)

Polvos absorbentes, 6 granos á media dracma.  
———letificantes, 12 granos á 1 dracma.  
Confeccion de alquermes, 1 escrúpulo á 1 dracma.

### PAPERA, INFARTO GLANDULOSO.

Etíope vegetal de Russel, 1 dracma.  
Gelatina de fuco de Russel, *idem* (1).  
Infusion de hollin de Piderit, 1 dracma á 1 onza con vino.  
Tintura lixivial de Vogler, 1 dracma 2 á 3 por día.

### PARALISIS.

#### MEDIOS GENERALES.

(Si la enfermedad proviene de las causas que producen la apoplejía) sangría y purgante.  
(En todos los casos) fricciones secas, sinapismos ó rubefacientes.

#### Urticacion.

Baños calientes.

Estimulantes al interior como la simiente de

---

(1) Véase la tabla de las enfermedades es-  
ternas.



mostaza, ajo, rábano, sales volátiles alcalinas.

### MEDIOS PARTICULARES.

Alcool amoniacal, 20 á 40 gotas con un vehí-  
culo apropiado.

Eter sulfúrico, 10 á 30 gotas.

Tintura de Bestuchef, 15 á 40 gotas.

Cerbeza cefálica inglesa, 4 á 5 vasos por día.

Bolo de Swediaur, 2 por día.

Gargarismo de Quarin, por la parálisis de la  
lengua.

Tártaro emético, 1 á 3 granos disueltos en  
agua.

Electuario lenitivo, 4 dracmas á 1 onza y  
media.

Amoniaco líquido, 12 gotas mañana y tarde.

Vino emético, 2 dracmas á 4 onzas.

Espíritu volátil aromático de Silvio, 6 á 20  
gotas.

Arrope de ramno catártico, 1 escrúpulo á 1  
dracma y media para purgar.

Agua teriacal, 1 á 4 dracmas.

Electuario diacolocintidos, 1 dracma á 1 onza.  
(purgante enérgico.)

— diafenix, idem (purgante.)

### PARALISIS DE LA LENGUA.

Gargarismo de Quarin.

### PÉRDIDA DE SANGRE DEL ÚTERO.

Xarabe de consuela mayor, 2 dracmas á una  
onza y media.

Elixir de vitriolo, 8 á 20 gotas con una bebi-  
da astringente.

Píldoras astringentes, 6 granos á 1 escrúpulo.  
 Alumbre teñido de Helvecio, 6 granos á media dracma.

Píldoras de helecho compuestas, *idem*.  
 Trociscos de Karabe, 12 granos á 1 dracma.

### PERINEUMONIA.

#### MEDIOS GENERALES.

Sangría al brazo. Sanguijuelas al pecho.  
 Vesicatorio á la parte dolorida.  
 Vapores de un cocimiento de las plantas emolientes y del vinagre para respirar.  
 Antimoniales en corta dosis.  
 Cocimiento de cebada ligeramente acidulado con el zumo de limon.  
 Pediluvios.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Oximiél escilítico, 1 onza á 1 onza y media con una bebida pectoral.  
 Píldoras nitrosas alcanforadas, 6 á 12 granos.  
 Píldoras de cinoglosa, 3 á 6 granos.  
 Cocimiento antiséptico de Boerhaave, 2 onzas cada cuarto de hora.  
 Mixtura pectoral del mismo, 1 onza cada media hora.  
 Xarabe de Willis, 1 cucharada mañana y tarde.  
 Emulsion de almendras, 3 á 4 onzas bien emulsionadas.

### PERINEUMONIA FALSA.

(El mismo tratamiento de la perineumonía verdadera.)

## PIEDRA DE LA VEGIGA.

- Agua de cal, *1 cuartillo.*  
 Potasa cáustica, *30 á 40 gotas con una pinta de agua mucilaginoso.*  
 Terebintina cocida, *1 escrúpulo á 1 dracma.*  
 Espíritu de nitro dulcificado, *1 á 20 gotas con un vehiculo apropiado.*  
 — de coclearia, *15 gotas á 1 dracma.*  
 Xarabe de las cinco raices aperitivas, *2 dracmas á 1 onza.*  
 Ratafia del comendador de Caumartin, *un vaso por la mañana en ayunas.*  
 Bálsamo de pareira brava, *de media dracma á 2.*  
 Remedio de Stephens (Véase la farmacopea de Baume.)  
 Extracto de énula campana, *8 granos á media dracma.*  
 Xabon de Starkey, *12 granos á 1 dracma.*  
 Legia de Saunder, *3 dracmas por dia.*  
 Agua real, *1 á 4 dracmas.*  
 Bálsamo de Fioravanti, *5 á 10 gotas con una bebida diurética.*

## PITUITA.

- Mistura balsámica de Fuller, *1 cucharada mañana y tarde.*  
 — de mirra de Griffith, *4 cucharadas tres veces al dia.*  
 Elixir anti-asmático de Boerhaave, *2 á 30 gotas con una infusion pectoral.*  
 Liliun de paracelso, *10 á 30 gotas con un vehiculo apropiado.*  
 Polvos diatragantes frios, *6 granos á 1 dracma.*  
 — de lirios compuestos, *12 granos á media dracma.*

Pildoras de cinogloca, 1 á 6 granos.

— de Morton, 3 á 6 granos.

Treciscos de agarico, 12 granos á 1 dracma.

## PLEURESIA.

### MEDIOS GENERALES.

Sangría.

Pediluvios y diaforéticos al principio.

Tobidos emolientes, pectorales y mucilaginosos.

Vesicatorio a la parte dolorida.

Suero de leche nitrado.

### MEDIOS PARTICULARES.

Lavantes suaves.

Pecion hecha con aceite de olivas, 1 onza.  
mucilago, 4 onzas, oximiel esculítico, 3  
dracmas, agua de poleo, 2 onzas.

(V. el artículo *perineumonia*.)

## RABIA.

(Véase *HIDROFOBIA*.)

Incisiones.

Cauterio actual, ventosas escarificadas, vésiga  
sobre la llaga.

Fricciones mercuriales.

Opiu en dosis crecida.

Alcali volátil, 12 gotas con un vaso de agua  
cada tres horas.

Vinagre ó vino con escaso.

(Si el enfermo no puede beber) se le da áci-  
do tartárico oculto en polvos.

### MEDIOS PARTICULARES.

6 granos de cascara, (pimienta larga en-  
vuelto con oblea.

(No hay sino un remedio seguro: el cauterio.)  
 Cinabrio, 24 granos: mosco 16 granos mezclados con un vaso de aguardiente.

Asafétida, 12 granos á 1 escrúpulo.

Alcanfor, 10 á 12 granos.

Opio, 1 á 2 y 3 granos.

Quina, media dracma tres veces al dia.

## RAQUITIS.

### MEDIOS GENERALES.

Inmersión en el agua fria.

Fricciones secas con la franela.

Régimen nutritivo, vino acerado.

Hierro amoniacal y óxido de cinco mezclados.

Quina, 1 dracma á 4 por dia.

### MEDIOS PARTICULARES.

Fosfato de cal y de sosa, 1 escrúpulo por dia.

Luciones con media onza de potasa y una libra de agua.

## RETARDOS DE LA MENSTRUACION.

### MEDIOS GENERALES.

Fumigaciones emolientes.

Aplicaciones de vejigas llenas de agua caliente.

Tintura de sabina y de castoreo.

Tintura de hollín, de mirra y de cantáridas mezcladas en proporciones correspondientes y tomadas en cortas dosis.

### MEDIOS PARTICULARES.

Tintura de eleboro blanco, 1 á 2 cucharadas de las de café por dia.

Elixir de propiedad de paracelso, 6 gotas á media dracma.

Espíritu volátil aromático de Silvio, 6 á 30 gotas.

Bálsamo del Comendador, de 10 á 40 gotas.

Estracto de berros, de agenjo, de artemisia, de aristoloquia, 12 granos á media dracma.

Infusioa de hollin de Piderit, 1 dracma á 1 onza con vino.

Estracto de lúpulo, 24 granos á media dracma.

— de safran, 4 á 24 granos.

— de valeriana, 12 á 48 granos.

— de vencetósigo, 12 granos á media dracma.

Elixir americano, 1 á 2 dracmas.

Agua de yerba buena compuesta, 1 á 4 dracmas.

Espíritu de coclearia, 12 gotas á 1 dracma.

Píldoras de Haen, 4 cada tres dias.

— carminativas de Buchan, 4 á 5 al acostarse.

— tartáreas de Schróder, 1 escrúpulo á 1 dracma y media.

— de Fuller, 2 mañana y tarde.

— balsámicas de Stahl, 2 á 12 granos.

— tónicas de Bacher, 3 á 6 granos.

— histéricas, 6 granos á media dracma.

— calibeadas, 6 granos á 1 escrúpulo.

— trociscos de mirra, 1 escrúpulo á 1 dracma.

— histéricas, 12 granos á 1 dracma.

Pocion emenagoga de Desbois, á cucharadas cada cuarto de hora.

Xarabe de Calabria, 2 dracmas á 1 onza.

Xarabes de canela, de agenjo, de artemisia, de cantueso compuesto, 2 dracmas á 1 onza y media.

Triaca diatesaron, 12 granos á 2 dracmas.

Orvietano, 18 granos á 1 dracma.

Electuario de bayas de laurel, 1 escrúpulo á 2 dracmas.

— de hiera piera, 1 á 6 dracmas.

— benedicto laxante, 1 dracma á 1 onza.

Se da tambien en lavativa.

Tablillas marciales, 2 por dia.

— de azafran, 1 á 4 dracmas.

Limaduras de hierro portirizadas, 2 á 4 granos.

Se mezcla con una opiata amarga ó purgante. Se dan tambien desleidas con vino de España.

Safran de Marte ó etiope marcial, 1 á 18 granos.

Vino de agenjo, 2 á 6 onzas en ayunas.

— calibeado, 2 dracmas á 2 onzas con una infusion de antemisia.

Tintura de agenjo, 10 gotas 1 dracma con 1 taza de té.

Esencia de Wedelius, media dracma á 1.

Elixir teriacal, 10 á 30 gotas.

Miel de cohombro amargo, 1 á 4 dracmas en lavativa.

Elixir uterino de Croulio, 1 á 2 dracmas.

## RETENCION DE ORINA, ISCURIA.

### MEDIOS GLNERALES.

Opiados y diuréticos dulcificantes en bebidas y lavativas.

Medios quirúrgicos, (sondas y candelillas.)

Tintura de muriato de hierro, en dosis de 10 gotas cada cuarto de hora.

Píldoras de opio, de calomelanos y de alcanfor mezcladas.

## MEDIOS PARTICULARES.

Espíritu de nitro dulcificados, 5 á 6 gotas *con una infusion emoliente.*

Xabon medicinal. 1 dracma en píldoras.

Pulpa de caña fistula, 1 onza á 1 y media.

— de tamarindos. 2 dracmas á 1 onza.

Ratafia del Comendador de Caumartin, 1 vaso *por la mañana en ayunas.*

Polvos temperantes de Stahl, 12 granos.

Cerbeza diurética inglesa, 1 pinta *por dia.*

Vino amargo de la caridad, 1 onza á 2 *mañana y tarde.*

Vino diurético amargo de Corvisart, 4 *cucharadas por dia.*

Esencia dulce de Hales, 20 gotas.

Pocion diurética del Dr. Halle, 1 *cucharada cada hora.*

— de Buchan, 1 *taza cada 4 horas.*

Agua de Quarcetan, 1 á 2 onzas.

Píldoras escilíticas de Edimburgo, 3 á 4.

Linimento diurético de Kuser.

## RETORTIJONES.

Elixir americano, 1 á 2 dracmas.

Pocion de Spielman, á *cucharadas.*

## RETORTIJÓN DE LOS NIÑOS.

Pocion de Spielman, á *cucharadas cada cuarto de hora.*

(Véase cólico de entrañas.)

## REUMATISMO AGUDO.

## MEDIOS GENERALES.

Sanguijuelas aplicadas á la parte dolorida.



- Tintura de dedalera, 10 á 20 gotas cada cuatro horas.
- Lavativas laxantes ó ligeros minorativos.
- Vegigatorio volante ó linimento rubefaciente.
- Diaforéticos, *en corta dosis.*
- Polvos de ipecacuana compuestos, (pharm. Lond.) 10 á 12 granos.
- Polvos antimoniales (pharm. Lond.)
- Quina, en dosis de 1 dracma, mezclada con 10 granos de nitró.
- Calomelanos unidos al opio.
- Fricciones con el eter acético.
- Cocimiento de tamarindos, 1 cuartillo.
- Espiritu de Minderero, 12 á 30 gotas.  
*con una bebida carminativa.*
- Cremor de tártaro soluble, 1 dracma á 1 y media.
- Goma de guayaco, 1 escrupulo á media dracma  
*con un vaso de suero de leche.*
- Láudano líquido, 15 á 20 gotas.
- Estracto de tritolio fibrino, 12 granos á media dracma.
- Aguardiente aleman, 1 á 2 onzas para purgar.
- Arrope de sauco, 1 escrupulo á 1 dracma.
- de ramno catártico, 1 escrupulo á 1 dracma y media.
- Estracto de guayaco, 12 granos á media dracma.
- Píldoras de Vicq-d' Azyr, 2 á 4 mañana y tarde.
- Bola diaforético inales 2 por día.
- Liquor antierrítico de Eller, 20 á 40 gotas.
- Polvos de Dover, *media dracma.*
- Emulsion del Dr. Willis.
- Tinctura de Vigieroux, 1 pinza.
- Vino de guayaco elaborado de Lewis, 1 va-

*sito por la tarde.*

Emulsion de Quarin.

Cerbeza de Sidenham, *1 pinta por la mañana.*

## REUMATISMO CRÓNICO.

### MEDIOS GENERALES.

Diaforéticos activos, como el vino antimonial.

Tintura de guayaco amoniacal.

Opio combinado con los calomelanos y los  
pólvos antimoniales.

Infusion de rhododendron, *crysanthemum.*

## ROMADIZOS, CATARROS.

Tisana de Tissot, *1 pinta.*

Especies pectorales, una pulgarada infundida  
en agua hirviente, y edulcerada con miel.  
—— *pro te, idem.*

Tisana de Buchan, *1 pinta.*

Xarabe pectoral balsámico de Charles, *1 onza*  
*, á 1 onza y media.*

Miel escilitica, *2 dracmas á 1 onza.*

Hilomel simple, *1 pinta.*

Xarabe de violetas, de erísimo compuesto,  
de tuflago, cantantrillo, malvavisco, borraja,  
blanca, lombarda, de tuétano de buey,  
canaclos, pectoral inglés, de Desessarts,  
de Maloet, de Bouvart, de Rivet, de mil  
pies, *2 dracmas á 1 onza y media.*

Tablillas pectorales de Spitzlov, de malva-  
visco goma arábiga, y de lirios, *ad libitum.*

—— anticatarrales de Tronchin, *6 á 8 por*  
*dia.*

—— de ipecacuana, *idem.*

Mistura balsamica de Fuller, *1 cucharada*

*mañana y tarde.*

Pastillas del Dr. Jobard, *cada 2 horas.*

Píldoras incisivas del Dr. Leroux, *3 á 4.*

Polvos pectorales de Wedelio, *1 á 2 escrófulos.*

— anticatarrales de Viena, *1 á 2 dracmas.*

Manteca de cacao, *2 á 4 dracmas mezcladas con azucar.*

Azucar rosado, *1 á 6 dracmas.*

— de cebada, de manzana, *ad libitum.*

Pasta pectoral de Parmantier, *ad libitum.*

Ogimiel pectoral de los dinamarqueses, *1 cucharada cada hora.*

— pectoral de Edimburgo, *1 onza á onza y media por día.*

Pasta de malvavisco, de dátiles, de xarabe de uvas, *idem.*

Zumo de regaliza de Blois, de regaliza anisada, de regaliza blanca, *idem.*

Crema pectoral de Trousseau, *idem.*

Píldoras de cinoglosa, *3 á 6 granos.*

— balsámicas de Morton, *1 á 6.*

— de cebolla albarana compuestas, *12 á 24 granos por día según la edad.*

Xarabe de Willis, *1 cucharada mañana y tarde.*

Gelatina de lombarda, *1 á 4 onzas.*

Mermelada de Trousseau, *1 onza y media por cucharadas de hora en hora.*

Polvos de Dover, *media dracma.*

Poción de Jeairoy, *6 cucharadas de las de café.*

Crema pectoral del Dr. Jeairoy des Longpierre, *100 cucharadas de las de café cada media hora.*

## SARAMPION.

## MEDIOS GENERALES.

Lavativas emolientes y laxantes suaves.  
 (Cuando hay opresion de pecho) un rubefaciente entre los omoplatos  
 (Si hay tos frecuente) pocion calmante, cocimiento de cebada, pediluvios.  
 Antimoniales ligeramente opiados.  
 Tintura de dedalera encarnada, 10 á 12 gotas.

## MEDIOS PARTICULARES.

Emulsion de almendras, 3 á 4 onzas con un poco de xarabe de adormideras.  
 Agua general, 2 á 4 dracmas.  
 Bálsamo de Vinceguerre, 8 á 10 gotas sobre un terron de azucar.  
 Esencia elixifarmaca de Stahl, 20 á 30 gotas.

## SARNA.

Flores de azufre, 10 á 18 granos.  
 Cremor de tártaro soluble, 2 escrúpulos á 1 dracma.  
 Estracto de escabiosa, 6 á 24 granos.  
 Xarabe de tûmaria, 2 dracmas á 1 onza y media.  
 Xarabe de ramno catártico, 2 dracmas á 2 y 3 onzas (purgante)  
 Confeccion de Hamech, 1 dracma á 1 onza purgante.  
 Tablillas antimoniales de Kunker, 1 á 4 dracmas.  
 Píldoras de panacea mercurial, 6 granos á 1 escrúpulo.

Xarabe de hígado de azufre, 1 á 2 onzas (1).

### SUPRESION DE LA TRANSPIRACION.

Elixir sudorífico de Willis, 1 á 2 dracmas.

Infusion de hollin de Piderit, 1 dracma con 1 onza de vino bueno.

### SUPRESION DE LA MENSTRUACION.

(V. RETARDO DE LA MENSTRUACION.)

### SINCOPE. (V. DESMAYO.)

Tintura de castoreo, 1 ó 2 cucharaditas de las de café.

Confeccion alquermes, 1 escrúpulo á 1 dracma.

Agua de la reina de Ungria, 10 á 12 gotas.

### SIFILIS.

Xarabe de Cuisinier, 2 dracmas á 1 onza y media.

— de Bellet, 2 dracmas á 1 onza.

Píldoras de Beloste, 2 á 3 por día.

Licor de Vansvieten, 1 cucharada de las de café con una bebida apropiada.

Píldoras mercuriales, 2 mañana y tarde.

Contites de Kayser, *idem*.

Píldoras del Dr. Sedillot, *idem*.

Xarabe de zarzaparrilla, 2 dracmas á 1 onza y media.

— depurativo del Dr. Larrey, 1 onza por la mañana.

---

(1) Véase la tabla de las enfermedades externas.

Solucion de Weikard, 30 á 40 gotas *mañana y tarde.*

Arrope anti-sifilítico, 1 á 2 onzas.

Licor de Pressavin, 3 á 4 vasitos por dia.

Tisana de Vinache, 3 á 4 vasos.

—— de Feltz, 1 pinta por dia.

Agua oxigenada de Alyon, 2 ó 3 vasos por la *mañana.*

Mercurio soluble de Hahnemann, 1 á 6 granos.

Píldoras mercuriales de Brugnatelli, 2 á 4.

—— de plenk, 4 á 6.

—— de acónito del Dr. Double, 1 *mañana y tarde.*

Pastillas de mercurio saccarino del Dr. Lagneau.

Polvos de mercurio del mismo.

Remedio antivenereo de Peyrilhe.

Píldoras de Aliber, 5 á 6 por dia.

—— de Moscati, 1 *mañana y tarde.*

Xarabe de mercurio gomoso del Dr. Lagneau.

### TABES MESENTERIA.

Tintura de malato de hierro, 1 escrúpulo á 1 *dracma.*

### TÉTANO TRAUMÁTICO.

Pocion antitetánica de Fournier.

Tic, tiro ó trismo doloroso de la cara.

Píldoras del Dr. Meglin, de 1 á 10 y 18.

### TIMPANITIS.

Lavativas purgantes.

Laxantes unidos con los aromáticos.

Asafétida y eter.

Infusion de rábano y de gengibre.  
 Hielo molido aplicado al vientre.  
 Fricciones con la terebintina, aceytes y alcanfor.

### TIÑA.

Estracto de lúpulo, 24 granos á media dracma.  
 Estracto de escabiosa, 6 á 24 granos.  
 Confeccion Hamech, 1 dracma á 1 onza como purgante.  
 Píldoras de panacea mercurial, 6 granos á 1 escrúpulo.  
 Remedio de Barlow.  
 Remedio del Dr. Bircher (1).

### TISIS PULMONAR.

#### MEDIOS GENERALES.

(Periodo inflamatorio.) Sangria, laxantes suaves y bebidas antitlogísticas.  
 Leche de burra, de muger, de baca, de manteca.  
 Camisas de franela, ó á lo menos de calicot.  
 Aguas termales sulfurosas.  
 Vegigatorios volantes.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Vapor de eter respirado.  
 Dedalera encarnada, en corta dosis en cocimiento ó tintura.

---

(1) Véase la tabla de las enfermedades externas.

Sulfato de cobre dado como á vomitivo en el primer período (de 3 á 6 granos mezclados con igual cantidad de ipecacuana.)

Bebida compuesta de agua de cebada, xarabe tolutano, goma amoniaco y vinagre escillítico.

Liquen islandico.

Acido benzoico, 8 á 16 granos cada dos dias.

Píldoras incisivas de Buchan, 3 á 4 en la invasión de la enfermedad.

Píldoras balsámicas de Boerhaave, 1 cada tres horas.

Xarabe pectoral del Dr. Selle, 1 onza cada hora.

Leche de goma amoniaco, 4 á 8 cucharadas por dia.

Xarabe de consuelda mayor, 1 onza á onza y media.

Conserva de rosas, 3 á 4 onzas por dia.

Quina, 1 escrúpulo cada tres horas.

Elixir de vitriolo, 20 á 30 gotas con un vaso de vino.

Vino calibreado, 3 cucharadas por dia.

Azufre lavado, 12 granos á 1 dracma.

Polvo diatraganto frio, 6 granos á 1 dracma.

Pastillas de azufre, 1 dracma á 1 onza.

Píldoras de cinoglosa, 6 á 8 granos.

——— de Morton, 1 á 6 granos.

Balsamo de Lucatel, media dracma á 2 dracmas.

Elixir pectoral. *idem*.

Gelatina de liquen islandico, 2 á 8 onzas.

Chocolate de liquen, 4 onzas.

Píldoras eméticas de Brown, 1 á 2 por la mañana.

Xarabe de hígado de azufre, de media á 1 onza.



Agua de cal, I á 4 onzas. Se da con leche ó mezclada con xarabe pectoral.

Agua de brea, 2 á 6 onzas. La misma observacion.

Xarabes balsámicos tolutanos, de lombarda, de tortuga, de caracoles, pectoral ingles, 2 dracmas á I onza y media.

Piel del asno de la China hokiak, I es-crúpulo á I dracma.

### TISIS LARINGEA. (V. CROUP.)

Eter balsámico tolutano.

Julepe escoces, á cucharadas.

Mixtura para el croup.

Pastillas del Dr. Chaussier, 4 á 6 por dia.

### TOS CONVULSIVA.

#### MEDIOS GENERALES.

Vegigatorio volante al pecho, ó pomada del Dr. Autenrieth.

Laxantes suaves.

Tártaro emético, en cortas y repetidas doses.

Opimiel escilitico.

Musco, castoreo, alcanfor, aceite de succino.

Embrocaciones de eter opiado sobre el pecho.

#### MEDIOS PARTICULARES.

Dedallera unida al opio.

Cocimiento de quina.

Xarabe de ruibarbo, á cucharadas de las de tomar café, 2 ó 3 veces al dia.

Kermes mineral, I cuarta parte de grano á medio grano mezclada con suficiente cantidad de xarabe y desleído con un poco de agua.

- Xarabe de diacodion, 1 á 4 dracmus con una  
taza de infusion de hisopo ó de poleo.
- Tintura anisada de Alibert, 1 onza á cucharadas.  
Se mezcla esta tintura con un poco  
de xarabe pectoral y un poco de agua.
- Xarabe de Desessarts, 1 onza á cucharadas  
con un poco de tisana pectoral.
- Xarabe del Dr. Maloet, á cucharadas de hora  
en hora con una taza de infusion de hisopo  
ó de flores pectorales.
- Xarabe de Rivet, *idem*.
- Xarabe para la tos convulsiva, *idem*.
- Xarabe de mil pies, *idem*.
- Xarabe contra la tos, *idem*.
- Polvos sedativos de Wetzler. (*Véase su uso  
en este volumen.*)
- Xarabe de Boullay, á cucharadas 3 ó 4 veces  
por la mañana.
- Polvos del Dr. Marc.
- Pocion del Dr. Jeanroy, 6 cucharadas por la  
mañana.
- Elixir paregórico ingles, 50 á 100 gotas

TOS SOFOCATIVA. (*V. CROUP*

## Y LA TABLA DE LAS ENFERMEDADES.)

## TUMORES ESCIRROSOS.

- Píldoras mercuriales, 2 á 3 por día.
- Xarabe de zarzaparrilla, 1 onza á onza y  
media.
- Estracto de cicuta, 2 á 3 granos. Se aumen-  
ta gradualmente la dosis todos los días (1).

---

(1) Véase la tabla de los remedios esternos.

## ÚLCERAS INTERNAS.

- Terebintina cocida, I *escrúpulo á* I *dracma en píldoras.*  
 Bálsamo de la Meca, del Perú y tolutano, *idem.*  
 Vapores, enfermedades de nervios neuroses.  
 Elixir de vitriolo, 15 *á* 30 *gotas.*  
 Cremor de tártaro soluble, 2 *dracmas á* media *onza con el agua de avena.*  
 Píldoras nitrosas alcanforadas, 10 *á* 30 *granos.*  
 Mosco, 5 *á* 20 *granos.*  
 Gotas anedinas de Inglaterra, 10 *gotas á* media *dracma.*  
 Polvos anti-espasmódicos, I *escrúpulo á* I *dracma.*  
 — de Guteta, 2 *granos á* I *dracma y media segun la edad del enfermo. (V. ESPASMO.)*

## VAPORES HISTÉRICOS.

- Píldoras de asafétida, 8 *á* 8 *granos en dos veces por dia.*  
 Polvos de Tunquin, 12 *á* 24 *granos.*  
 Elixir de propiedad de Paracelso, 6 *gotas á* media *dracma.*  
 Espíritu volátil y aromático de Silvio, 6 *á* 30 *gotas.*  
 Extracto de artemisia, 12 *granos á* media *dracma.*  
 — de valeriana, 12 *á* 48 *granos.*  
 Agua de yerba buena compuesta, I *á* 4 *dracmas.*  
 Agua general, 2 *á* 4 *dracmas.*  
 Xarabe de artemisia, 2 *dracmas á* I *onza y media.*  
 Electuario de bayas de laurel, I *escrúpulo á* 2 *dracmas.*

Píldoras histéricas, 6 granos á media dracma.  
 Boles anti-esparmódicos de Buchan, 5 á 6.  
 Píldoras anti histéricas del Dr. Selle, 5 á 8  
*mañana y tarde.*  
 Tintura de bellin, 15 á 30 gotas.  
 Esencia anti-histérica de Lemort, 20 á 40  
*gotas.*

## VÉRTIGOS.

Cerbeza cefálica inglesa, 4 á 5 vasos por día.

## VIRUELAS.

## MEDIOS GENERALES.

## Emético.

Lavativas emolientes, bebidas dulces, suero,  
 laxantes suaves.

## • MEDIOS PARTICULARES.

Antimoniales *en corta dosis.*

Elixir teriacal, 10 á 30 gotas con una bebida  
*cordial.*

Espíritu volátil y aromático de Sylvio, 6 á 30  
*gotas.*

Bálsamo del Comendador, 10 á 20 gotas so-  
*bre un terron de azucar.*

Agua general, 2 á 4 dracmas.

Xarabe de claveles compuesto, 2 dracmas á 1  
*onza y media.*

Elixir de Garus, 2 dracmas á 1 onza.

Confeccion de jacinatos, 18 granos á 1 dracma  
*y media.*

Espíritu de nitro dulcificado, 1 cucharada de  
*las de café con una bebida diurética.*

Esencia alexifarmaca de Stahl, 20 á 30  
*gotas.*

## VÓMITO.

- Espíritu carminativo de Silvio, 12 gotas á 1 dracma.  
 Conserva de rosas, 2 dracmas á 1 onza.  
 Polvo diarrodon, 12 granos á 1 dracma.  
 Opiata de Salomon, 1 escrúpulo á 2 dracmas.  
 — astringente, *idem*.  
 Poción de Riverio en dos doses.  
 Vino de quina, 1 á 3 onzas.  
 Elixir de vitriolo, 15 á 20 gotas con un vaso de vino.

## VÓMITO DE SANGRE.

## MEDIOS GENERALES.

- Bebidas astringentes y aciduladas.  
 Ligeros laxantes, como el aceyte de ricino.  
 Tintura de muriato de hierro, 30 gotas con un poco de agua fria dadas cada hora.

## MEDIOS PARTICULARES.

- Tres cucharadas de la poción siguiente, cada cuatro horas.
- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Blanco de ballena. . . . .        | 3 ℞     |
| Yema de huevo, q. s.              |         |
| Tritúrese en un mortero y añádese |         |
| Agua de poleo. . . . .            | 3 j     |
| — de fuente. . . . .              | 3 v     |
| Nitro. . . . .                    | 5 i     |
| Xarabe tolutano. . . . .          | 3 ij    |
| Tintura de opio. . . . .          | gotas 1 |



# MEMORIAL FARMACEUTICO

DE LOS MEDICAMENTOS ESTERNOS.

ABCESO.

Cataplasma emoliente *de harina, de linaza*  
*y de raiz de maizavisco.*  
 Pulpa cruda de cebolla.  
 Unguento de la madre.  
 — de Piderit.  
 — basilicon.  
 Bálsamo de genoveva.

AFTAS.

Licor del Dr. Swediaur.  
 Mixtura de Boyle.  
 Vinagre alcanforado.

ANQUILOSIS FALSA.

Linimento estimulante ingles.

APOPLEGÍA.

Bálsamo nervino.  
 Bálsamo opodeldoc.  
 Lier acético cantaridado del Dr. Double.

## B E R R U G A S.

Emplasto de cera verde.  
Lícor cáustico de Plenck.

## BLENORREA REBELDE.

Inyección del Dr. Clare.

- astringente.
- de J. Hamilton.
- de nitrato de plata *(estendido en agua.)*
- de lícor de Wansvieten *(estendido en agua.)*

## BUBONES FALSOS.

Emplasto de cicuta.

- de los cuatro fundentes.
- de Canet.
- amoníaco mercurial del Dr. Selle.

## BUBONES VENEREOS.

Cataplasma de bulbos de lirios, *mezclados de basilicon.*

Emplasto de Vigo con mercurio.

— antivenéreo de Boerhaave.

Emplasto de jabón salpicado con sal amoníaco.

— amoníaco mercurial del Dr. Selle.

## CALLOS DE LOS PIES.

Emplasto de cera verde.

— de diaquilon.

## CANCER.

Cataplasma de gualtharia reducida á pulpa.

Emplasto de cicuta.

— de vino con mercurio.

Unguento populeon.



Tintura de muriato de hierro.

Polvos de Pluncquet.

— de arsénico de Justamond (1).

## CARNOSIDAD EN EL CANAL

### DE LA URETRA.

Candelillas y sondas de goma elástica.

— emplásticas de Darau.

## CATARATA.

Colirio de Newmann.

## CAUTERIOS.

Tela de amasadera.

Papel de cauterio.

Espadrapo de Gauthier.

## CEFALALGIA, DOLOR DE CABEZA,

### JAQUECA.

Frontal somnífero.

Balsamo somnífero.

Arnica.

Polvo capital del S. Angelo.

Aqua para la jaqueca.

Luencia del Dr. Ward.

## CIATICA.

Detergente de apio.

---

(1) No se emplean estos polvos y el unguento arsenical de F. Cosme sino con precaucion en las ulcerillas y en cortisimas dosis. Se han visto envenenamientos causados por estos tónicos.

Tintura de cantaridas.

Bálsamo nervino.

—acético alcanforado de Pelletier.

Emplastro de betonica.

Xabon de Starkey.

Linimento volátil.

Emplastro de pez de Borgosia.

Unguento martiatum.

Cataplasmata isquiatica de Willis.

Linimento de Mustard.

—de Ferrier.

Agua de Gondran.

—de M. Lepremier.

Eter acético cantaridado del Dr. Double.

## CONTUSIONES, MAGULLADURAS,

### CONTORSIONES.

Bálsamo de Genoveva.

—de arceo.

—vulnerario.

—opodeldoch.

—nervino.

—de Fourcroy.

Agua de Alibour.

Fomentacion de Richter.

—de Justamond.

—aromática (cocimiento de agenjo, de laurel y de romero.)

Unguento blanco alcanforado de Viena.

Fomentacion de brionia (cocimiento de la raíz de brionia, con adiccion de vinagre y de sal marina.)

Emplastro de Andres de la Cruz.

—de betonia.

—divino.

Esencia del Dr. Ward.

Aguardiente alcanforado.  
 Espíritu de Minderero.  
 Linimento volátil.  
 Espíritu aromático de Silvio.

## CÓLICO VENTOSO.

Aceite carminativo de los Daneses.

## CROUP.

Cérato de Rechous.

## DEBILIDAD MUSCULAR.

Bálsamo sajón.  
 — de Fiorovanti.  
 — opodeldoch.  
 — nervino.  
 — de vida de Hoffman.  
 Agua de magnanimidad.  
 Bálsamo vulnerario.  
 Unguento martiatum.  
 Emplastro oxicroceum.  
 — stíptico de Crollio.  
 Aguardiente alcanforado.

## DEBILIDAD DEL OIDO.

Bálsamo acústico, aceite acústico *en inyeccion.*

## DEBILIDAD DORSAL.

Emplastro estíptico de Swediaur.

## DEBILIDAD DE LOS ÓRGANOS

## DE LA GENERACION.

Loción de agua fría.

## DESMAYOS.

Agua de luce.	} para respirar.
Amoníaco líquido.	
Eter.	
Vinagre radical.	

## DIVIESOS.

Emplastro de Richter.  
 ———— hirviendo de la Mothe.  
 ———— de Canet.

## DOLORES ARTRÍTICOS.

Bálsamo opodeldoch.  
 ———— de Sanchez.  
 ———— tranquilo de Chomel.  
 ———— anodino de Bathes.  
 Linimento estimulante ingles.

## DOLORES DE LAS ARTICULACIONES.

Bálsamo de acero.  
 ———— opodeldoch,  
 ———— nervino.  
 Aceite de laurel.  
 Unguento rosado.  
 Linimento xabonoso de Kempf.  
 Linimento de Home.

## DESOLLADAS LIGERAS,

## ESCORIACIONES.

Cerato de Turner.  
 Agua vegetal mineral.  
 Pulvis de muño de cabezuela.  
 Cera.  
 Bálsamo del Comendador.

## ESPASMO.

Linimento del Dr. Selle.

## ESCRÓFULAS. (V. TUMORES

ESCROFULOSOS, ÚLCERAS ESCROFULOSAS)

## ESQUINANCIA.

Bálsamo tranquilo de Chomei, en fricciones al  
cuello.

## ESCRECENCIAS DE CARNE, CARNES

BABOSAS DE LAS ÚLCERAS.

Alumbre calcinado en polvo.

Licor cáustico de Plenck.

## ESCRECENCIAS VENEREAS.

Licor cáustico de Plenck.

Polvos de Kruger.

## ESTRANGURIA.

Inyeccion oleosa.

Candelillas daleíricantes.

## FÍSTULA DEL AÑO.

Unguento populeon.

Opata ó pasta del Dr. Ward.

## FRACTURAS.

Agua de arcabuzazo.

Fomentacion de Richter.

## GANGRENA.

Bálsamo opodeldoch.

— de Arceo.

— de esteragüe.

— de Genoveva.

Unguento egipciaco.

Emplasto de Nuremberg.

Tintura de quina.

Vinagre alcanforado.

Emplasto de vinagre.

Unguento basilicon, *estendido con el aceite de trementina.*

Fomentacion del Dr. Richard.

GLÁNDULAS INFARTADAS, LUPIA,

PAPERAS.

(V. TUMORES.)

Emplasto diabolano.

— de cicuta.

Balsamo tranquilo de Chomel.

Collerin de Morand.

Lisimento de Hufeland.

— de Roncalli.

GOLPES DE LA CABEZA.

Agua de Bonferme, respirada y echada sobre las compresas.

Fomentacion de Richter.

GONORREA.

Inyeccion calmante.

— tónica.

— estrinjente.

— del Dr. Pingle.

— del Dr. Young.

Solucion de piedra admirable.

GOTA.

(V. REUMATISMO.)

Bálsamo de acero.

— tranquilo.

—del Dr. Sanchez.

Sinapismos.

Bálsamo acético alcanforado de Pelletier.

### GRIETAS, ARRUGAS, &c.

Bálsamo de Fourcroy.

Cerato de turner.

Pomada en crema.

—de cohombro.

—de caracoles.

—para los labios.

Cerato de Galeno.

Aceite de huevos.

### GRIETAS DE LOS PECHOS

#### Y DE LAS MANOS.

(V. GRIETAS.)

Aceite de huevos en linimento.

Unguento populeon.

Bálsamo de Fourcroy.

### GUSANOS.

Cataplasma antielmíntico.

Unguento de artanita.

Aceite acibarado batavo.

### HEMORRAGIAS.

Vincocuercino.

Polvos de Vernix.

—estípticos de Colbatch.

### HEMORROIDES.

Manteca de cacao para calar.

Unguento de Montpellier.

Opíata y pasta del Dr. Ward.

Locion de zínque alcanforada.  
 Unguento populeon, ó unguento rosado (1).  
 Linimento del Dr. Andry.  
 Unguento de Falck.  
 Supositorios de corcho quemado.

## HERPES VIVOS.

Cataplasma de pulpa de zanahorias.  
 Unguento de tabaco.  
 Emplastro de xabon y de betúnica, poniendo  
 entre los omoplatos en los herpes de la cara.  
 Pomada oxigenada.  
 Agua del cardinal de Luyne.  
 Unguento mercurial blanco de Zeiler.  
 Xabon mercurial del Dr. Chaussier.  
 Baños de agua mineral sulfurada (Barrège).  
 Cerato de Falck.

## HIDROPESÍA.

Unguento de artanita.

## INFARTOS GLANDULOSOS, PAPERAS.

## (V. GLÁNDULAS.)

Collerin de Morand.  
 Linimento de Hufeland.  
 — de Roncalli.  
 Bálsamo del caballero de la Borde.  
 Emplastro de xabon salinado de sal amoniaco.  
 Gelatina de serpiente de Russell.  
 Emplastro fundente de Lam. the.

---

(1) Linimento compuesto de populeon, 2  
 onzas: laudano, 4 dracmas: yemas de huevos,  
 n.º 2.



## INFARTO LÁCTEO.

Espíritu volátil de sal amoniacal (dilutado con agua.)

Linimento volátil.

Fomentacion de Justamondi.

## INFLAMACION DE LA PIEL, COMEZON.

Pomada en crema.

Cerato opiado.

Unguento de ponsolix.

Loción de opio.

Agua de Goulard.

## LLAGAS SIMPLES Y RECIENTES.

Emplasto de caut-chac.

—diapalma.

—de mucílago.

—de minio.

Agua estíptica.

Emplasto aglutinativo.

Esencia vulneraria.

Agua rosa para las úlceras.

—de bola.

Bálsamo de Genoveva.

—del Comendador.

Polvos de vernix.

Bálsamo Lucatel.

Unguento basilicon.

—mutatum.

—de la madre.

—de Vigo simple.

## LLAGAS ANTIGUAS.

Decurante de apio.

Digestivo de Planch.

Unguento de ponfolix.

Bálsamo de Arceo.

Unguento de propolis de Cadet.

—de estoraque.

Cerato de Saturno.

Unguento blanco rhasis.

Agua aluminosa de Bates.

### LEUCORREA, FLORES BLANCAS.

Inyeccion de Pringle.

—de Young.

Emplasto estíptico del Dr. Swediaur, *aplicado á los riñones.*

### LUPIAS.

Linimento resolutivo de Pott.

### LUXACIONES. (V. CONTUSIONES.)

Bálsamo nervino.

—opodeldoch.

Emplasto de Andres de Delacroix.

—oxicroceum.

Fomentacion aromática.

Aguardiente alcanforado.

### MAGULLADURAS.

Agua de M. Lepremier.

Esencia del Dr. Ward. (*Véase contusiones.*)

### MANCHA DEL OJO.

Colirio de Gimbernat.

### OBSTRUCCIONES.

Unguento de Agrippa.

Emplasto de cicuta.

Pomada del Dr. Fabre.

## ODONTALGIA, DOLOR DE MUELAS.

Elixir odontálgico de Leroy.

Espíritu de coclearia.

Mistura para los dientes.

Láudano.

Opio gomoso *aplicado á las caries.*

## OFTALMIA.

### MEDIOS GENERALES.

(En la oftalmia aguda.)

Sanguijuelas aplicadas á las sienes, ó ventosas escarificadas.

Minorativos *cada tres ó cuatro días.*

Pediluvios calientes.

Colirios retrecantes y astringentes, á los que se añaden, 40 ó 50 gotas de *linctura ethe-  
re de opio.*

### (EN LA OFTALMIA PURULENTA.)

Cataplasma hecha con alumina y alumbre, ó pulpa fría de patata ó de nabos raspados.

Colirio del Dr. Ware, hecho con 2 onzas de agua celeste y de agua alcanforada diluidas con cuatro onzas de agua destilada.

### MEDIOS PARTICULARES.

Bálsamo de Saint-Yves.

Agua del Dr. Yvel.

— fortificante de Selle.

Colirio de Belvecio.

— seco de Lagneau.

— de Scarpa.

— de Janin.

— de Gimbernat *para las manchas.*

—de Brun.

Pomada de Grangeand, como epispásticos *des-*  
*tras las orejas.*

—de Janin.

—de Lion.

—de Desault.

Unguento de tucia.

Linimento antiostalmico de Plenck.

(Cuando la oftalmia depende de un vicio  
venéreo, es preciso acogerse al tratamiento  
mercurial. Si es escrofulosa, se emplea la  
quina, los tónicos, &c.)

### PANADIZO.

Bálsamo de Genoveva.

Emplasto de Lamothe.

### PARÁLISIS Y LETARGIA.

Bálsamo opodeldoch.

—nervino.

Aceite de laurel.

Agua de Barnaval.

Tintura de cantaridas.

Linimento estimulante inglés.

Eter acético cantaridado del Dr. Double.

### PLEURESIA.

Unguento de altea aplicado al costado.

Cataplasma antipleurítica.

### PTIRIASIS, PIOJOS.

Unguento de mercurio simple estendido con  
pomada.

Polvos de albarraz.

### QUEMADURAS.

Cerato de Turner.

Unguento blanco alcanforado de Viena.

— populeon.

— de blanco rasis.

Bálsamo de Gencoveya.

Agua de Alibour.

Xabon amoniaco calcareo.

### RAGADES.

Licor cáustico de Plenck.

### REUMATISMO.

Bálsamo opodeldoch *en fricciones*.

— anodino de Bates, *idem*.

Aceite de laurel.

Iter acético cantaridado.

Linimento de Hore.

— de Desbois, de Rochefort.

Agua de Gondran *en baños*.

Bálsamo acético alcanforado de Pelletier.

### SABAÑONES.

#### MEDIOS GENERALES.

(Antes de ulcerarse), baños estimulantes. Agua hecha estimulante con el ácido muriático ó con la mentaza.

Fricciones con el espíritu de romero ó con la esencia de trementina.

Aplicacion de compresas empapadas con el ardiente alcanforado ó con bálsamo opodeldoch.

Untuento del Dr. Svediaur.

Unctio para los sabañones.

Unctio de almendra compuesta. *Formula para sabañones.*

Unctio del Dr. Svediaur.

Solución de sulfato ácido de alumina.  
 Cocimiento de beleño.  
 Cerato de turner.  
 Unguento de tucia.  
 Emplastro de cerusa.  
 Balsamo de Genoveva, cuando están ulcerados.  
 — tranquilo.  
 — de Fourcroy.

## SARNA.

Unguento citrino mercurial.  
 Pomada antisarnosa del Dr. Thomann.  
 Polvos antisarnosos.  
 Xabon mercurial del Dr. Chaussier.  
 Azofre lavado, partes iguales con la enjundia  
 para formar una pomada.  
 Infusion de raíz de eleboro blanco, agua mer-  
 curial *en locciones*.

## SIFILIS.

Unguento napolitano, *en fricciones*.  
 Emplastro amoniaco mercurial del Dr. Selle.  
 Pomada mercurial de Cirilo, *en fricciones*.  
 — mercurial con manteca de cacao.  
 Xabon mercurial del Dr. Chaussier.

## SORDERA ACCIDENTAL.

Bálsamo acústico.  
 Aceite acústico.

## TIÑA.

Infusion de raíz de eleboro blanco *en loccion*.  
 Leciões de agua de xabon.  
 — de agua de cal.  
 Emplastro de pez negra, como depilatorio.  
 Unguento de la Pitié.

Alumbre calcinado, *sobre los bordes babosos.*  
 Sulfato de cobre, *idem.*  
 Remedio del Dr. Bicker.

## TIMPANITIS.

Linimento volatil de Plenck.

## TOS CONVULSIVA.

Linimento de ajo.  
 Pomada del Dr. Autenrieth.

## TUMORES.

Emplasto de Canet.  
 Unguento de briania.  
 Emplasto de betónica.  
 — de meliloto.  
 — de cicuta.  
 — de xabon.  
 — de diaquilon.  
 — divino.  
 — de manus-dei.  
 — de vigo simple.  
 — de Fouquet.  
 — de pelitre de Fuller.

## TUMORES INFLAMATORIOS.

Cataplasmas emolientes.  
 Embrocaciones oleosas.

## TUMORES SIFILÍTICOS.

Aceite de laurel.  
 Unguento de tabaco.  
 Emplasto de Vigo con mercurio.  
 — amoniaco mercurial del Dr. Selle.

## TUMORES ESCIRROSOS.

Emplasto de bella dona.

## TUMORES ESCROFULOSOS.

Unguento marcial.

— de estoraque.

— digestivo.

— basilicon activado con el precipitado rojo.

Emplasto de cicuta.

— magnético.

Espíritu volátil aromático de Silvio.

Emplasto de pelitre de Fuller.

## ÚLCERAS.

Bálsamo de Genoveva, *aplicado sobre un papel de estraza.*

— Cerato de Pott.

— de Kirkland.

Cerumen del Dr. Aitken.

Agua de arcabuzazo de Thedem.

Emplasto fundente de Lamothe.

— de Fouquet.

— del abate Doyen.

Aceite verde de Metz.

Unguento de Ricour cuando son indolentes.

— de la abadía del Bec.

Bálsamo de Lucatel.

Unguento de tabaco.

Detergente de apio.

Unguento egipciaco.

— Purante de Piderit.

Emplasto de blanco de ballena.

— magnético.

— de diapalma.

— de minio.

— de Nuremberg.

— de blanco de cerusa.

Agua de Alibair.



## ÚLCERAS CANCEROSAS.

Polvos de Reusselot.

## ÚLCERAS BENIGNAS.

Agua de Goulard.

Ceromiel del Dr. Aitken.

Cerato del Dr. Hufeland.

## ÚLCERAS DE MAL CHARACTER.

Loción alcanforada.

Linimento arsenical (1).

Solución de sublimado corrosivo.

Polvos arsenicales de Justamond.

— arsenicales de Flanquet.

— antiscabimatosos del Dr. Cosme. } (2)

Disolución de muriato de cobre amoniacal.

Solución de nitrato de plata dilatada.

Agua de cal en lecciones.

Polvos de carbon.

## ÚLCERAS FÉTIDAS.

Cataplasma harinosa, mezclada por mitad con los polvos de carbon de leña.

## ÚLCERAS INVETERADAS.

Polvos de la corteza de xanthoxylon aplicada á la superficie.

---

(1) Arsénico blanco, 2 granos: aceite de olivas, 1 onza.

(2) Véase por estos tres polvos la nota de la página.

## ÚLCERAS ESCROFULOSAS.

Agua fajadénica.

## ÚLCERAS ESCORBÚTICAS.

Aguardiente alcanforado.

## ÚLCERA PÚTRIDA DE GARGANTA.

Tintura de arnica para gárgaras.

## ÚLCERAS VENÉREAS.

Unguento bruno.

—mercurial blanco de Zeller.

Cerato mercurial de Falck.

—opiado de Lagneau.

Agua de Piderit.

—de cal.

—mercurial.

—fagedénica.

## VAPORES HISTÉRICOS.

Bálsamo histérico *en fricciones*.

Emplasto antihistérico.

FIN.

# TABLA DE LOS AUTORES

## CITADOS

### EN EL FORMULARIO MAGISTRAL.

#### A.

#### Páginas.

<i>Adams</i> , licor antinefrítico. . . . .	120
<i>Aitken</i> , ceromiel. . . . .	41
<i>Alibert</i> , píldoras antisyfílticas. . . . .	161
— pomada de Turbith. . . . .	225
— pomada antisarnosa. . . . .	226
— remedio contra el tenia. . . . .	231
— tintura anisada. . . . .	253
<i>Alibour</i> , agua vulneraria. . . . .	16
<i>Alyon</i> , agua oxigenada. . . . .	7
— pomada oxigenada. . . . .	223
<i>Anderson</i> , píldoras escocesas. . . . .	169
<i>Andry</i> , pocion contra los envenenamientos. . . . .	192
— pocion purgante. . . . .	195
— linimento contra las almorranas. . . . .	115
<i>Audouart</i> , febrífugo. . . . .	101
<i>Authierich</i> , pomada contra la tos convul- siva. . . . .	226

#### B.

<i>Bacher</i> , píldoras tónicas. . . . .	152
---	-----

	Pág.
<i>Ball</i> , polvos vermífugo-purgantes. . . . .	215
<i>Bamberg</i> , tintura tebaica. . . . .	257
<i>Ballet</i> , remedio contra la tibia. . . . .	232
<i>Bastiez</i> , electuario balsámico astringente. . . . .	56
— pastillas vermífugas. . . . .	147
— píldoras blancas. . . . .	150
— píldoras emolivas. . . . .	181
— píldoras carminativas. . . . .	26
<i>Bath</i> , bálsamo atodino. . . . .	293
<i>Billet</i> , xarabe mercurial. . . . .	256
<i>Bistuchef</i> , tintura nervino-tónica. . . . .	333
<i>Black</i> , remedio contra la tibia. . . . .	204
<i>Blackman</i> , polvos estomáticos. . . . .	47
<i>Borhaava</i> , cocimiento antiseptico. . . . .	59
— electuario antifebril. . . . .	71
— elixir antiescorbático. . . . .	74
— elixir antiasmático. . . . .	82
— emplasto antivenereo. . . . .	127
— mixtura pectoral. . . . .	171
— píldoras eméticas. . . . .	185
— píldoras balsámicas. . . . .	271
<i>Bourcisin</i> , vegigatorio. . . . .	
<i>Borde</i> , (el caballero de la) bálsamo contra el reumatismo. . . . .	22
<i>Boudin de Lagrange</i> , polvos temperantes laxantes. . . . .	209
— xarabe depurativo amargo. . . . .	291
<i>Boulay</i> , molodo para imitar las aguas de Barège. . . . .	29
— píldoras contra la gonorrea. . . . .	106
— xarabe contra la tos convulsiva. . . . .	290
— xarabe vermífugo. . . . .	id.
<i>Boussier</i> , polvos vermífugos. . . . .	201
<i>Bouquet</i> , xarabe pectoral. . . . .	285
<i>Bouvier</i> , pomada dulcificante. . . . .	246
<i>Boyle</i> , mixtura contra las aftas. . . . .	132

<i>Broussonnet</i> , solución citro-muriática. . . . .	248
<i>Brown</i> , píldoras esténicas. . . . .	175
<i>Brugnatelli</i> , elixir ácido aromático. . . . .	65
— eter muriático. . . . .	94
— píldoras mercuriales. . . . .	177
— polvos vermífugos. . . . .	212
<i>Bruner</i> , mixtura antiasmática. . . . .	130
<i>Brun</i> , colirio. . . . .	49
<i>Buchan</i> , bolos antiespasmódicos. . . . .	34
— electuario antiartrítico. . . . .	60
— electuario antidisentérico. . . . .	61
— linimento de ajo. . . . .	113
— píldoras antihictéricas. . . . .	155
— píldoras laxantes. . . . .	171
— píldoras incisivas pectorales. . . . .	175
— poción diurética. . . . .	189
— tisana pectoral. . . . .	261
<i>Butler</i> , cerbeza antiescorbútica. . . . .	44

## C.

<i>Cadet</i> , emulsion para terminar las anti- guas gonorreas. . . . .	87
— mixtura odontálgica. . . . .	130
— unguento de propoleos. . . . .	265
— píldoras estomáticas. . . . .	153
— píldoras incisivas. . . . .	173
— píldoras mercuriales. . . . .	178
<i>Canet</i> , emplasto madurativo. . . . .	83
<i>Capuron</i> , píldoras astringentes. . . . .	154
<i>Carignan</i> , (princesa de) polvos. . . . .	219
<i>Caumartin</i> , (ratalla del Comendador de) . . . . .	228
<i>Chavice</i> , xarabe pectoral balsámico. . . . .	285
<i>Chastelain</i> , pastillas para el croup. . . . .	146
— xabon mercurial. . . . .	282
— trociscos. . . . .	263

<i>Cheston</i> , remedio contra el cancer de los labios. . . . .	234
<i>Chomel</i> , bálsamo tranquilo. . . . .	188
<i>Choppart</i> , pocion balsamica. . . . .	128
<i>Chilo</i> mixtura antispasmodica. . . . .	223
— pomada mercurial. . . . .	110
<i>Clare</i> , inyeccion. . . . .	251
<i>Clinton</i> , tintura febrífuga. . . . .	187
<i>Coeley</i> , píldoras antihictéricas. . . . .	9
<i>Coladon</i> , agua cordial. . . . .	214
<i>Colbatch</i> , polvos antiestépticos. . . . .	276
<i>Cornisart</i> , vino amargo diurético. . . . .	199
<i>Cosme</i> , polvos anticarcinomatosos. . . . .	78
<i>Courcelles</i> , elixir americano. . . . .	69
<i>Cresslas</i> , elixir uterino. . . . .	289
<i>Cuisinier</i> , xarabe depurante. . . . .	

## D.

<i>Daffy's</i> , tintura purgante. . . . .	250
<i>Darand</i> , candelillas medicamentosas. . . . .	36
<i>Delabonde</i> , bálsamo. . . . .	22
<i>Desaut</i> , pomada antiotálmica. . . . .	221
<i>Desbats</i> , bola fertilizante. . . . .	33
— linimento antilatrítico. . . . .	116
— bolos carcinativos. . . . .	33
— pocion emenagoga. . . . .	191
<i>Desbats</i> , xarabe contra la tos. . . . .	286
<i>Desbats</i> , eter acético emendado. . . . .	97
— píldoras de aconito mercuriales. . . . .	150
<i>Dryan</i> (del Abate), emplastro fundente. . . . .	85
<i>Dwyer</i> , polvos. . . . .	217
<i>Dubois</i> , pastillas contra la papera. . . . .	150
— vino amargo. . . . .	273
<i>Durand</i> , píldoras adolorificas, calmantes. . . . .	165
<i>Durand</i> , píldoras contra el hidrotorax. . . . .	186
<i>Durand</i> , mixtura litontrípica. . . . .	133

## E.

Eller, licor antiartrítico. . . . .	108
-------------------------------------	-----

## F.

Fabre, pomada. . . . .	222
Falk, unguento para las almorranas. . .	266
— cerato mercurial. . . . .	40
Felz, tisana antivenerea. . . . .	261
Ferriar, linimento xabonoso alcanforado. .	115
Fenillet, aceite verde de Metz. . . . .	3
Fordyce, vino compuesto. . . . .	278
Fouquet, emplastro resolutivo. . . . .	81
Fouquier, electuario hidragogo. . . . .	56
Fouquier, bálsamo contra los reuma- tismos. . . . .	22
Fournier, pocion antitetanica. . . . .	194
Frank, mixtura antiletargica. . . . .	127
— pocion antiescorbútica. . . . .	189
Fuller, agua diurética alcanforada. . . .	6
— emplastro de pelitre. . . . .	83
— julepe moscado. . . . .	111
— mixtura balsamica. . . . .	134
— vino antihidropico. . . . .	275

## G.

Gardanne, xarabe contra la tos. . . . .	286
Glabernat, colirio. . . . .	50
Gondeau, agua antiartrítica. . . . .	15
Gordon, loch. . . . .	124
Grandjean, pomada para los ojos. . . .	222
Grandjean, píldoras contra la intericia. .	155
Grandjean, mixtura de siera alcalizada. .	135
Grimaldi, polvos febrifugos. . . . .	202

	Pág.
<i>Gindre</i> , sal purgante. . . . .	247
<i>Gyms ó Jams</i> , polvos febrífugos. . . . .	201

## H.

<i>Haen</i> , píldoras purgantes. . . . .	168
— píldoras antiaqueéticas. . . . .	182
<i>Hahnemann</i> , mercurio soluble. . . . .	230
<i>Hales</i> , esencia dulce. . . . .	89
<i>Halle</i> , poción diurética. . . . .	187
<i>Haller</i> , poción de ipecacuana. . . . .	188
<i>Haly</i> , polvos calmantes. . . . .	206
<i>Hamilton</i> , inyección sedativa. . . . .	111
<i>Hartmann</i> , polvos antiaqueéticos. . . . .	205
— muriato de mercurio consen. . . . .	138
<i>Helvicus</i> , opiata estomática. . . . .	141
— píldoras de alumbre. . . . .	154
— polvos anodinos. . . . .	205
— polvos febrífugos y purgantes. . . . .	200
— polvos vomitivos. . . . .	203
<i>Heister</i> , electuario antielméntico. . . . .	58
<i>Hellmann</i> , bálsamo de vida. . . . .	27
— elixir balsámico, estomático y atem- perante. . . . .	64
<i>Heme</i> , linimento antiartrítico. . . . .	116
<i>Hoffmá</i> , cerato. . . . .	38
— linimento contra los intertos. . . . .	114
— poción contra la hidropesía. . . . .	102
<i>Holz</i> , píldoras tónicas. . . . .	185
<i>Huckam</i> , elixir antiséptico. . . . .	70
— otiope antimonial. . . . .	72
— vino emético. . . . .	252

## J.

<i>Jacobi</i> , tintura de antimonio. . . . .	254
---	-----



Pág.

<i>Jacobinos</i> de Ruan, elixir antiapopléctico. . . . .	76
<i>Jadelot</i> , baños antisóricos. . . . .	234
<i>Janin</i> , colirio. . . . .	50
— píldoras hidragogas. . . . .	172
— pomada oftálmica. . . . .	222
— vegigatorio perpetuo. . . . .	270
<i>Jeanet des Longrois</i> , crema pectoral. . . . .	54
<i>Jeanroy</i> , poción contra la tos convulsiva. . . . .	189
<i>Jébard</i> , pastillas pectorales y calmantes. . . . .	150
<i>Jaucker</i> , polvos febrífugos. . . . .	210
<i>Justamond</i> , fomentación. . . . .	103
— polvos arsenicales. . . . .	198
<i>Jussieu</i> , poción contra el esputo de sangre. . . . .	195

## K.

<i>Koup</i> , esencia escilítica. . . . .	78
— polvos de antimonio marcial. . . . .	207
— tintura antiespasmódica. . . . .	256
<i>Keyser</i> , píldoras antivenereas. . . . .	176
<i>Kirkland</i> , cerato. . . . .	40
<i>Klaproth</i> , eter acético herrado. . . . .	94
— bálsamo opodeldoch. . . . .	20
— tintura eterea. . . . .	279
<i>Knox</i> , polvos preservativos. . . . .	219
<i>Kampf</i> , linimento xabonoso. . . . .	115
— píldoras matriciales. . . . .	105
<i>Kauter</i> , polvos causticos. . . . .	202
<i>Kauter</i> , linimento diurético. . . . .	117
<i>Kuttenger</i> , baños contra el tenia. . . . .	244

## L.

<i>Laborde</i> , (el caballero de) bálsamo anti- artrítico. . . . .	22
--	----

<i>Lacombe</i> , pastillas de pelitre. . . . .	143
<i>Lagneau</i> , cerato opiado. . . . .	41
— colirio seco. . . . .	49
— pastillas de mercurio sacarino. . . . .	149
— xarabe de mercurio. . . . .	274
<i>Laroche</i> , emplastro fundente. . . . .	84
<i>Larny</i> , oriata contra la gonorrea. . . . .	142
— xarabe depurante. . . . .	289
<i>Lassus</i> , polvos tónico-incisivos. . . . .	216
<i>Le Coq</i> , vejigatorio. . . . .	272
<i>Le Gouge</i> , bálamo de vida. . . . .	26
<i>Le Roux</i> , (J. J.), píldoras incisivas. . . . .	167
<i>Levalet</i> , píldoras fundentes. . . . .	156
<i>Levert</i> , elixir antivenerico. . . . .	72
— esencia antihistérica. . . . .	90
<i>Lewis</i> , vino de guayaco elaborado. . . . .	279
<i>Lienhart</i> , espadrapo astringente. . . . .	91
<i>Linder</i> , Villermay, vejigatorios. . . . .	269
<i>Lynès</i> , agua antiherpética. . . . .	14

## M.

<i>Matartan</i> , pocion purgante y vermífuga. . . . .	193
<i>Matthias</i> , píldoras de los tres diablos. . . . .	160
— polvos estípticos. . . . .	214
<i>Maupert</i> , xarabe depurante. . . . .	252
<i>Mauret</i> , opiata vermífuga. . . . .	123
— xarabe pectoral. . . . .	286
<i>Maye</i> , febrífugo. . . . .	202
— polvos antiartríticos. . . . .	197
— polvos contra la tos convulsiva. . . . .	916
<i>Mathias</i> , elixir de vida. . . . .	63
<i>Mead</i> , electuario antiepileptico. . . . .	15
<i>Meglin</i> , remedio contra el trismo doloroso de la cara. . . . .	241
<i>Mende</i> , pocion catártica. . . . .	191

Pág.

<i>Merad</i> , píldoras contra la danza de S. Vito. . . . .	157
<i>Mesaize</i> , aguardiente purgante. . . . .	5
<i>Mithie</i> , elixir estomático. . . . .	65
<i>Morand</i> , collar contra la papera. . . . .	51
<i>Morau</i> , eter balsámico telutano. . . . .	96
<i>Moratti</i> , mercurio soluble. . . . .	230
<i>Moscatti</i> , píldoras mercuriales. . . . .	163
— tintura estomática. . . . .	258
<i>Mongenet</i> , pocion contra la afonía. . . . .	190
— polvos incisivos. . . . .	218
<i>Mustard</i> , linimento. . . . .	114
<i>Mutis</i> , cerbeza de quina. . . . .	45
<i>Mutzel</i> , mistura fundente. . . . .	134

## N.

<i>Neuman</i> , colirio. . . . .	50
<i>Nicoff</i> , remedio contra el tenia. . . . .	229
<i>Nisford</i> , pocion antinefrítica. . . . .	194

## O.

<i>Odier</i> , polvos. . . . .	213
--------------------------------	-----

## P.

<i>Paiset</i> , píldoras anticatarrales. . . . .	160
<i>Paindier</i> , bolo estomático. . . . .	34
— pasta pectoral. . . . .	144
<i>Painson</i> , agua vegetal mercurial. . . . .	8
<i>Painson</i> , bálsamo acético alcanforado. . . . .	27
— xabon acético etéreo. . . . .	282
<i>Paind</i> , polvos antiafrutivos. . . . .	217
<i>Pain</i> , píldoras anticatarrales. . . . .	161
<i>Peyrache</i> , elixir antilescrotuloso. . . . .	71

	Pág.
— remedio antivenerico. . . . .	243
<i>Piderit</i> , agua mercurial. . . . .	7
— infusion de hollin compuesta. . . . .	109
— unguento supurativo. . . . .	264
— píldoras antiespasmódicas. . . . .	159
<i>Planché</i> , método para imitar las aguas de	
<i>Barze</i> . . . . .	29
— pomada mercurial. . . . .	223
— agua eterea alcanforada. . . . .	8
<i>Pleuk</i> , digestivo. . . . .	54
— depilatorio ó ataquia. . . . .	16
— linimento antioftálmico. . . . .	115
— linimento volatil. . . . .	117
— licor cáustico. . . . .	121
— locion odontálgica. . . . .	123
— mixtura resino-xabonosa. . . . .	131
— mixtura xabonosa purgante. . . . .	id.
— unguento contra los sabañones. . . . .	265
— píldoras mercuriales. . . . .	177
— vino estomático. . . . .	274
<i>Plummer</i> , píldoras antispasmodicas. . . . .	169
<i>Plummer</i> , polvos antivenericos. . . . .	215
<i>Plumquet</i> , polvos arsenicales. . . . .	199
<i>Portal</i> , xarabe antiescorbútico. . . . .	294
<i>Pott</i> , cerato. . . . .	39
— linimento resolutivo. . . . .	114
<i>Premier</i> , (M. le) agua vulneraria. . . . .	13
<i>Preussner</i> , licor mercurial. . . . .	122
<i>Prince</i> , polvos. . . . .	230
<i>Pringle</i> , inyeccion. . . . .	109
<i>Prunier</i> , remedio contra los tumores	
crónicos. . . . .	241

## Q.

<i>Quarin</i> , cocimiento antiartrítico. . . . .	45
---	----

— electuario contra la hidropesía. . . . .	55
— emulsion contra la ciática. . . . .	86
— gargarismo contra la parálisis de la lengua. . . . .	105
— mixtura pectoral. . . . .	126
— contra la ictericia. . . . .	128
— mixtura contra la emoptisis. . . . .	132
— píldoras contra el asma. . . . .	179
— píldoras contra la epilepsia. . . . .	180
— píldoras para terminar las gonor- reas. . . . .	184
— pocion contra la tos sofocante. . . . .	191
— polvos contra la tos convulsiva. . . . .	217
— remedio contra la disenteria. . . . .	237
— remedio contra la disenteria ma- ligna. . . . .	238
<i>Quercetan</i> , agua diurética. . . . .	6

## R.

<i>Raulin</i> , elixir. . . . .	70
<i>Recheus</i> , cerato. . . . .	39
<i>Renou</i> , píldoras mercuriales. . . . .	176
<i>Reuss</i> , electuario antihemorroidal. . . . .	60
— espíritu de hollín. . . . .	93
— polvos de Tunquin. . . . .	210
— supositorios fortificantes. . . . .	249
— vinagre colchico. . . . .	250
<i>Richer</i> , balsamo astringente. . . . .	28
— fomentacion contra la gangrena. . . . .	104
— vino escilítico. . . . .	276
<i>Richter</i> , fomentacion resolutive. . . . .	103
— píldoras fundentes. . . . .	167
<i>Rissour</i> , unguento. . . . .	265
<i>Rivet</i> , xarabe pectoral. . . . .	284
<i>Rivier</i> , pocion antiemética. . . . .	333

<i>Robert-Tomas</i> , pocion contra la tos con- vulsiva. . . . .	193
— polvos contra la gastrodinia. . . . .	220
<i>Roncaldi</i> , linimento antiescrofuloso. . . . .	119
<i>Roseinstein</i> , polvos para las aínas de leche. . . . .	210
<i>Ross</i> , polvos contra los canceres. . . . .	220
<i>Russ</i> , eliope vegetal. . . . .	100
— jelaína de fuco. . . . .	105

## S.

<i>Saifert</i> , píldoras purgantes fundentes. . . . .	164
<i>Saint-Croix</i> , te de salud. . . . .	259
<i>Saint-Marie</i> , píldoras contra la gonorrea. . . . .	184
<i>Saint-Pierre</i> , bálsamo oftálmico. . . . .	24
<i>Saint-Pierre</i> , bálsamo antiatrítico. . . . .	23
— píldoras laxativo fundentes. . . . .	162
<i>Saunders</i> , legia litontrípica. . . . .	112
<i>Saurin</i> , colirio. . . . .	48
<i>Schaeffer</i> , píldoras antielmínticas. . . . .	181
<i>Schneider</i> , píldoras tartáreas. . . . .	186
<i>Schubert</i> , píldoras mercuriales. . . . .	173
<i>Schulz</i> , conserva anti-scorbática. . . . .	53
— agua oftálmica. . . . .	15
— elixir fortificante. . . . .	68
— elixir antiescorbético. . . . .	70
— elixir resolutivo. . . . .	73
— emplastro amoníaco mercurial. . . . .	85
— linimento anti-eremático. . . . .	117
— mixtura resolutive. . . . .	178
— mixtura acida. . . . .	176
— mixtura dietética. . . . .	14
— píldoras antilabiales. . . . .	183
— polvo retráctil. . . . .	216
— xarabe pectoral. . . . .	253

<i>Smellome</i> , unguento oftálmico. . . . .	269
<i>Smith</i> , bolo digestivo. . . . .	135
— píldoras tudentes. . . . .	165
— píldoras estomáticas. . . . .	182
<i>Schmecher</i> , píldoras antielmínticas. . . . .	181
<i>Spielman</i> , electuario vermilbugo. . . . .	58
— pocion para los retortijones. . . . .	195
— tintura de ruibarbo. . . . .	250
— vinagre alcanforado. . . . .	250
<i>Spina</i> , elixir de vida. . . . .	26
<i>Stahl</i> , esencia elixirarmara. . . . .	89
— polvos de cebolla albarrana com- puestos. . . . .	211
<i>Stahl</i> , bebida antilogística. . . . .	50
<i>Strahlton</i> , elixir estomático. . . . .	68
<i>Sydenham</i> , cerbea purgante. . . . .	43
— coquimiento blanco. . . . .	43
— píldoras mercuriales. . . . .	158
<i>Swedner</i> , bolo contra la parálisis. . . . .	55
— emplastro de canchuc. . . . .	11
— emplastro eslipirico. . . . .	84
— ilesa contra las añas. . . . .	133
— unguento por los cabalones. . . . .	108
— píldoras cefálicas. . . . .	184
— polvos anti-épticos. . . . .	200

## T.

<i>Theden</i> , agua de arcabuzazo. . . . .	10
<i>Thénard</i> , eter marfático. . . . .	95
— vinazame. . . . .	137
<i>Thénard</i> , pomada epianética. . . . .	207
<i>Thénard</i> , pomada anti-errática. . . . .	12
<i>Tilley</i> , opiate antileucorréica. . . . .	140
— opata fibrilloga. . . . .	141
<i>Tissot</i> , agua purgante. . . . .	5

	Pág.
<i>Trenchin</i> , crema pectoral. . . . .	54
— mermelada purgante. . . . .	125
— tablillas anticatarrales. . . . .	249
<i>Turner</i> , cerato. . . . .	38

## V.

<i>Vanbelsmont</i> , polvos de cebolla albarrana	214
nitrados. . . . .	129
<i>Van-Swieten</i> , mixtura hidragoga. . . . .	31
<i>Van-mont</i> , bebida antiparcótica. . . . .	137
— muriato de amoniaco cobrizo. . . . .	219
<i>Vernix</i> , polvos astringentes. . . . .	174
<i>Vic-d'Azar</i> , píldoras antiartríticas. . . . .	id.
— píldoras fundentes. . . . .	262
<i>Vigancus</i> , tisana. . . . .	260
<i>Vinache</i> , tisana purgante. . . . .	57
<i>Vogler</i> , electuario antielmíntico. . . . .	242
— remedio odontálgico. . . . .	257
— tintura con legia. . . . .	
<i>Willow</i> , (Madama de la) agua para los	12
dientes. . . . .	

## W.

<i>Wind</i> , electuario anticaquectico. . . . .	57
— esencia. . . . .	90
— opiata para las almorranas. . . . .	142
<i>Warrick</i> , polvos purgantes. . . . .	203
<i>Waters</i> , vegigatorio. . . . .	271
<i>Wedel</i> , aceyte bezoardico. . . . .	1
<i>Wedelius</i> , esencia carminativa. . . . .	89
— polvos pectorales. . . . .	204
<i>Werkard</i> , solución antivenerica. . . . .	247
<i>Wetter</i> , remedio antilacteo. . . . .	242
<i>Wierhoff</i> , elixir balsamico. . . . .	67



— polvos corroborantes. . . . .	202
Wetzler, polvos sedativos. . . . .	206
Witt, elixir febrífugo. . . . .	77
— linimento carminativo. . . . .	113
— mixtura contra los cálculos biliares. . . . .	132
Wilkinson, electuario antidisentérico. . . . .	61
Willis, cataplasma esquiática. . . . .	37
— elixir sudorífico. . . . .	72
— emulsion antiartrítica. . . . .	86
— píldoras antidisentéricas. . . . .	153
— pocion capivi. . . . .	194
— xarabe sulfuroso. . . . .	256
— xarabe caliveado. . . . .	id.
Wilson, purgante. . . . .	237
Withering, píldoras de dedalera. . . . .	163

## Y.

Young, inyeccion. . . . .	110
Yzel, agua para los ojos. . . . .	14

## Z.

Zanetti, mermelada purgante. . . . .	125
Zeller, unguento mercurial blanco. . . . .	202

# TABLA DE LAS FÓRMULAS

## CONTENIDAS

### EN EL FORMULARIO MAGISTRAL.

#### A.

	Páginas.
	I
Aceite bernárdico de Wedel. . . . .	id.
Aceite carminativo etéreo de los Dia-	2
marcos. . . . .	id.
Aceite de Burado bávaro. . . . .	3
Aceite cáustico. . . . .	4
Aceite verde de Metz o de Poullet. . . . .	5
Aguardiente alemán. . . . .	id.
— preparado de M. Mezaize . . . . .	6
Agua de Trevez. . . . .	id.
— de Quercetan. . . . .	7
— Alimética alcanforada. . . . .	id.
— llamada originaria d'Alion. . . . .	8
Alcohol de Foderit. . . . .	id.
— vegetal mercurial de Peruvín. . . . .	9
— etéreo alimentario de Planche. . . . .	10
— cordón de Coladen. . . . .	11
— de arrabazado de Thelen. . . . .	id.
Agua emulsionada d'Asbati. . . . .	12
— de masticadura. . . . .	13
— de Madame de la Villière para los	14
dientes. . . . .	

— de M. Le-Premier. . . . .	13
— de Pontermé o d'Almagnac. . . . .	id.
— antitérpéctica del Cardenal de Luy- nes. . . . .	14
— para los ojos por el Dr. Yvel. . . . .	id.
— catálmica tórtíficante del Dr. Selle. . . . .	15
— de Gendran. . . . .	id.
— d'Alibour. . . . .	16
Atanquia de Plenck. . . . .	16
Azúcar naranjado pargante. . . . .	17

## B.

Bálsamo de Genoveva. . . . .	18
— de Rirour. ( <i>Pâte unguento.</i> ) . . . . .	
— de . . . . .	19
— acústico. . . . .	id.
— de . . . . .	20
— del caballero de Laborde ó de Laur- croy. . . . .	22
Bálsamo antiartrítico del Dr. Sanchez. . . . .	23
— olfáctico de Saint-Yves. . . . .	24
— tranquilo del Dr. Chirac. . . . .	id.
— acético alcanforado del Dr. Feltier. . . . .	25
— anodino de Bothe. . . . .	26
— de vida de Lelievre, o elisir de Spina. . . . .	id.
— de vida de McFinn. . . . .	27
— atringente de Richard. . . . .	28
— de vida . . . . . ( <i>Para Linimento es- timulante topical.</i> ) . . . . .	
— para de . . . . . ( <i>Para . . . . .</i> ) . . . . .	28
— . . . . .	
Bebida nutritiva de . . . . .	30
— . . . . . del Dr. Van-Ness. . . . .	31
Berechos pargantes. . . . .	id.

	Pág.
—vermífugas. . . . .	32
Bolo diaforético inglés. . . . .	id.
—fortificante de Desbois. . . . .	33
—carminativo de Desbois de Rochefort. . . . .	id.
—estomático de Parmentier. . . . .	34
—antiespasmódico de Buchan. . . . .	id.
Otro del mismo. . . . .	id.
—digestivo de Smith. . . . .	35
—de Swediaur contra la parálisis. . . . .	id.

## C.

Candelillas de Parac. . . . .	36
Cataplasma antieiméntica. . . . .	37
—isquiática. . . . .	id.
Cerato de Hufeland. . . . .	38
—de Turner. . . . .	id.
—de Pott. . . . .	39
—de Rechoux. . . . .	id.
—mercurial de Falck. . . . .	40
—de Kirkland. . . . .	id.
—opiado del Dr. Lagneau. . . . .	41
Cernímel del Dr. Aitken. . . . .	id.
Cereza estomacal inglesa. . . . .	42
—diurética inglesa. . . . .	id.
—purgante inglesa. . . . .	id.
—antiescorbútica ó abeta. . . . .	43
—purgante de Sidenham. . . . .	id.
—antiescorbútica de Butler. . . . .	44
—cefálica inglesa. . . . .	id.
—de quina de Mutis llamado profiláctica. . . . .	45
Cosimento antiartrítico de Quarin. . . . .	id.
—de albar compuesto. . . . .	46
Cosimento antiséptico de Boerhaave. . . . .	47
—blanco de Sidenham. . . . .	48

	Pág.
Colirio del Dr. Scarpa. . . . .	id.
— de Brun. . . . .	49
— seco del Dr. Lagneau. . . . .	id.
— de Janin. . . . .	50
— de Gimbernát. . . . .	id.
— del Dr. Newmann. . . . .	id.
Collar de Morand contra la papera. . .	51
Confeccion japónica. . . . .	id.
— japónica segun la farmacopea de Edimburgo. . . . .	52
Confeccion de ruda. . . . .	53
Conserva antiescorbútica del Dr. Selle. .	id.
Crema pectoral de Tronchin. . . . .	54
Otra de M. Jequet des Longrois. . . .	id.
Digestivo de Plenck. . . . .	id.

## E.

Electuario de Quarin, contra la hidro- pesia. . . . .	55
Otro del mismo. . . . .	id.
Otro del mismo. . . . .	56
Electuario hidragogo del Dr. Fouquier. .	id.
— balsámico astrigente de Barthéz. .	id.
— antiaquilectico del Dr. Ward. . . .	57
— antihelmíntico de Vogler. . . . .	id.
— vermífugo de Spelman. . . . .	58
— antihelmíntico de Heister. . . . .	id.
— antifebril F. de V. . . . .	59
— de magnesia F. de C. . . . .	id.
— antifebril de Boerhaave. . . . .	60
— antiastrúctico de Buchan. . . . .	id.
— antihemorroidal de Reuss. . . . .	id.
— antidiarréico de Buchan. . . . .	61
— antidiarréico de Wilkinson. . . . .	id.
— antiepiléptico de Mead. . . . .	62

	Pag.
Elixir de vida de Matielo. . . . .	id.
— alkermes de los italianos. . . . .	63
— de droga amarga de los indios. . . . .	64
— de Nithié. . . . .	65
— ácido aromático de Brugnatelli. . . . .	id.
— pectoral ingles. . . . .	66
Elixir balsámico, estomático y tem- perante de Hoffman . . . . .	67
— balsámico de Wertheff. . . . .	id.
— fortificante del Dr. Selle. . . . .	68
— estomático de Soughton. . . . .	id.
— sapido. . . . .	69
— uterino de Crollius. . . . .	id.
— de Faallu. . . . .	70
— antiscorbútico del Dr. Selle. . . . .	id.
— antiscorbútico de Boerhaave. . . . .	71
— antiscrofúlico de Perille. . . . .	id.
— antiveréreo de Lemert. . . . .	72
— aduocato del Dr. Willis. . . . .	id.
— antieético o febrífugo de Huxham. — resolutivo del Dr. Selle. . . . .	73
— antiaamático de Boerhaave. . . . .	74
— parepórico de Londres. . . . .	75
— parepórico de Edimburgo. . . . .	76
— antipeptico de los jacobinos de Ruan. . . . .	id.
— febrífugo de Whitt. . . . .	77
— láctico de Fulle. . . . .	id.
Elixir americano de Courcelles. . . . .	78
— antidartórico de la isla de Francia. . . . .	79
Emplastro de Faquet. . . . .	80
— antileucórico. . . . .	id.
— de cataplasma de Svedianus. . . . .	81
— de ventres de Boerhaave. . . . .	82
— de gellre de Faller. . . . .	id.
— de Canet. . . . .	83

	Pág.
—fundente de la Mothe. . . . .	84
—estíptico de Swediaur. . . . .	id.
—del abate. . . . .	85
—amoníaco mercurial del Dr. Selle. .	id.
Emulsion de Quarin contra la ciática lombár. . . . .	86
—del Dr. Willis contra los efectos reu- máticos. . . . .	id.
—de Cadet. . . . .	87
Esencia escilítica de Keup. . . . .	id.
—dulce de Hales. . . . .	88
Esencia carminativa de Wedelius. . . .	89
—alexifarmaca de Sibal. . . . .	id.
—del Dr. Vard. . . . .	90
—antihistérica de Lemert. . . . .	id.
Esudrapo astrupente de Loustenau. .	91
Especies verubíge. . . . .	92
—pro te (especies prothea). . . . .	id.
Esdríta de hallin de Reau. . . . .	93
—etereo aromático. . . . .	id.
Esdrético ferruginoso de Laproth. . .	94
—muriático de Bagnavelli. . . . .	id.
—muriático de Thoard. . . . .	95
—balsámico volúmeno del Dr. Moreau. .	96
—acético camomila del Dr. Daulhe. .	97
—muriático terribolítico. . . . .	98
Esdrético cataplasma de Huxham. . . .	99
—vegetal de Rumb. . . . .	100
Extracto de colocynthas compuesto. .	101

## F.

Febriífico del Dr. Audoyart. . . . .	id.
—del Dr. Mary. . . . .	102
Fébrico resolutorio de Richter. . . . .	103
—del Dr. Jannmann. . . . .	id.

	Pág.
—del Dr. Richard contra la gangrena.	104
Frontal hipnotico. . . . .	id.

## G.

Gargarismo de Quarin. . . . .	105
Ceratina de Fuco de Russel. . . . .	id.
—de lombardas. . . . .	106
—de liquen. . . . .	107
—vermifugo de musgo de Córcega. . . . .	id.
Gotas de Eller, ó licor antiartrítico. . . . .	108

## I.

Infusion de hollin compuesta de Piderit.	109
Inyeccion del Dr. Pringle. . . . .	id.
—del Dr. Young. . . . .	110
—del Dr. Clare. . . . .	id.
—sedativa del Dr. Hamilton. . . . .	111

## J.

Julepe moscado de Fuller. . . . .	111
Julepe escoces para el croup. . . . .	112

## L.

Legia litontríptica de Saunder. . . . .	id.
Linimento de ajo. . . . .	113
—carminativo de Whitt. . . . .	id.
—de Mustard. . . . .	114
—regulativo de Pott. . . . .	id.
—de Hufeland contra los infartos. . . . .	id.
—contra las almorranas de Handry. . . . .	115
—antiottálmico de Plenck. . . . .	id.
—xabonoso de Kaempl. . . . .	115



Pág.

— antiartrítico de Home. . . . .	116
— antiartrítico de Desbois de Rochefort. . . . .	id.
— volatil de Plenck. . . . .	117
— diurético de Kuser. . . . .	id.
— antiespasmodico del Dr. Selle. . . . .	id.
— xabonoso alcanforado de Ferriar. . . . .	118
— estimulante ingles. . . . .	id.
— de Roncalli. . . . .	119
Licor amoniacoal anisado. . . . .	120
— antineurítico del Dr. Adams. . . . .	id.
— cáustico de Plenck. . . . .	121
— del Dr. Swediaur para las aftas. . . . .	122
Licor de Pressavin. . . . .	id.
Locion odontalgica de Plenck. . . . .	123
— contra la tiña. . . . .	id.
Loch de almidon. . . . .	124
— xabonoso. . . . .	id.
— de Gordon. . . . .	id.

## M.

Mermelada de Tronchin. . . . .	125
— de Zanetti. . . . .	id.
Mixtura pectoral de Quarin. . . . .	126
— pectoral de Boerhaave. . . . .	127
— antileptica del Dr. Franck. . . . .	id.
— de Quarin para la ictericia. . . . .	128
— antisindrica de Cirilo. . . . .	id.
— resolativa del Dr. Selle. . . . .	id.
— anticatarral ruso. . . . .	129
— hidropica de Wansvieten. . . . .	id.
— odontalgica de Cadet. . . . .	130
— antiasmatica de Bruner. . . . .	id.
— catártica arabe. . . . .	id.
— resino-xabonosa de Plenck. . . . .	131
— xabonosa purgante del mismo. . . . .	id.

	Pág.
—de Quarin contra la emoptisis. . . . .	132
Mixtura de Poile contra las aftas. . . . .	id.
—de Whitt contra los calculos biliares. . . . .	id.
—litontrípica de Berande. . . . .	133
—balsámica de Fuller. . . . .	134
—fundente de Metzel. . . . .	id.
—de mirra alcalizada de Grifitz. . . . .	135
—para el croup. . . . .	id.
—ácida del Dr. Selie. . . . .	136
—diatrocética del mismo. . . . .	id.
Muriato de amoníaco corrizo. . . . .	137
—de amoníaco y de hierro. . . . .	id.
—de oro y sal. . . . .	138
—concen de mercurio de Hartmann. . . . .	id.

## O.

Ozímíel pectoral de los Daneses. . . . .	139
—pectoral de Edimburgo. . . . .	id.
Oplata vermífuga del Dr. E. . . . .	140
—contra la leucorrea. . . . .	id.
—estomacal de Helvetius. . . . .	141
—hybrido de Tissot. . . . .	id.
—del Dr. Larey. . . . .	142
Oplata ó pasta del Dr. Ward. . . . .	id.
—de vermífugo de Tissot. . . . .	143
Osmazoma de Thenard. . . . .	id.

## P.

Pasta pectoral de Parmentier. . . . .	144
—contra los tabacos. . . . .	id.
Pastillas de Mr. Chandler. . . . .	145
—de mala campaba. . . . .	id.
—mogolas. . . . .	146
—vermífugas de Bartz. . . . .	id.

— de pelitre del Dr. Lacombe. . . . .	248
— de Ginsen. . . . .	id.
— de mercurio sacarino del Dr. Lagneau. . . . .	149
— del Dr. Dubois. . . . .	150
— pectorales del Dr. Jabard. . . . .	id.
Píldoras febrífugas iogénas. . . . .	151
— de escila compuestas. . . . .	id.
— tónicos de Bacher. . . . .	152
— estomacales de Cadet. . . . .	153
— tónicas de Stoll. . . . .	id.
Píldoras antidisentéricas del Dr. Willis. . . . .	id.
— astringente de Capuron. . . . .	154
— de alumbre de Helvetius. . . . .	id.
— antibióticas de Buchan. . . . .	155
— de Greding contra la ictericia. . . . .	id.
— fundentes de Lemonier. . . . .	156
— de acónito mercuriales del Dr. Dou-	
ble. . . . .	id.
— del Dr. Merat. . . . .	157
— orientales. . . . .	158
— marciales de Siderham. . . . .	id.
— antiespasmódicas de Piderit. . . . .	159
— de los tres diábolos de Mastaldi. . . . .	160
— anticatarrales del Dr. Parinet. . . . .	id.
— anticatarrales del Dr. Petit. . . . .	161
— antisifilíticas de Allibert. . . . .	id.
— laxantes de Sanchez. . . . .	162
— mercuriales de Mourati. . . . .	163
— purgantes del Dr. Allibert. . . . .	164
— astringentes de Kenyff. . . . .	165
— sudoríficas de Mr. Dameril. . . . .	id.
Píldoras de Baillie. . . . .	166
— fundentes del Dr. Smith. . . . .	id.
— fundentes de Richter. . . . .	167
— laxantes del Dr. J. J. Le-Roux. . . . .	id.
— de digital de Wallering. . . . .	168

	Pág.
— píldoras purgantes de Haen. . . . .	id.
— de Plumier. . . . .	169
— escoceras . . . . .	id.
— eméticas de Boerhaave. . . . .	171
— laxantes de Bucham. . . . .	id.
— hidragogas de Janin de Lion. . . . .	172
— escíticas. . . . .	173
— incisivas de Cadet. . . . .	id.
— antiartríticas de Viq d'Azir. . . . .	174
— fundentes del mismo. . . . .	id.
— esténicas de Brown. . . . .	175
— incisivas de Bucham. . . . .	id.
— de Keys er. . . . .	176
— mercuriales de Renou. . . . .	id.
— mercuriales de Brugnattelli. . . . .	177
— mercuriales de Plenck. . . . .	id.
— mercuriales del Dr. Sedillot. . . . .	178
— mercuriales de Cadet. . . . .	id.
— de Quarin contra el asma. . . . .	179
— antiépilépticas inglesas. . . . .	id.
— de Quarin contra la epilepsia. . . . .	180
— blancas de Barthez. . . . .	id.
— carminativas del mismo. . . . .	181
— antiolémicas de Schmucher. . . . .	id.
— antiopúscas de Haen. . . . .	182
— estomacicas de Smith. . . . .	id.
— tónicas del Dr. Huhn. . . . .	183
— coenzas de Svediaur. . . . .	id.
— del Dr. Sainte-Marie. . . . .	184
— de Quarin para terminar la gonor- rea. . . . .	id.
— antihistéricas del Dr. Selle. . . . .	185
— balsámicas de Boerhaave. . . . .	id.
— tartáreas de Schroder. . . . .	186
— del Dr. Dupuy contra el hidrotorax. . . . .	id.
— antihistéricas del Dr. Coeroloy. . . . .	187

Pocion diurética de M. Halle. . . . .	id.
— del Dr. Andry. . . . .	id.
— balsámica de Chouppart. . . . .	188
— de ipecacuana de Haller. . . . .	id.
Pocion diurética de Bucham. . . . .	189
— de M. Jeanroy. . . . .	id.
— antiescorbútica del Dr. Franck. . . . .	id.
— laxante de Viena. . . . .	190
— del Dr. Mongenot contra la afonía. . . . .	id.
— catártica del Dr. Mende. . . . .	191
— emenagoga de Desbois. . . . .	id.
— de Quarin contra la tos sofocante. . . . .	id.
— de Hateland. . . . .	192
— del Dr. Andry contra los envenenamientos, por los ácidos minerales. . . . .	id.
— contra la tos convulsiva. . . . .	193
— contra el tenia. . . . .	id.
— purgante del Dr. Macartan. . . . .	id.
— antitetánica de Fournier. . . . .	194
— antipeétrica del Dr. Williams Norford. . . . .	194
— capivi dada por Willis. . . . .	id.
— de Jussieu contra el esputo de sangre. . . . .	195
— de Spielman contra los retortijones de los niños. . . . .	id.
— purgante del Dr. Andry. . . . .	id.
— antiemético de Rivero. . . . .	196
Polvos antiartríticos del Dr. Marc. . . . .	197
— antiácidos. . . . .	id.
— arsenicales de Jostamond. . . . .	198
— anticarcinomatosos de F. Cosma. . . . .	199
— arsenicales de Pluquet. . . . .	id.
— antiépticos de Syedlaur. . . . .	200
— de princepe. . . . .	id.
— febrífugos de Helvetius. . . . .	id.
— febrífugos de Boullemer. . . . .	201

	Pág.
—de Gyms ó James. . . . .	201
—de Grimaldi. . . . .	202
—corroborantes de werlhoff. . . . .	id.
—cáusticos de Kruger. . . . .	id.
—del conde de Warwick. . . . .	203
—anticatarrales de la F. de V. . . . .	id.
—vomitivos de Helvetius. . . . .	id.
—estomacales de Brickmann. . . . .	204
—pectorales de Wedelius. . . . .	id.
—diaromaton ingles. . . . .	id.
—anticaquécticos de Hartmann. . . . .	205
—anodinos de Helvecio. . . . .	id.
—de Haly. . . . .	206
—sedativos de Wetzler. . . . .	id.
—de antimonio marcial diaforético de Keup. . . . .	207
—del Dr. Mongenot. . . . .	208
—temperantes laxantes del Dr. Beui- llon Lagrange. . . . .	209
—de Tunquin <i>Reuss</i> . . . . .	210
—de Rosenstein para las amas de leche. . . . .	id.
—febrífugos de Juncker. . . . .	id.
—de cebolla albarrana compuestos de Stahl. . . . .	211
—del conde de Palma. . . . .	212
—vermífugos de Brugnatelli. . . . .	id.
—de Kino compuestos F. L. . . . .	id.
—polvos de Odier. . . . .	213
—de creta compuestos F. L. . . . .	id.
—de cebolla albarrana nitrados de Van- helmont. . . . .	214
—emlípticos de Colbatch. . . . .	id.
—de Pummer . . . . .	215
—de mercurio azucarado del Dr. Lag- ner. . . . .	id.
—vermífugos purgantes de Wall. . . . .	215

—vermífugos de estaño. . . . .	216
—tónico incisivo del Dr. Lassone. . . . .	id.
—de Douver. . . . .	217
—antiacnéicos de Perard. . . . .	id.
—de Quarin contra la tos convulsiva. . . . .	id.
—del Dr. Marc. . . . .	218
—ecfráticos del Dr. Selle. . . . .	id.
—de la princesa Carignan. . . . .	219
—de Vernix. . . . .	id.
—de Knox. . . . .	id.
—de Rouselot contra el cancer. . . . .	220
—del Dr. Robert-Tomas. . . . .	id.
Pomada antioftálmica de Desault. . . . .	221
—de Lion para los ojos. . . . .	id.
—oftálmica de Janin. . . . .	222
—de Grandjean. . . . .	id.
—del Dr. Fabre. . . . .	222
—oxigenada de Alion. . . . .	223
—mercurial de manteca de cacao. . . . .	id.
—mercurial de Cirilo. . . . .	id.
—de la condesa ó pomada virginal. . . . .	224
—de la soltana. . . . .	225
—de turbilh del Dr. Alibert. . . . .	2id.
—anti-arnica del Dr. Alibert. . . . .	26
—del Dr. Boyer. . . . .	id.
—del Dr. Autenrieth contra la tos con-	
vulsiva. . . . .	id.
—antiarraca del Dr. Thomann. . . . .	227
—de Thierry. . . . .	id.
Purgante del Dr. Wilson. . . . .	id.
Rataña del Comendador de Caumartin	
contra las arenillas. . . . .	228
—de los Caribes. . . . .	229

## R.

Remedio de madama Nouffer contra el

	Pág.
tenia. . . . .	229
—antisifilítico de Hanemann. . . . .	230
—contra el tenia. . . . .	231
—del Dr. Barlow contra la tiña. . . . .	232
—de Bicker contra la tiña. . . . .	233
—antisórico del Dr. Jadelot. . . . .	234
—del Dr. Cheston contra el cancer de los labios y las úlceras malignas. . .	id.
—de la caridad para la cólica de los pintores. . . . .	235
—de Quarin contra la disenteria. . . . .	237
—del mismo en la disenteria maligna. . .	238
—contra el atosigamiento por los hongos. .	239
—del Dr. Meglin &c. . . . .	241
—de Purman contra los tumores crónicos de las articulaciones. . . . .	id.
—antilacteo de Weiss. . . . .	242
—odontalgico de Vogler. . . . .	id.
—antivenéreo del Dr. Peyrilhe. . . . .	243
—contra el tenia. . . . .	id.
—del Dr. Kuttinger contra el tenia. . .	244
—contra los accidentes ocasionados por los hongos. . . . .	245
—contra el tialismo. . . . .	246

## S.

Sal de Gindre. . . . .	247
Solucion antivenérea de Weikard. . . .	id.
—citromuriática de Broussonet. . . .	248
—arsenical de Prusia. . . . .	id.
Supositorios fortificantes de Reuss. . .	249
—contra las almorranas. . . . .	id.

## T.

Tablillas anticatarrales de Tronchin. .	id.
---	-----



Tintura de Daffys. . . . .	250
— de ruibarbo de Spielman. . . . .	id.
— sagrada. . . . .	251
— febrífuga de Clutton. . . . .	id.
— de espliego compuesta de Londres. . . . .	252
— nervino tónica de Bestuchef. . . . .	id.
— de hollin de Edimburgo. . . . .	253
— anisada del Dr. Alibert. . . . .	id.
— volatil de guayaco de Londres. . . . .	254
— de antimonio de Jacobi. . . . .	id.
— de malato de hierro. . . . .	255
— de almáciga compuesta. . . . .	id.
— nervino-tónica de Berlin. . . . .	256
— antiespasmódica de Keup. . . . .	id.
— de ruibarbo inglesa. . . . .	257
— tebaica de Bamberg. . . . .	id.
— con legia de Vogler. . . . .	id.
— estomacal de Morcati. . . . .	257
— estomática amarga de Edimburgo. . . . .	id.
— de cardamomo compuesta. F. L. . . . .	259
— eterea de Klaproth . . . . .	id.
Te de salud de M. de Sain-Germain. . . . .	id.
Tisana de Vinache. . . . .	260
— regia. . . . .	id.
— de Felz. . . . .	id.
— de Bucham. . . . .	id.
— de Vigarous. . . . .	262
Trociscos del Dr. Chaussier. . . . .	263

## U.

Unguento de Montpellier. . . . .	id.
— blanco alcanforado de Viena. . . . .	264
— epispástico sin cantáridas. . . . .	id.
— de Piderit. . . . .	id.
— de propuleos de Cadet. . . . .	265
— de Plenck contra los sabañones. . . . .	id.

—de Falck contra los tumores hemor- roidales. . . . .	266
—mercurial de Zeller. . . . .	id.
—de Ricour. . . . .	id.
—de la misericordia contra la tiña. . . . .	267
—de la abadia del Bec. . . . .	268
—del Duque. . . . .	id.
—del Dr. Svediaur para sabañones. . . . .	id.
—oftálmico de Sinellome. . . . .	269

## V.

Vegigatorios de Louver-Villermay. . . . .	id.
—perpetuo de Janin. . . . .	270
Vegigatorio ingles. . . . .	271
—de M. Wanters. . . . .	id.
—de M. Bonvoisin. . . . .	id.
—de Lecompte. . . . .	272
—amoniacal. . . . .	id.
—vino de Huxham. . . . .	273
—febrífugo de S. . . . .	id.
—amargo ó elixir de Dubois. . . . .	id.
—febrífugo. . . . .	274
—amargo. . . . .	id.
—estomático de Plenck. . . . .	id.
—antihidropico de Fuller. . . . .	275
—entileucorráico. . . . .	id.
—esclítico de Richart. . . . .	276
—amargo y diurético de Corvisart. . . . .	id.
—antiapoplético. . . . .	277
—amargo y diurético de la caridad. . . . .	id.
—del Dr. Fordyce. . . . .	278
—de reibarbo compuesto. . . . .	id.
—anti icterico ó contra la ictericia. . . . .	id.
—diurético ingles. . . . .	279
Vino de guayaco elaborado del Dr. Le- wis. . . . .	id.

Pág.

Vinagre colchico de Reuss. . . . .	280
— alcantorado de Spielman. . . . .	id.
— bezoárdico de Berlin. . . . .	281

## W.

Wakaka de las Indias. . . . .	id.
-------------------------------	-----

## X.

Xabon mercurial del Dr. Chaussier. . . . .	282
— acético etero del Dr. Pelletier. . . . .	id.
Xarabe pectoral dulcificante del Dr. Selle. . . . .	283
— pectoral resolutivo del Dr. Selle. . . . .	id.
— pectoral para la tos convulsiva. . . . .	284
— pectoral ingles. . . . .	285
Xarabe pectoral balsámico de Charles. . . . .	id.
— pectoral de Bouvart. . . . .	id.
— del Dr. Desessarts contra la tos de los niños. . . . .	286
— del Dr. Gardane contra la tos. . . . .	id.
— de mil pies. . . . .	287
— pectoral del Dr. Maloet. . . . .	288
— de ligado de azufre. . . . .	id.
— de Cuisinier. . . . .	289
— depurativo del Dr. Larey. . . . .	id.
— contra la tos convulsiva por Bouliay. . . . .	290
— vermifugo de Bouliay. . . . .	id.
— antiartrítico y antilicórpico. . . . .	291
— depurativo amargo de Baillon de la Grange. . . . .	id.
— vinoso cardiaco de Wirtenberg. . . . .	292
— depurativo de M. Majault. . . . .	id.
— de Belet. . . . .	293
— de mercurio pomoso del Dr. Lameau. . . . .	294
— antiescorbútico del Dr. Portal. . . . .	id.
— vermifugo purgante. . . . .	295
— antiasmático. . . . .	id.
— de Willis. . . . .	296
— calibreado ó acerado de Willis. . . . .	id.



# T A B L A

## DE LAS ENFERMEDADES.

---

### A.

Abceso, 383.

Adinamia (*Véase* caquexia.)

Agüas, 280, 132, 122, 383.

Atonia, 190, 96, 301.

Agrios del estómago, 59, 301.

Amaurosis, 99.

Amenorrea, 69, 365, 302.

Anasarca, 302.

Angina tonsilar, 303.

—— maligna, 303.

—— traquéal, 323, 304.

Anquilosis, 22.

Apéndice gástrico, 42, 43, 31, 101, 131,  
104, 109, 190, 203, 216, 247, 17, 250,  
259, 314.

Apoplejía sanguínea, 11, 76, 97, 277, 306,  
383.

—— serosa, 307.

Artrodinia, 118.

Ardor (*Véase* hidropesía), 227.

Asma, 74, 109, 122, 124, 130, 139, 179,  
188, 211, 295, 307.

Astepla, 204, 252.

Atrofia, 99, 257.

B.

Berrugas, 202, 121, 384.  
 Blenorrea, 33, 134, 188, 278, 384, 309.  
 Bubones venéreos, 82, 85, 384.

C.

Caida del intestino recto, 249.  
 Calambres de estómago, 111, 309.  
 Calentura adinámica, 65, 77, 89, 135, 201,  
 248, 275, 309.  
 —intermitente, 59, 60, 67, 73, 102,  
 128, 151, 171, 248, 200, 201, 202,  
 210, 251, 273, 274, 110.  
 —remitente, 312.  
 —continuas, 313.  
 —inflamatoria, 116, 30, 313.  
 —nerviosa (tifo leve), 314.  
 —pútrida y maligna (tifo confirmado), 6,  
 248, 280, 314.  
 —escarlatina, 315.  
 —miliar, 316.  
 —urticata, 316.  
 Callus de los pies, 284.  
 Cálculos biliares, 98, 132, 133, 316.  
 —de la vejiga, 316.  
 Cáncer, 220, 234, 384, 316.  
 Carcinoma, 99, 199.  
 Cardialgia, 254, 187.  
 Curvadura del canal de la uretra, 36.  
 Catarata, 50, 385.  
 —agudo, 57, 75, 317.  
 —crónico, 99, 105, 317.  
 —crónico, 75, 123, 129, 139, 144, 151,

- 160, 166, 173, 203, 204, 208, 211, 268,  
242, 317.  
— de la vejiga, 318.  
**Cauterios**, 385.  
**Cefalalgia**, 90, 104, 318, 385.  
**Cística**, 20, 25, 26, 37, 86, 116, 385.  
**Cistitis**, 355.  
**Clerosis**, 53, 80, 146, 165, 182, 186, 296,  
254, 318.  
**Cólico de estómago**, 205, 319.  
— bilioso, 319.  
— ventoso, 1, 117, 320, 387.  
— de los pintores, 235, 320.  
— histérico, 320.  
— miserere (colera morbo), 320.  
— neutrítico, 194, id., 254, 321.  
— de las víceras, 27, 63, 1, 117.  
**Coma**, 31.  
**Condiloma**, 121.  
**Constipación**, 160, 171, 322.  
**Contusiones**, 386.  
**Contusión**, 13, 16, 90, 103, 264, 386.  
**Convulsiones de los niños**, 219, 253, 322.  
— de los adultos, 322.  
**Croup**, 39, 112, 135, 146, 288, 387.

## D.

- Danza de S. Vito**, 157.  
**Debilidad de estómago**, 26, 42, 33, 34, 51,  
9, 63, 64, 65, 66, 67, id., 76, 153, 183,  
204, 206, 207, 250, 256, 258, id., 259,  
274, 278, 281.  
— del oído, 9, 2, 387.  
— del ojo, 84, 143, 292, 387.  
— de los miembros y muscular, 19, 27,  
387.

- de los nervios, 24, II.
- de los órganos de la generacion, 148, 387.
- Desmayos, 388, 324.
- Depósitos artríticos, 99.
- Diabetes, 324.
- Diatrea, 48, 78, 124, 206, III, 324.
- Disenteria, 27, 61, id., 153, 205, 237.
- Dispepsia, 35, 57, 63, 182, 213, 251.
- Disuria, 189, 254.
- Diviesos, 81, 82, 85.
- Dolores artríticos, 20, 22, 24, 25, 26, 45, 109, 116, id., 388.
- de las articulaciones. 22, 24, 26, 4, 109, 114, 115, 282, 388.

## E.

- Efectos lácteos, 78, 210, 242.
- nervioso, 34, id., 8, 93, III.
- del útero, 90.
- Enfermedades de la piel. (Véase herpes, sarna, tiña &c.
- de las vias orinarias, 42, 6, 88, 112, 120, 321.
- de los nervios. (Véase vapores, espasmos, convulsiones.)
- Enteritis, 117, 355.
- Envenenamientos, 48, 102, 209, 245.
- Epilepsia, 44, 62, id., 137, 179, 180, 183, 210.
- Frustracion. (Véase flatuocidades.)
- Escorriato, 48, 53, 70, 71, 146, 189, 291, 281, 335.
- Esgoriaciones, 38, 388.
- Iscrofúlas, 70, 71, 119, 137, 156, 180, 227, 292, 337.

Espasmos, 34, id., 8, 69, 77, 93, 108, 94,  
117, 118, 159, 125, 185, 210, 252,  
256, 331, 337, 389.

Espujo de sangre. (Véase Hemoptisis), 56.

Esquinencia, 24, 30, 32, 340.

Estranguria, 189, 257, 340.

Excrescencias de carne &c., 121, 202, 389.  
— venereas, 389.

Extincion de la voz, 96, 111, 340.

Exostoses, 18.

## F.

Flatuosidades. (Véanse vientos.)

Flegmasias, 124.

Fístula del ano, 389.

Flores blancas. (Véase leucorrea.)

Fluxion de pecho, 117, 127, 296, 341.

Flujo imoderado de la menstruacion, 341.

Fracturas, 39, 10, 103, 389.

Frenesi, 341.

## G.

Gangrena, 18, 104, 280, 389.

Gastritis, 342.

Gastrodinia, 213, 220.

Golpes, 13, 16, 342, 390.

Gonorrea, 33, 87, 142, 154, 160, 166,  
184, 188, 254, 257, 342, 390.

Gota, 23, 24, 26, 45, 80, 108, 114, 131,  
174, 197, 222, 291, 254, 343.

Grietas, arrugas &c., 255, 391.

Grietas de los pechos, 22, 255, 391.

Guanos, 26, 32, 37, 53, 57, 58, 67, 68,  
80, 92, 99, 107, 2, 143, 147, 181, 193,  
212, 215, 216, 290, 295, 344, 391.

## H.

Hematemesis, 346.

Hematuria, 346.



- Hemoptisis, 28, 132, 195, 206.  
 Hemorragias, 65, 212, 214, 219, 249, 391, 346.  
 Hemorroides, 60, 115, 263, 265, 266, 142, 249, 346, 391.  
 Hepatitis, 347, 354.  
 Herpes, 28, 32, 40, 14, 122, 223, 225, 202, 262, 347, 392.  
 Hidrotobia. (Véase rabia.)  
 Hidropesía, 42, 55, id., 56, 73, 87, 129, 130, 146, 168, id., 172, 173, 175, 186, 188, 192, 211, 214, 291, 296, 275, 279, id., 348, 392.  
 Hidrotorax, 186, 350.  
 Hipocondría, 158, 351.  
 Hicterismo. (Véase efectos histéricos.)

I.

- Ictericia, 352.  
 Indigestión, 182, 251, 353.  
 Infartos glandulosos, 22, 84, 97, 257, 392.  
 — lacteos, 84, 103, 393.  
 Inflamación del bajo vientre, 117, 355.  
 — del estómago, 353.  
 — del hígado, 354.  
 — de los riñones, 355.  
 — de la vejiga, 356.  
 Insomnio, 158, 257, 356.  
 Iscuria, 117, 356, 367.

J.

- Jaqueca. (*Vide* cefalalgia.)

L.

- Llagas antiguas, 393.  
 — simples, 39, 393.  
 Letargia, 123, 356.  
 Leucorrea, 33, 77, 78, 84, 109, 135, 140,

188, 296, 275, 356, 394.

Lupias, 114, 394.

Luxaciones, 10, 103, 394.

M.

Magulladuras, 18, 394.

Marcha del ojo, 49, 59, 394.

Mania, 210, 357.

Marasmo. (*Véase* caquexia), 357.

N.

Nefrítico. (*Vide* cólico.)

Nefritis. (*Vide* inflamacion de los riñones.)

O.

Obstrucciones, 46, 109, 156, 134, 167, 174, 186, 222, 218, 254, 358, 394.

Odonalgia, 130, 242, 895. (*Véase* dolor de muelas.)

Oftalmia, 24, 48, 49, 14, 15, 115, 269, 222, 200, 395.

Opresion, 96, 126.

P.

Palpitaciones, 360.

Panadizo, 84, 366.

Paperas, 51, 100.

Parálisis, 44, 35, 90, 97, 105, 360, 396.

Pérdida de sangre del útero. (*Véanse* hemorragias.) 361.

Perineumonía, 117, 127, 296, 362.

Piedra de la vejiga. (*Véase* enfermedades de las vias orinarias.)

Pituita, 134, 135, 363.

Pleurésia, 47, 117, 205, 364, 396.

Q.

Quemadura, 38, 264, 396.

R.

Rabia, 210, 364.

- Ragades, 41, 121, 397.  
 Raquitis, 137, 365.  
 Retardos de la menstruacion, 69, 89, 109, 191, 365.  
 Retencion de la orina, 187, 189, 257, 367.  
 Retortijones, 78, 195, 368.  
 Retortijon de los niños, 368.  
 Reumatismo, 28, 25, 26, 32, 45, 4, 15, 60, 86, 90, 97, 98, 108, 114, 116, id., 131, 217, 282, 262, 279, 368, 370, 397.  
 Romadizos, 66, 106, 124, 125, id., 173, 217, 285, id., 286, 288, 370.

S.

- Sabañones, 22, 268, 145, 255, 397.  
 Sarampion, 89, 372.  
 Sarna, 28, 2, 99, 266, 226, 227, 197, 234, 372.  
 Sífilis, 8, 72, 122, 161, 163, 169, 177, id., 178, 223, id., 215, 227, 230, 243, 282, 289, 293, 294, 247, 260, 261, 373, 398.  
 Sordera, 19, 2, 398.  
 Supresion de la transpiracion, 72, 80, 273, 373.  
 — de la menstruacion. (V. Retardo.) 78, 188.  
 Sincope, 173.

T.

- Tabes mesenteria, 255, 374.  
 Tenia, 229, 231, 243, 244.  
 Tétano, 194, 374.  
 Timpanitis, 117, 374, 399.  
 Tíña, 28, 123, 266, 267, id., 232, 233, 375, 398.  
 Tisis pulmonar, 107, 138, 175, 185, 283, 288, 375.  
 — laringea, 146, 263, 377.

#### 444 TABLA DE LAS ENFERMEDADES.

Tos convulsiva, 54, 191, 217.

— rebelde, 54, 75, 113, 139, 165, 191, 286, id.

Trismo de la cara, 141, 374.

Tumores, 81, 84, 99, 103, 114, id., 118, 119, 241, 399.

— sífilíticos, 82, 25, 399.

— lacteos, 84, 103.

— enquistados, 99, 114.

— indolentes, 83, 118.

Tumores inflamatorios, 399.

— escrofulosos, 84, 99, 114, 119, 400.

— escirrosos, 378, 399.

#### U.

Úlceras, 18, 22, 39, 41, id., 3, 200, 91, 400, 379.

— cancerosas, 41, 199, 220, 401.

— benignas, 401.

— fétidas, 401.

— inveteradas, 401.

— escrofulosas, 401.

— escorbúticas, 401.

— pútridas de la garganta, 402.

— de mal carácter, 401.

— venéreas, 40, 7, 128, 200, 402.

— indolentes, 266, 268.

— rebeldes 198, 234.

Úlceracion de los párpados, 38, 50.

#### V.

Vapores histéricos, 34, 77, 81, 93, 90, 158, 185, 253, 331, 379, 402.

Vértigos, 44, 34, 380.

Viruelas, 380.

Vómito, 71, 192, 196, 381.

Vomito de sangre, 381.

23

0

23



A030 / 022



UNIVERSIDAD DE SEVILLA



600147562

i21848774

